

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
EU/1/21/1612/001	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Инжекционна суспензия	Интрамускулно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	1 предварително напълнена спринцовка
EU/1/21/1612/002	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Инжекционна суспензия	Интрамускулно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	1 предварително напълнена спринцовка + 1 игла
EU/1/21/1612/003	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Инжекционна суспензия	Интрамускулно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	10 предварително напълнени спринцовки
EU/1/21/1612/004	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Инжекционна суспензия	Интрамускулно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	10 предварително напълнени спринцовки + 10 игли
EU/1/21/1612/005	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Инжекционна суспензия	Интрамускулно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	50 предварително напълнени спринцовки
EU/1/21/1612/006	Prevenar 20	-- <sup>1</sup>	Инжекционна суспензия	Интрамускулно приложение	Предварително напълнена спринцовка (стъкло)	0,5 ml	50 предварително напълнени спринцовки + 50 игли

-- <sup>1</sup> Една доза (0,5 ml) съдържа:

Пневмококов полизахарид серотип 1 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 3 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 4 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 5 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 6A <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 6B <sup>1 2</sup>	4,4 µg
Пневмококов полизахарид серотип 7F <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 8 <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 9V <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 10A <sup>1 2</sup>	2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 11A <sup>1 2</sup>	2,2 µg

<u>РУ № (на ЕС)</u>	<u>(Свободно избрано) име</u>	<u>Количество на активното вещество в дозова единица</u>	<u>Лекарствена форма</u>	<u>Път на въвеждане</u>	<u>Първична опаковка</u>	<u>Съдържание (концентрация)</u>	<u>Вид опаковка</u>
	Пневмококов полизахарид серотип 12F <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 14 <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 15B <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 18C <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 19A <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 19F <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 22F <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 23F <sup>1 2</sup>	2,2 µg					
	Пневмококов полизахарид серотип 33F <sup>1 2</sup>	2,2 µg					

<sup>1</sup>Конюгиран с CRM<sub>197</sub> носещ белтък (приблизително 51 µg на доза)

<sup>2</sup>Адсорбиран върху алуминиев фосфат (0,125 mg алуминий на доза)