

15 December 2016  
EMA/PRAC/860742/2016  
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

## Nýr texti fyrir lyfjaupplýsingar – Útdráttur úr ráðleggingum PRAC vegna ræsimerkja

Samþykkt á PRAC 28. nóvember-1. desember 2016

Textinn í þessu skjali fyrir lyfjaupplýsingar er útdráttur úr skjali sem nefnist 'PRAC ráðleggingar vegna ræsimerkja (*PRAC recommendations on signals*)' en í því skjali er heildartexti með ráðleggingum PRAC um uppfærslu á lyfjaupplýsingum ásamt almennum leiðbeiningum um hvernig skuli afgreiða ræsimerki. Skjalið er hægt að nálgast [hér](#) (aðeins á ensku).

Nýr texti sem bæta á við lyfjaupplýsingar er undirstrikaður. Texti sem á að eyða er yfirstrikaður.

### 1. Acenocoumarol; phenprocoumon; fluindione; phenindione – Calciphylaxis (EPI TT no 18710)

#### Summary of product characteristics (acenocoumarol, phenprocoumon)

##### 4.4. Special warnings and precautions for use

Calciphylaxis is a rare syndrome of vascular calcification with cutaneous necrosis, associated with high mortality. The condition is mainly observed in patients with end-stage renal disease on dialysis or in patients with known risk factors such as protein C or S deficiency, hyperphosphataemia, hypercalcaemia or hypoalbuminaemia. Rare cases of calciphylaxis have been reported in patients taking vitamin K antagonists including <product name>, also in the absence of renal disease. In case calciphylaxis is diagnosed, appropriate treatment should be started and consideration should be given to stopping treatment with <product name>.

##### 4.8. Undesirable effects

###### Skin and subcutaneous tissue disorders

Frequency 'not known': Calciphylaxis



## **Package leaflet (acenocoumarol, phenprocoumon)**

### **4 – Possible side effects**

Tell your doctor straight away if you have any of the following side effects...:

[...]

A painful skin rash. On rare occasions <product name> can cause serious skin conditions, including one called calciphylaxis that can start with a painful skin rash but can lead to serious complications.  
This adverse reaction occurs more frequently in patients with chronic kidney disease.

## **Summary of product characteristics (fluindione, phenindione)**

### **4.4. Special warnings and precautions for use**

Calciphylaxis is a rare syndrome of vascular calcification with cutaneous necrosis, associated with high mortality. The condition is mainly observed in patients with end-stage renal disease on dialysis or in patients with known risk factors such as protein C or S deficiency, hyperphosphataemia, hypercalcaemia or hypoalbuminaemia. Rare cases of calciphylaxis have been reported in patients taking vitamin K antagonists, also in the absence of renal disease. In case calciphylaxis is diagnosed, appropriate treatment should be started and consideration should be given to stopping treatment with <product name>.

**No product with an Icelandic marketing authorisation falls under this PRAC recommendation, therefore the text has not been translated into Icelandic.**

## **2. Metýlfenidat – Standpína (EPITT nr. 18719)**

### **Samantekt á eiginleikum lyfs**

#### **4.4. Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun**

Standpína. Greint hefur verið frá langvarandi og sársaukafullri stinningu getnaðarlims í tengslum við metýlfenidat lyf, aðallega í tengslum við breytingu á meðferðaráætlun með metýlfenidati. Sjúklingar sem fá óeðlilega viðvarandi eða tíðar og sársaukafulla stinningu getnaðarlims ættu að leita læknisaðstoðar án tafar.

#### **4.8. Aukaverkanir**

Æxlunararfæri og brjóst

Standpína, aukin stinning og langvarandi stinning getnaðarlims.

Tíðni: tíðni ekki þekkt

### **Fylgiseðill**

2 – Áður en byrjað er að nota <heiti lyfs>

Varnaðarorð og varúðarreglur

Drengir og unglingar geta óvænt fengið langvarandi stinningu getnaðarlims meðan á meðferð stendur. Það getur verið sársaukafullt og komið fram hvenær sem er. Mikilvægt er að haft sé samband við lækninn án tafar ef stinning getnaðarlims varir lengur en 2 klukkutíma, sérstaklega ef því fylgir sársauki.

4 – Hugsanlegar aukaverkanir

Langvarandi stinning getnaðarlims, stundum sársaukafull, eða tíðari stinning getnaðarlims.

Tíðni: tíðni ekki þekkt

### **3. Prótónpumpuhemlar: dexlansoprazol; esomeprazol; lansoprazol; omeprazol; pantoprazol; rabeprazol – Separ í maga (EPITT nr. 18725)**

**Samantekt á eiginleikum lyfs (bæði lyfseðilsskyld og lausasölu)**

4.8. Aukaverkanir

Meltingarfæri: Kirtlsepar (góðkynja) í magabotni

Tíðni: algengar

**Fylgiseðill (bæði lyfseðilsskyld og lausasölu)**

4 - Hugsanlegar aukaverkanir

Góðkynja separ í maganum

Tíðni: algengar

### **4. Vildagliptin; Vildagliptin, metformin – Blöðrusóttarlíki (EPITT nr. 18692)**

**Samantekt á eiginleikum lyfs**

4.8. Aukaverkanir

Húð og undirhúð

Blöðru – eða flagnandi Flagnandi húðskemmdir með blöðrum, þar með talið bólublöðrusóttarlíki

Tíðni: tíðni ekki þekkt