



5 January 2024¹
EMA/PRAC/560731/2023
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Formulazzjoni gdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottata fil-PRAC ta' bejn is-27 u t-30 ta' Novembru 2023

Il-formulazzjoni tal-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument hija estratta mid-dokument intitolat "Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali" li fih it-test shiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab **hawnhekk** (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolinjat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtugħi.

1. Axicabtagene ciloleucel – Lewkoenċefalopatija multifokali progressiva (PML) (EPITT nru 19940)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Riattivazzjoni tal-HBV Virali

[...]

Ir-riattivazzjoni tal-virus JC, li twassal qħal lewkoenċefalopatija multifokali progressiva (PML), ċiet irrapportata f'pazjenti ttrattati b'Yescarta li rċevew ukoll trattament preċedenti b'medikazzjonijiet immunosoppressivi oħra. Ĝew irrapportati każijiet b'rезультат fatali. Il-possibbiltà ta' PML qħandha tiġi kkunsidrata f'pazjenti immunosoppressi b'bidu ġdid jew b'sintomi newroloġiċi li sejrin qħall-aqħar u għandhom isiru evalwazzjonijiet dijanostici xierqa.

¹ Expected publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).



Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata Yescarta

Wara li tkun ingħatajt Yescarta

Għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek immedjatament jekk tinnota xi waħda minn dawn li ġejjin:

[...]

- Vista mċajpra, telf ta' vista jew vista doppja, diffikultà biex titkellem, dgħufija jew nuqqas ta' flessibbiltà ta' drieġ jew sieq, bidla fil-mod kif timxi jew problemi fil-bilanč tiegħek, bidliet fil-personalità, bidliet fil-ħsieb, memorja u orjentazzjoni li jwasslu għal konfużjoni. Dawn kollha jistgħu jkunu sintomi ta' kundizzjoni serja u potenzjalment fatali tal-moħħ magħrufa bhala lewkoenċefalopatija multifokali progressiva (PML). Dawn is-sintomi jistgħu jibdew diversi xħur wara li jkun intemm it-trattament u normalment jiżviluppaw bil-mod u gradwalment matul ġimghat jew xħur. Huwa importanti li l-qraba tiegħek jew dawk li jieħdu ħsieb il-pazjenti jkunu konxji wkoll minn dawn is-sintomi, peress li jistgħu jinnotaw sintomi li inti ma tafx bihom.

2. Dabrafenib; trametinib - Newropatija periferali (EPITT nru 19947)

Tafinlar (dabrafenib) - Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Lista f'tabba ta' reazzjonijiet avversi

Tabella 3 (Reazzjonijiet avversi b'monoterapija b'dabrafenib) u Tabella 4 (Reazzjonijiet avversi b'dabrafenib f'kombinazzjoni ma' trametinib)

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Newropatija periferali (li tinkludi newropatija sensorjali u motorja)

Tafinlar (dabrafenib) - Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Effetti sekondarji possibbli f'pazjenti li jieħdu Tafinlar waħdu u Effetti sekondarji possibbli meta Tafinlar u trametinib jittieħdu flimkien

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettaw sa persuna 1 minn kull 10)

Problema fin-nervituri li tista' tipproduc i-wġiġħ, telf tas-sensazzjoni jew tnemnim fl-idejn u fis-saqajn u/jew dgħufija tal-muskoli (newropatija periferali)

Mekinist (trametinib) - Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Lista f'tabba ta' reazzjonijiet avversi

Tabella 4 (Reazzjonijiet avversi b'monoterapija ta' trametinib) u Tabella 5 (Reazzjonijiet avversi bi trametinib flimkien ma' dabrafenib)

Disturbi fis-sistema nervuža (SOC ġdida għat-tabella 4)

Komuni: Newropatija periferali (li tinkludi newropatija sensorjali u motorja)

Mekinist (trametinib) - Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Effetti sekondarji possibbli f'pazjenti li jieħdu Mekinist waħdu u Effetti sekondarji meta Mekinist u dabrafenib jittieħdu flimkien

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 10)

Problema fin-nervituri li tista' tipproduc i-wġiġ, telf tas-sensazzjoni jew tnemnim fl-idejn u fis-saqajn u/jew dghufja tal-muskoli (newropatija periferali)

3. Pirfenidone – Reazzjoni għall-mediciċina b'eosinofilja u sintomi sistemiċi (DRESS)(EPITT nru 19920)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet severi tal-ġilda

Is-sindromu ta' Stevens-Johnson (SJS), u n-nekroliżi epidermali tossika (TEN), u r-reazzjoni għall-mediciċina b'eosinofilja u sintomi sistemiċi (DRESS), li jistgħu jkunu ta' theddida għall-ħajja jew fatali, ġew irrapportati wara t-tqegħid fis-suq b'assoċjazzjoni mat-trattament tal-<isem tal-prodott>. Jekk jidhru sinjali u sintomi li jissuġġerixxu dawn ir-reazzjonijiet, <l-isem tal-prodott> għandu jiġi rtirat immedjata. Jekk il-pazjent ikun żviluppa SJS, jew-TEN jew DRESS bl-użu tal-<isem tal-prodott> it-trattament b'<isem tal-prodott> ma għandhux jerġa' jinbeda u għandu jitwaqqaf b'mod permanenti.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Frekwenza: Mhux magħrufa - is-sindromu ta' Stevens-Johnson¹; nekroliżi epidermali tossika¹; reazzjoni għall-mediciċina b'eosinofilja u sintomi sistemiċi (DRESS)¹

Nota 1 f'qiegħ il-paġna ¹: Identifikat permezz ta' sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq (ara t-taqṣima 4.4)

Fuljett ta' tagħrif

2. Twissijiet u prekawzjonijiet

- Is-sindromu ta' Stevens-Johnson, u n-nekroliżi epidermali tossika, u r-reazzjoni għall-mediciċina b'eosinofilja u sintomi sistemiċi (DRESS), ġew irrapportati b'assoċjazzjoni mat-trattament tal-<isem tal-prodott>. Ieqaf uża <isem tal-prodott> u fitteż attenzjoni medika minnufih jekk tinnota xi wieħed mis-sintomi relatati ma' dawn ir-reazzjonijiet serji tal-ġilda deskritti f'taqsima 4.

4. Effetti sekondarji possibbli

Ieqaf hu <*isem tal-prodott*> u għid lit-taħbi tiegħek fittex attenzjoni medika immedjatament jekk tinnota xi wieħed minn dawn is-sintomi jew sinjali li ġejjin

- Jekk-tesperjenza n-Nefha fil-wiċċċ, xufftejn u/jew ilsien, ħakk, ħorriqja, diffikultà biex tieħu nifs jew tharħir, jew thossok hażin, li huma sinjali ta' anġjoedema, reazzjoni allerġika serja jew anafilassi.
- Jekk-tesperjenza Sfura fl-ġħajnejn jew fil-ġilda, jew awrina skura, potenzjalment akkumpanjata minn ħakk tal-ġilda, u ġiġi fuq in-naħha ta' fuq tal-lemin tal-parti tal-istonku tiegħek (l-addome), nuqqas ta' aptit, emorraġja jew tbenġil aktar faċilment min-normal, jew thossok għajjien. Dawn jistgħu jkunu sinjali ta' funzjoni anormali tal-fwied u jistgħu jindikaw ħsara fil-fwied, li hija effett sekondarju mhux komuni ta' <*isem tal-prodott*>.
- Jekk-tesperjenza Irqajja-ż-żejt h-Homor mhux imqabbżin, jew cirkulari fil-ġisem, spiss b'nuffati centrali, tqaxxir tal-ġilda, ulċeri tal-ħalq, tal-grizmejn, tal-imnieħer, tal-ġenitali u tal-ġħajnejn. Dawn ir-raxxijiet serji tal-ġilda jistgħu jkunu preċeduti minn deni u sintomi li jixbhu lill-influwenza. Dawn is-sinjali u s-sintomi jistgħu jindikaw (is-sindromu ta' Stevens-Johnson, jew nekroliżi epidermali tossika).
- Raxx mifrux, temperatura tal-ġisem qħolja u limfonodi mkabbra (sindromu DRESS jew sindromu ta' sensittività eċċessiva għall-medicina).