



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

28 January 2016
EMA/PRAC/53959/2016
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Formolazzjoni ġdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottati fil-PRAC ta' bejn il-11-14 ta' Ottubru 2016

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test sħiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab [hawnhekk](#) (bl-Ingliż biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżjed mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa ~~maqtugħ~~.

KENTERA (oxybutynin) – Disturbi psikjatriċi (EPITT nru 18342)

Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott

- **Applikabbli għall-formolazzjonijiet kollha: Kentera 3.9 mg / roqgħa transdermali għal 24 siegħa, Kentera 90.7 mg/g ġell f'qartas u Kentera 90.7 mg/g ġell f'pompa tal-kejl**

4.2. Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

[...] Popolazzjoni tal-anzjani

Ma hemm bżonn tal-ebda aġġustament tad-doża f'din il-popolazzjoni. Kentera għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensitivi għall-effetti ta' antikolinergċi li jaġixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetiċi (ara sezzjoni 4.4).

[...] Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Kentera fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s'issa. Kentera mhux rakkomandat għall-użu fil-popolazzjoni pedjatrika. Data disponibbli bħalissa hi deskritta f'sezzjoni 4.8, iżda ma tista' ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

~~M'hemm esperjenza fit-tfal.~~



4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

[...] Kentera għandu jintuża b'kawtela f'pazienti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti ta' antikolinergici li jaqixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetici.

Episodji psikjatriċi u CNS antikolinergici bħal disturbi fl-irqad (eż. insomnija) u disturbi konjittivi ġew assoċjati mal-użu ta' oxybutynin, speċjalment f'pazienti anzjani. Għandha tintuża kawtela meta oxybutynin jingħata flimkien ma' mediċini antikolinergici oħra (ara wkoll sezzjoni 4.5). Jekk pazjent jesperjenza avvenimenti bħal dawn, għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif tal-mediċina.

Avvenimenti psikjatriċi oħrajn li jimplikaw mekkanizmu antikolinergiku ġew irrapportati waqt l-użu wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.8). [...]

4.8. Effetti mhux mixtieqa

[...] Lista f'tabella tar-reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi minn studji kliniċi ta' fażi 3 u 4 huma elenkati hawn taħt skont is-sistema tal-klassifika tal-organi u l-grupp ta' frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna ($\geq 1/10$), komuni ($> 1/100$ sa $< 1/10$), mhux komuni ($> 1/1,000$ sa $< 1/100$), rari ($> 1/10,000$ sa $< 1/1,000$), rari ħafna ($< 1/10,000$). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla f'ordni li tibda b'dak l-iżjed serju u tkompli għal dak l-inqas serju. Ir-reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq li ma dehrux fil-provi kliniċi huma inklużi wkoll.

[...]

MedDRA Sistema tal-Klassifika tal-Organi	Incidenza	Reazzjonijiet avversi
<u>Disturbi psikjatriċi</u>	<u>Mhux Komuni</u>	<u>Ansjetà, konfużjoni, nervożiżmu, aġitazzjoni, insomnija</u>
	<u>Rari</u>	<u>Reazzjoni ta' paniku#, delirju#, allucinazzjonijiet#, diżorjentazzjoni#</u>
<u>Disturbi fis-sistema nervuża</u>	<u>Rari</u>	<u>Indeboliment tal-memorja#, amnesija#, letargija#, disturbi fl-attenzjoni#</u>

[...]

reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq minn rapporti ta' wara t-tqegħid fis-suq biss (li ma dehrux fil-provi kliniċi), bil-kategorija ta' frekwenza stmata mid-data ta' sikurezza tal-prova klinika, u rrapportati flimkien ma' użu topiku ta' oxybutynin (effetti tal-klassi antikolinergika).

Reazzjonijiet avversi magħrufa li huma assoċjati mat-terapija antikolinergika, bħal oxybutynin, huma anoressja, rimettar, esofaġite ta' rifluss, nuqqas ta' għaraq, kolp ta' sħana, nuqqas tad-dmugh, midrijasi, takikardija, aritmija, diżorjentazzjoni, kapaċità batuta biex tikkonċentra, għejja, inkubi, irrekwitezza, konvulżjoni, pressjoni għolja intraokulari u induzzjoni ta' glawkoma, konfużjoni, ansjetà, paranojja, allucinazzjoni, fotosensittività, disfunzjoni erettilli.

Popolazzjoni pedjatrika

Wagt l-użu ta' wara t-tqeghid fis-suq f'dan il-grupp ta' età, ġew irrappurtati każijiet ta' allucinazzjonijiet (assoċjati ma' manifestazzjonijiet ta' ansjetà) u disturbi fl-irqad ikkorrelati ma' oxybutynin. It-tfal jistgħu jkunu aktar sensitivi għall-effetti tal-prodott, b'mod partikolari s-CNS u reazzjonijiet avversi psikjatriċi.

[...]

- **Applikabli għal Kentera 3.9 mg / roqgħa transdermali għal 24 siegħa biss**

4.8. Effetti mhux mixtieqa

[...]

MedDRA Sistema tal-Klassifika tal-Organi	Inċidenza	Reazzjonijiet avversi
<u>Disturbi fis-sistema nervuża</u>	<u>Komuni</u>	<u>Uġiġħ ta' ras, ngħas</u>
<u>Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali:</u>	<u>Mhux Komuni</u>	<u>Rinite</u>
Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet fil-post mnejn jingħata	Komuni	[...], <u>uġiġħ ta' ras, Ngħas</u>
	Mhux Komuni	<u>Rinite</u>

Fuljett ta' tagħrif

- **Applikabli għall-formulazzjonijiet kollha: Kentera 3.9 mg / roqgħa transdermali għal 24 siegħa, Kentera 90.7 mg/g ġell f'qartas u Kentera 90.7 mg/g ġell f'pompa tal-kejl**

4. EFFETTI SEKONDARJI POSSIBBLI

[...]

Effetti sekondarji mhux komuni:

[...]

- ansjetà
- konfużjoni
- nervi
- aġitazzjoni
- diffikultajiet biex torqod

[...]

Effetti sekondarji rari:

- reazzjoni ta' paniku
- konfużjoni mentali
- allucinazzjonijiet
- dizorjentament
- indeboliment tal-memorja
- telf ta' memorja
- għejja mhux normali
- konċentrazzjoni batuta

[...]