

26 November 2018<sup>1</sup>  
EMA/PRAC/790403/2018  
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

## Formulazzjoni gdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottata fil-PRAC ta' bejn il-29-31 ta' Ottubru 2018

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test sħiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab hawnhekk (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtugħ.

### 1. Formulazzjoni sistemika ta' Tacrolimus — infezzjoni tal-Epatite E (EPITT nru 19246)

#### Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

#### Infezzjonijiet inkluži infezzjonijiet opportunističi

Pazjenti kkurati b'immunosuppressanti, inkluži tacrolimus huma f'riskju akbar għal infezzjonijiet inkluži infezzjonijiet opportunističi (batterjali, fungali, virali u protozoali). ~~Fest dawn il-kundizzjonijiet humabħal~~ vajrus BK assoċjat man-nefropatija u I-vajrus JC assoċjat mal-lewkoenċefalopatja multifokali progressiva (PML). Il-Pazjenti huma wkoll f'riskju akbar ta' infezzjonijiet b'epatite virali (pereżempju, ir-riattivazzjoni tal-epatite B u C u infezzjoni de novo, kif ukoll l-epatite E, li jistgħu jsiru kronici). Dawn l-infezzjonijiet huma ta' spiss relatati ma' piż immuno-suppressiv totali għoli u jistgħu jwasslu għal kundizzjonijiet serji jew fatali li t-tobba għandhom jikkunsidraw fid-dajanjozi differenzjali f'pazjenti immuno-suppressi b'funzjoni tal-fwied jew tal-kliewi jew sintomi newroloġiči. Il-prevenzjoni u l-ġestjoni għandhom ikunu konformi ma' gwida klinika xierqa.

<sup>1</sup> Intended publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).



## **2. Xylometazoline – Aritmija ventrikolari serja f'pazjenti bis-sindromu ta' QT twila (EPI TT nru 19242)**

### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

4.4. Twissijiet specjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjenti bis-sindromu ta' QT twila kkurati bi xylometazoline jistgħu jkunu f'riskju akbar ta' aritmiji ventrikolari serji.

### **Fuljett ta' tagħrif**

2. X'għandek tkun taf qabel tieħu <Isem il-prodott>

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu <Isem il-prodott>

. . . jekk tbat minn mard tal-qalb (eż. sindromu ta' QT twila)

Nota: fil-fuljett ta' tagħrif it-test "(eż. sindromu ta' QT twila)" għandu jiżdied mal-inċiż li jsemmi l-mard tal-qalb, filwaqt li jitqies il-kliem diġà eżistenti għal prodotti mediciinali awtorizzati b'mod nazzjonali. Għal fuljetti ta' tagħrif li ma jsemmux il-“mard tal-qalb”, għandu jiżdied inċiż dwar “mard tal-qalb” (eż. sindromu ta' QT twila), fil-linjal mal-kliem ta' hawn fuq.