



2 August 2021<sup>1</sup>  
EMA/PRAC/401508/2021 Corr<sup>2</sup>  
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

## Formulazzjoni ġdida tal-kliem tal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali

Adottati fil-PRAC ta' bejn il-5-8 ta' Lulju 2021

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjali' li fih it-test shiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjali. Jista' jinstab ***hawnhekk*** (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jitħassar huwa maqtugħ.

### **1. Donepezil – Disturbi fil-konduzzjoni kardijaka inkluž it-titwil tal-QT u Torsade de Pointes (EPITT nru 19667)**

#### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kundizzjonijiet kardjovaskulari

[...]

Kien hemm rapporti ta' wara t-tqeħħid fis-suq ta' titwil fl-intervall tal-QTc u Torsade de Pointes (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.8). Hija rrakkomandata kawtela f'pazjenti bi storja preeżistenti jew fil-familja ta' titwil tal-QTc, f'pazjenti ttrattati b'mediċini li jaffettaw l-intervall tal-QTc, jew f'pazjenti b'mard kardijaku preeżistenti rilevanti (eż. insuffiċjenza tal-qalb mhux ikkumpensata, infart mijokardijaku reċenti, bradiarritmiji), jew disturbi tal-elettroliti (ipokalimja, ipomanjesemija). Jista' jkun meħtieġ monitoraġġ kliniku (ECG).

<sup>1</sup> Expected publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).

<sup>2</sup> Section 2 of the package leaflet for donepezil was revised on 21 September 2021 (see pages 2-3).



#### 4.5. Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Ġew irrapportati kažijiet ta' titwil fl-intervall tal-QTc u Torsade de Pointes għal donepezil. Hija rakkomandata kawtela meta donepezil jintuża flimkien ma' prodotti medicinali oħra magħrufa li jtawlu l-intervall tal-QTc u jista' jkun meħtieġ monitoragg kliniku (ECG). Xi eżempji jinkludu:

Antiarritmici tal-Klassi IA (eż. quinidine)

Antiarritmici tal-Klassi III (eż. amiodarone, sotalol)

Čerti antidipressanti (eż. citalopram, escitalopram, amitriptyline)

Antipsikotici oħra (eż. derivattivi tal-phenothiazine, sertindole, pimozide, ziprasidone)

Čerti antibijotici (eż. clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin)

#### 4.8. Effetti mhux mixtieqa

Lista f'tabella tar-reazzjonijiet avversi

Disturbi kardijaċi

Frekwenza mhux magħruf: Takikardija ventrikulari polimorfika inkluż Torsade de Pointes; Intervall QT tal-elettrokardjogramma mtawwal

Koriment u avvelenament

komuni: Aċċidenti inkluż waqqħat

### Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu [isem il-prodott]

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu [isem il-prodott] jekk għandek jew kellek:

kundizzjoni tal-qalb (bħal taħbit tal-qalb irregolari jew bil-mod ħafna, insuffiċjenza tal-qalb, infart mijokardijaku)

kundizzjoni tal-qalb imsejha "intervall QT imtawwal" jew storja ta' čerti ritmi anomalji tal-qalb imsejha Torsade de Pointes jew jekk xi ħadd fil-familja tiegħek għandu "intervall QT imtawwal"

livelli baxxi ta' manjeżju jew potassju fid-demm tiegħek

Medicini oħra u [isem il-prodott]

B'mod partikolari huwa importanti li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu xi waħda mit-tipi ta' medicini li ġejjin<sup>3</sup>:

- medicini għal problemi fir-ritmu tal-qalb eż. amiodarone, sotalol
- medicini għad-depressjoni eż. citalopram, escitalopram, amitriptyline, fluoxetine
- medicini għall-psikozi eż. pimozide, sertindole, ziprasidone
- medicini għal infelżzjonijiet batteriċi eż. clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, rifampicin
- medicini antifungali eż. ketoconazole
- medicini oħra kontra l-marda tal-Alzheimer eż. galantamine

<sup>3</sup> Din il-lista ġiet riveduta fil-21 ta' Settembru 2021.

- pilloli għall-uġiġi jew trattament għall-artrite eż. aspirina, medicini antinfjammatorji nonsteroidali (*non-steroidal anti-inflammatory drugs - NSAIDs*) bħal ibuprofen, jew diclofenac sodium
- medicini antikolinergiċi eż. tolterodine
- ~~antibijotici eż. erythromycin, rifampicin~~
- ~~medicina antifungali eż. ketoconazole~~
- ~~anti-dipressanti eż. fluoxetine~~
- medicini antikonvulsivi eż. phenytoin, carbamazepine
- medikazzjoni għal kundizzjoni tal-qalb eż. quinidine, imblokkaturi tar-ricetturi beta (propranolol u atenolol)
- rilassanti tal-muskoli eż. diazepam, succinylcholine
- anestetiku ġenerali
- medicini miksuba mingħajr riċetta ta' tabib eż. rimedji ġejjin mill-ħnejnej

#### 4. Effetti sekondarji possibbli

Frekwenza mhux magħruf:

Bidli fl-attività tal-qalb li jistgħu jidhru fuq elettrokardjogramma (ECG) imsejha “intervall QT imtawwal”

Taħbi tal-qalb mgħażżeġ u irregolari, hass hażin li jistgħu jkunu sintomi ta’ kundizzjoni ta’ periklu għall-ħajja magħrufa bħala Torsade de Pointes

## **2. Inhibituri ta’ punt ta’ kontroll immuni: atezolizumab; avelumab; cemiplimab; durvalumab; ipilimumab; pembrolizumab; nivolumab – Ċistite medjata mis-sistema immunitarja (EPITT nru 19610)**

### **Kevtruda (pembrolizumab)**

#### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

##### 4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda ta’ “ċistite mhux infettiva” fil-paragrafu dwar reazzjonijiet oħra relatati mal-immunità b’kontroreferenza għas-sezzjonijiet 4.2 u 4.8.

##### 4.8. Effetti mhux mixtieqa

Żieda ta’ “ċistite mhux infettiva” bħala ADR fl-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza “rari” fil-kolonna għall-monoterapija f’tabella 2.

### **Fuljett ta’ tagħrif**

#### 4. Effetti sekondarji possibbli

Żieda ta’ “Infiammazzjoni tal-bużżeqqi tal-urina. Is-sinjal u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekwenti u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t’isfel tal-addome.” fost il-lista ta’ reazzjonijiet avversi bi frekwenza “rari”.

## **Opdivo (nivolumab)**

### **Sommarju tal-karatteristici tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" fil-paragrafu dwar reazzjonijiet oħra relatati mal-immunità b'kontroreferenza għas-sezzjonijiet 4.2 u 4.8.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" bħala ADR fis-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "rari" għal monoterapija b'nivolumab f'tabella 6.

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" bħala ADR fl-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "mhux komuni" għal nivolumab flimkien ma' ipilimumab f'tabella 7 u f'tabella 8.

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" bħala ADR fl-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "rari" f'tabella 9.

### **Fuljett ta' tagħrif**

4. Effetti sekondarji possibbli

Żieda ta' "Infjammazzjoni tal-bużżeqha tal-urina. Is-sinjal u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekwenti u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t'isfel tal-addome." fost il-lista ta' reazzjonijiet avversi bi frekwenza "rari" għat-trattament b'Opdivo waħdu.

Żieda ta' "Infjammazzjoni tal-bużżeqha tal-urina. Is-sinjal u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekwenti u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t'isfel tal-addome." fost il-lista ta' reazzjonijiet avversi bi frekwenza "mhux komuni" għat-trattament b'Opdivo flimkien ma' medicini oħra kontra l-kanċer.

## **Yervov (ipilimumab)**

### **Sommarju tal-karatteristici tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" fil-paragrafu dwar reazzjonijiet oħra relatati mal-immunità b'kontroreferenza għas-sezzjonijiet 4.2 u 4.8.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" bħala ADR fis-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "mhux komuni" f'tabella 4.

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" bħala ADR fl-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "mhux komuni" għal nivolumab flimkien ma' ipilimumab f'tabella 5 u f'tabella 6.

### **Fuljett ta' tagħrif**

4. Effetti sekondarji possibbli

Żieda ta' "Infjammazzjoni tal-bużżeqha tal-urina. Is-sinjali u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekventi u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t'isfel tal-addome." fost il-listi ta' reazzjonijiet avversi bi frekwenza "mhux komuni" għat-trattament b'monoterapija b'ipilimumab rispettivament terapija ta' kombinazzjoni ta' ipilimumab.

### **Tecentriq (atezolizumab)**

#### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

##### Reazzjonijiet avversi oħra relatati mal-immunità

Minħabba l-mekkaniżmu ta' azzjoni ta' atezolizumab, jistgħu jseħħu reazzjonijiet avversi oħra potenzjali relatati mal-immunità, inkluża čistite mhux infettiva.

Evalwa r-reazzjonijiet avversi suspettati kollha relatati mal-immunità biex teskludi kawži oħra. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali u sintomi ta' reazzjonijiet avversi relatati mal-immunità u, abbażi tas-severità tar-reazzjoni, għandhom jiġu mmaniġġati b'modifiki fit-trattament u b'kortikosterojdi kif indikat klinikament (ara sejjoni 4.2 u sejjoni 4.8).

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Żieda ta' "čistite mhux infettiva" bħala ADR fis-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "mhux magħruf" fil-kolonna għal monoterapija f'tabella 2.

### **Fuljett ta' tagħrif**

4. Effetti sekondarji possibbli

[...]

Effetti sekondarji oħra li ġew irrapportati (frekwenza mhux magħruf):

Infjammazzjoni tal-bużżeqha tal-urina. Is-sinjali u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekventi u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t'isfel tal-addome.

### **Bavencio (avelumab)**

#### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda ta' "čistite mhux infettiva" fil-paragrafu dwar reazzjonijiet oħra relatati mal-immunità b'kontroreferenza għas-sejjonijiet 4.2 u 4.8.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Żieda ta' "čistite mhux infettiva" bħala ADR fl-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "rari" f'tabella 2.

## Fuljett ta' tagħrif

### 4. Effetti sekondarji possibbli

#### Rari (jistgħu jaffettwaw sa persuna 1 minn kull 1 000)

- Infjammazzjoni tal-bużżeqha tal-urina. Is-sinjal u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekventi u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t'isfel tal-addome

## Imfinzi (durvalumab)

### Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

#### 4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" fil-paragrafu dwar reazzjonijiet oħra relatati mal-immunità b'kontroreferenza għas-sezzjonijiet 4.2 u 4.8.

#### 4.8. Effetti mhux mixtieqa

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" bħala ADR fl-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "rari" fil-kolonna għal monoterapija b'Imfinzi f'tabella 3.

## Fuljett ta' tagħrif

### 4. Effetti sekondarji possibbli

Żieda ta' "Infjammazzjoni tal-bużżeqha tal-urina. Is-sinjal u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekventi u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t'isfel tal-addome." fost il-lista ta' reazzjonijiet avversi bi frekwenza "rari".

## Libtayo (cemiplimab)

### Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

#### 4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" fil-paragrafu dwar reazzjonijiet oħra relatati mal-immunità b'kontroreferenza għas-sezzjonijiet 4.2 u 4.8.

#### 4.8. Effetti mhux mixtieqa

Żieda ta' "ċistite mhux infettiva" bħala ADR fl-SOC Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja bi frekwenza "mhux magħruf" f'tabella 2.

## Fuljett ta' tagħrif

### 4. Effetti sekondarji possibbli

Żieda ta' "Infjammazzjoni tal-bużżeqha tal-urina. Is-sinjal u s-sintomi jistgħu jinkludu urina frekventi u/jew bl-uġiġi, urġenza biex tgħaddi l-urina, demm fl-urina, uġiġi jew pressjoni fin-naħha t'isfel tal-addome." fost il-lista ta' reazzjonijiet avversi bi frekwenza "mhux magħruf".

### **3. Octreotide – Insuffiċjenza tal-exocrine tal-frixa (EPITT nru 19661)**

#### **Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott**

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Funzjoni pankreatika:

Insuffiċjenza tal-exocrine tal-frixa (PEI) ġiet osservata f'xi pazjenti li kienu qed jirċievu terapija b'octreotide għal tumuri newroendokrinali gastroenteropankreatiči. Is-sintomi tal-PEI jistgħu jinkludu steatorrea, ippurgar maħlul, nefha addominali u telf ta' piż. L-iskrinjar u l-kura xierqa għall-PEI skont il-linji gwida kliniči għandhom jiġu kkunsidrati f'pazjenti sintomatiki.

#### **Fuljett ta' tagħrif**

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu [isem il-prodott]

Testijiet u kontrolli

It-tabib tiegħek jista' jkun jixtieq jiċċekkja l-funzjoni tal-enzima tal-frixa tiegħek.