



6 April 2021¹
EMA/PRAC/167980/2021
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)

Kliem ġdid għal-informazzjoni dwar prodott – Siltiet mir-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjal

Adottati fil-PRAC tat-8-11 ta' Marzu 2021

Il-kliem tal-informazzjoni dwar il-prodott f'dan id-dokument huwa estratt mid-dokument bit-titlu 'Rakkomandazzjonijiet tal-PRAC dwar is-sinjal' li fih it-test sħiħ tar-rakkomandazzjonijiet tal-PRAC għall-aġġornament tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif ukoll xi gwida ġenerali dwar il-ġestjoni tas-sinjal. Jista' jinstab **hawnhekk** (bl-Ingliz biss).

It-test il-ġdid li għandu jiżdied mal-informazzjoni dwar il-prodott huwa sottolineat. It-test attwali li għandu jithassar huwa maqtugħ.

1. Anakinra; kanakinumab – Reazzjoni għall-mediċina b'esianfilja u sintomi sistemiċi (DRESS)(EPITT nru 19566)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

- Anakinra

Reazzjoni qħall-mediċina b'esianfilja u sintomi sistemiċi (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms - DRESS)

Reazzjoni qħall-mediċina b'esianfilja u b'sintomi sistemiċi (DRESS) rarament qiet irrappurtata f'pazjenti trattati b'Kineret, b'mod predominant f'pazjenti b'artrite idiopatika ġuvenili sistemika (systemic Juvenile Idiopathic Arthritis - sJIA). Pazjenti bi DRESS jista' jkollhom bżonn rikoveru l-isptar, minħabba li din il-kundizzjoni tista' tkun fatali. Jekk ikun hemm sinjal u sintomi ta' DRESS u ma tkunx tista' tiġi stabilita etjoloġija alternattiva, Kineret qħandu jitwaqqaf u qħandha jiġi kkunsidrat trattament differenti.

¹ Expected publication date. The actual publication date can be checked on the webpage dedicated to [PRAC recommendations on safety signals](#).



- Kanakinumab

Reazzjoni qħall-mediċina b'esianofilia u sintomi sistemiċi (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms - DRESS)

Reazzjoni qħall-mediċina b'esianofilia u sintomi sistemiċi (DRESS) rarament qiet irrappurtata f'pazjenti trattati b'Ilaris, b'mod predominant f'pazjenti b'artrite idjopatika ġuvenili sistemika (systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (sJIA)). Pazjenti bi DRESS jista' jkollhom bżonn rikoveru l-isptar, minħabba li din il-kundizzjoni tista' tkun fatali. Jekk ikun hemm sinjal u sintomi ta' DRESS u ma tkunx tista' tiġi stabbilita etjoloġija alternattiva, Ilaris ma qħandux jerqa' jingħata u qħandu jiġi kkunsidrattrattament differenti.

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża <isem il-prodott>

- Anakinra

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament.

- jekk qatt žviluppaqt raxx atipiku u mifrux jew tqaxxir tal-ċilda wara li tieħu Kineret.

Ir-reazzjoni serja tal-ċilda, DRESS (reazzjoni qħall-mediċina b'esianofilia u sintomi sistemiċi), rarament qiet irrapportata b'rabta ma' trattament b'Kineret, b'mod predominant f'pazjenti b'artrite idjopatika ġuvenili sistemika (sJIA). Fittex attenzjoni medika minnufih jekk tinnota raxx atipiku u mifrux, li jista' jseħħi flimkien ma' temperatura qħolja tal-ċisem u nodi limfatiċi minfuħin.

- Kanakinumab

Ikkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatament

- jekk qatt žviluppaqt raxx atipiku u mifrux jew tqaxxir tal-ċilda wara li tkun ħadt Ilaris.

Ir-reazzjoni serja tal-ċilda, DRESS (reazzjoni qħall-mediċina b'esianofilia u sintomi sistemiċi), rarament qiet irrappurtata b'rabta ma' trattament b'Ilaris, b'mod predominant f'pazjenti b'artrite idjopatika ġuvenili sistemika (sJIA). Fittex attenzjoni medika minnufih jekk tinnota raxx atipiku u mifrux, li jista' jseħħi flimkien ma' temperatura qħolja tal-ċisem u nodi limfatiċi minfuħin.

2. Vaċċin kontra I-COVID-19 (ChAdOx1-S [rikombinanti]) (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) – Reazzjoni anafilattika (EPITT nru 19668)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva u anafilassi

Ġew irrapportati avvenimenti ta' anafilassi.

[...]

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Disturbi fis-sistema immunitarja

Frekwenza "Mhux maqħrufa": Anafilassi; Sensittività eċċessiva

Fuljett ta' tagħrif

4. Effetti sekondarji possibbli

Frekwenza mhux maqħrufa:

- reazzjonijiet allerġiċi severi (anafilassi)
- sensittività eċċessiva

3. Trastuzumab emtansine – Ekstravażazzjoni u nekroži epidermali (EPITT nru 19611)

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.2. Pożologija u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoloġija

[...] Wara t-tqeħħid fis-suq ċew osservati każjijet ta' koriment epidermali mdewwem jew nekroži wara ekstravażazzjoni (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

4.4. Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

[...]

Reazzjonijiet relatati mal-infużjoni

[...]

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni:

Ekstravażazzjoni ta' trastuzumab emtansine waqt injezzjoni fil-vini tista' tipprodu u uqiqi lokali, leżjonijiet severi tat-tessut (eritema, infafet fil-ċilda) u nekroži epidermali. Jekk ikun hemm ekstravażazzjoni, l-infużjoni jeħtieq li titwaqqaf minnufih u l-pazjent jeħtieq li jiġi eżaminat regolarmen minħabba li tista' sseħħi nekroži fi żmien ftit őrgranet jew fi żmien ftit ćimqħat wara l-infużjoni.

4.8. Effetti mhux mixtieqa

Deskrizzjoni tar-reazzjonijiet avversi magħżula

[...]

Ekstravażazzjoni

[...] Wara t-tqeħħid fis-suq, qew osservati każijiet ta' koriment epidermali jew nekroži wara l-ekstravażazzjoni fi żmien ftit őranet jew ftit őimqħat wara l-infuzjoni. Trattament speċifiku għall-ekstravażazzjoni ta' trastuzumab emtansine mhux magħruf f'dan iż-żmien (ara sezzjoni 4.4).

Fuljett ta' tagħrif

2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata Kadycya

Għid lit-tabib jew infermier tiegħek minnufih jekk tinnota xi wieħed mill-effetti sekondarji serji ta' hawn fuq waqt li tkun qed tingħata Kadycya:

[...]

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni: Jekk thoss sensazzjoni ta' ħruq, thoss uqiqħ jew sensittivitā fis-sit tal-infuzjoni, dan jista' jindika li Kadycya qed inixxi 'l barra mill-vina. Kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek immedjatamente. Jekk Kadycya jkun nixxa 'l barra mill-vina, jista' jkun hemm żieda fl-uqiqħ, tibdil fil-kulur, infafet u tqaxxir fil-ġilda tiegħek (nekroži tal-ġilda) fi żmien ftit őranet jew ftit őimqħat wara l-infuzjoni.

4. Effetti sekondarji possibbi

Kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek minnufih jekk ikkollok xi wieħed mill-effetti sekondarji li ġejjin.

[...]

Frekwenza mhux maqħrufa:

Jekk is-soluzzjoni qħall-infuzjoni ta' Kadycya tnixxi fiż-żona madwar is-sit tal-infuzjoni inti tista' tiżviluppa uqiqħ, tibdil fil-kulur, infafet u tqaxxir fil-ġilda tiegħek (nekroži tal-ġilda) fis-sit tal-infuzjoni. Ikkuntattja lit-tabib jew lill-infermier tiegħek immedjatamente.