

| <b><u>Törzskönyvi (EU) szám</u></b> | <b><u>(Kereskedelmi) név</u></b> | <b><u>Hatásereősség</u></b> | <b><u>Gyógyszerforma</u></b> | <b><u>Az alkalmazás módja</u></b> | <b><u>Közvetlen csomagolás</u></b> | <b><u>Tartalom (koncentráció)</u></b> | <b><u>Kiszerezés</u></b>   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| EU/1/24/1795/001                    | Niapelf                          | 25 mg                       | Retard szuszpenziós injekció | Intramuszkuláris alkalmazás       | előretöltött fecskendő (COC)       | 0.25 ml (100 mg/ml)                   | 1 előretöltött fecskendő + 2 tű  |
| EU/1/24/1795/002                    | Niapelf                          | 50 mg                       | Retard szuszpenziós injekció | Intramuszkuláris alkalmazás       | előretöltött fecskendő (COC)       | 0.5 ml (100 mg/ml)                    | 1 előretöltött fecskendő + 2 tű  |
| EU/1/24/1795/003                    | Niapelf                          | 75 mg                       | Retard szuszpenziós injekció | Intramuszkuláris alkalmazás       | előretöltött fecskendő (COC)       | 0.75 ml (100 mg/ml)                   | 1 előretöltött fecskendő + 2 tű  |
| EU/1/24/1795/004                    | Niapelf                          | 100 mg                      | Retard szuszpenziós injekció | Intramuszkuláris alkalmazás       | előretöltött fecskendő (COC)       | 1 ml (100 mg/ml)                      | 1 előretöltött fecskendő + 2 tű  |
| EU/1/24/1795/005                    | Niapelf                          | 150 mg                      | Retard szuszpenziós injekció | Intramuszkuláris alkalmazás       | előretöltött fecskendő (COC)       | 1.5 ml (100 mg/ml)                    | 1 előretöltött fecskendő + 2 tű  |
| EU/1/24/1795/006                    | Niapelf                          | 150 mg / 100 mg             | Retard szuszpenziós injekció | Intramuszkuláris alkalmazás       | előretöltött fecskendő (COC)       | 1.5 ml + 1 ml (100 mg/ml)             | Kezdő csomag: 1 db 150 mg-os előretöltött fecskendő + 2 tű ; 1 előretöltött fecskendő + 2 tű |