

EU-Nummern	Phantasie- bezeichnung	Stärke	Darreichungs- form	Zieltier- art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungs- größe	Wartezeit
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine)	Durchstech- flasche (Glas)	100 ml	1 Durchstech- flasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine: 5 Tage
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	10 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	32 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	100 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Suspension Injektionslösung	Hunde und Katzen	subkutane oder intravenöse Anwendung (Hunde), subkutane Anwendung (Katzen)	Durchstech- flasche (Glas)	10 ml	1 Durchstech- flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine), intravenöse Anwendung (Pferde)	Durchstech- flasche (Glas)	50 ml	1 Durchstech- flasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung	Durchstech- flasche (Glas)	100 ml	1 Durchstech- flasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage

EU-Nummern	Phantasie- bezeichnung	Stärke	Darreichungs- form	Zieltier- art(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungs- größe	Wartezeit
					(Schweine) , intravenöse Anwendung (Pferde)				
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Pferde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	100 ml	1 Flasche	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder); intramuskuläre Anwendung (Schweine)	Durchstech- flasche (Glas)	100 ml	12 Durchstech- flaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine: 5 Tage
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Hunde und Katzen	subkutane oder intravenöse Anwendung (Hunde), subkutane Anwendung (Katzen)	Durchstech- flasche (Glas)	20 ml	1 Durchstech- flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	15 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	30 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine), intravenöse Anwendung (Pferde)	Durchstech- flasche (Glas)	50 ml	12 Durchstech- flaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage

EU-Nummern	Phantasiebezeichnung	Stärke	Darreichungsform	Zieltierart(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungsgröße	Wartezeit
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine), intravenöse Anwendung (Pferde)	Durchstechflasche (Glas)	100 ml	12 Durchstechflaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen, Meer-schweinchen	orale Anwendung	Polyethylenflasche	15 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine), intravenöse Anwendung (Pferde)	Durchstechflasche (Glas)	20 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine), intravenöse Anwendung (Pferde)	Durchstechflasche (Glas)	20 ml	12 Durchstechflaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Hunde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	180 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend

EU-Nummern	Phantasiebezeichnung	Stärke	Darreichungsform	Zieltierart(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungsgröße	Wartezeit
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Pferde	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	250 ml	1 Flasche	Essbare Gewebe: 3 Tage
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine), intravenöse Anwendung (Pferde)	Durchstechflasche (Glas)	250 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Injektionslösung	Rinder, Schweine und Pferde	Subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine), intravenöse Anwendung (Pferde)	Durchstechflasche (Glas)	250 ml	6 Durchstechflaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine und Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen, Meerschweinchen	orale Anwendung	Polyethylenflasche	10 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen, Meerschweinchen	orale Anwendung	Polyethylenflasche	3 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend

<b>EU-Nummern</b>	<b>Phantasie- bezeichnung</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungs- form</b>	<b>Zieltier- art(en)</b>	<b>Art der Anwendung</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Packungs- größe</b>	<b>Wartezeit</b>
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine)	Durchstech- flasche (Glas)	20 ml	1 Durchstech- flasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine: 5 Tage
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine)	Durchstech- flasche (Glas)	20 ml	12 Durchstech- flaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine: 5 Tage
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine)	Durchstech- flasche (Glas)	50 ml	1 Durchstech- flasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine: 5 Tage
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Schweine	subkutane oder intravenöse Anwendung (Rinder), intramuskuläre Anwendung (Schweine)	Durchstech- flasche (Glas)	50 ml	12 Durchstech- flaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Schweine: 5 Tage
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Injektionslösung	Katzen	subkutane Anwendung	Durchstech- flasche (Glas)	10 ml	1 Durchstech- flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Injektionslösung	Katzen	subkutane Anwendung	Durchstech- flasche (Glas)	20 ml	1 Durchstech- flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Schweine	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	100 ml	1 Flasche	Essbare Gewebe: 5 Tage

EU-Nummern	Phantasiebezeichnung	Stärke	Darreichungsform	Zieltierart(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungsgröße	Wartezeit
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Schweine	orale Anwendung	Flasche (Polyethylen)	250 ml	1 Flasche	Essbare Gewebe: 5 Tage
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Kautabletten	Hunde	orale Anwendung	Blisterpackungen (Alu/Alu)	7 Tbl.	1 Blisterpackung (7 Tbl.)	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Kautabletten	Hunde	orale Anwendung	Blisterpackungen (Alu/Alu)	7 Tbl.	12 Blisterpackungen (84 Tbl.)	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Kautabletten	Hunde	orale Anwendung	Blisterpackungen (Alu/Alu)	7 Tbl.	36 Blisterpackungen (252 Tbl.)	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Kautabletten	Hunde	orale Anwendung	Blisterpackungen (Alu/Alu)	7 Tbl.	1 Blisterpackung (7 Tbl.)	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Kautabletten	Hunde	orale Anwendung	Blisterpackungen (Alu/Alu)	7 Tbl.	12 Blisterpackungen (84 Tbl.)	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Kautabletten	Hunde	orale Anwendung	Blisterpackungen (Alu/Alu)	7 Tbl.	36 Blisterpackungen (252 Tbl.)	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension zum Eingeben	Katzen. Meerschweinchen	orale Anwendung	Polyethylenflasche	30 ml	1 Flasche	Nicht zutreffend
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Pferde	intravenöse Anwendung (Rinder und Pferde), subkutane Anwendung (Rinder)	Durchstechflasche (Glas)	50 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage (Rinder)

<b>EU-Nummern</b>	<b>Phantasie- bezeichnung</b>	<b>Stärke</b>	<b>Darreichungs- form</b>	<b>Zieltier- art(en)</b>	<b>Art der Anwendung</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Packungs- größe</b>	<b>Wartezeit</b>
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Pferde	intravenöse Anwendung (Rinder und Pferde), subkutane Anwendung (Rinder)	Durchstech- flasche (Glas)	100 ml	1 Durchstech- flasche	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage (Rinder)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Pferde	intravenöse Anwendung (Rinder und Pferde), subkutane Anwendung (Rinder)	Durchstech- flasche (Glas)	50 ml	12 Durchstech- flaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage (Rinder)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Injektionslösung	Rinder und Pferde	intravenöse Anwendung (Rinder und Pferde), subkutane Anwendung (Rinder)	Durchstech- flasche (Glas)	100 ml	12 Durchstech- flaschen	Essbare Gewebe: Rinder: 15 Tage Pferde: 5 Tage Milch: 5 Tage (Rinder)