

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/20/258/001	Increxxa	100 mg/ml	Solution inyectable	Bovino, porcino y ovino	Uso subcutáneo (bovino), uso intramuscular (porcino, ovino)	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: Bovino: 22 días; porcino: 13 días; Ovino: 16 días
EU/2/20/258/002	Increxxa	100 mg/ml	Solution inyectable	Bovino, porcino y ovino	Uso subcutáneo (bovino), uso intramuscular (porcino, ovino)	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: Bovino: 22 días; porcino: 13 días; Ovino: 16 días
EU/2/20/258/003	Increxxa	100 mg/ml	Solution inyectable	Bovino, porcino y ovino	Uso subcutáneo (bovino), uso intramuscular (porcino, ovino)	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: Bovino: 22 días; porcino: 13 días; Ovino: 16 días
EU/2/20/258/004	Increxxa	100 mg/ml	Solution inyectable	Bovino, porcino y ovino	Uso subcutáneo (bovino), uso intramuscular (porcino, ovino)	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Carne: Bovino: 22 días; porcino: 13 días; Ovino: 16 días
EU/2/20/258/005	Increxxa	100 mg/ml	Solution inyectable	Bovino	Uso subcutáneo	Vial (vidrio)	500 ml	1 vial	Carne: 22 días;
EU/2/20/258/006	Increxxa	25mg/ml	Solution inyectable	Porcino	Uso intramuscular	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 13 días
EU/2/20/258/007	Increxxa	25mg/ml	Solution inyectable	Porcino	Uso intramuscular	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 13 días
EU/2/20/258/008	Increxxa	25mg/ml	Solution inyectable	Porcino	Uso intramuscular	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Carne: 13 días