

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/97/004/001	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins et Porcins	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins); Voie intramusculaire (porcins)	Flacon (de verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/97/004/003	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	10 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/004	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	32 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/005	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	100 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/006	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Chiens et Chats	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (chiens), sous-cutanée (chats)	Flacon (de verre)	10 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/007	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins), intraveineuse (chevaux)	Flacon (de verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux) Lait : 5 jours
EU/2/97/004/008	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins), intraveineuse (chevaux)	Flacon (de verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux) Lait : 5 jours
EU/2/97/004/009	Metacam	15 mg/ml	Suspension orale	Chevaux	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 3 jours
EU/2/97/004/010	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins et Porcins	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins)	Flacon (de verre)	100 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/97/004/011	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Chiens et chats	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins)	Flacon (de verre)	20 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/012	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	15 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/013	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	30 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/014	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins), intraveineuse (chevaux)	Flacon (de verre)	50 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux) Lait : 5 jours
EU/2/97/004/015	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins), intraveineuse (chevaux)	Flacon (de verre)	100 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux) Lait : 5 jours
EU/2/97/004/026	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chats, cochons d'Inde	Voie orale	Polyéthylène flacon	15 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/027	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins), intraveineuse (chevaux)	Flacon (de verre)	20 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux) Lait : 5 jours
EU/2/97/004/028	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins),	Flacon (de verre)	20 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux)

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
					intraveineuse (chevaux)				Lait : 5 jours
EU/2/97/004/029	Metacam	1,5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	180 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/030	Metacam	15 mg/ml	Suspension orale	Chevaux	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: 3 jours
EU/2/97/004/031	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins), intraveineuse (chevaux)	Flacon (de verre)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux) Lait : 5 jours
EU/2/97/004/032	Metacam	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins), intraveineuse (chevaux)	Flacon (de verre)	250 ml	6 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins/chevaux) Lait : 5 jours
EU/2/97/004/033	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chats, cochons d'Inde	Voie orale	Polyéthylène flacon	10 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/034	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chats, cochons d'Inde	Voie orale	Polyéthylène flacon	3 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/035	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins, Porcins	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovin), intramusculaire (porcins)	Flacon (de verre)	20 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/97/004/036	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins, Porcins	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins)	Flacon (de verre)	20 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/97/004/037	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins, Porcins	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovins), intramusculaire (porcins)	Flacon (de verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/97/004/038	Metacam	5 mg/ml	Solution injectable	Bovins, Porcins	Voie sous-cutanée ou intraveineuse (bovin), intramusculaire (porcins)	Flacon (de verre)	50 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/97/004/039	Metacam	2 mg/ml	Solution injectable	Chats	Voie sous-cutanée	Flacon (de verre)	10 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/040	Metacam	2 mg/ml	Solution injectable	Chats	Voie sous-cutanée	Flacon (de verre)	20 ml	1 flacon	Sans objet
EU/2/97/004/041	Metacam	15 mg/ml	Suspension orale	Porcins	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 5 jours
EU/2/97/004/042	Metacam	15 mg/ml	Suspension orale	Porcins	Voie orale	Flacon (de polyéthylène)	250 ml	1 flacon	Viande et abats: 5 jours
EU/2/97/004/043	Metacam	1 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Voie orale	Plaquettes (AL/AL)	7 comprimés	1 plaquette (7 comprimés)	Sans objet
EU/2/97/004/044	Metacam	1 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Voie orale	Plaquettes (AL/AL)	7 comprimés	12 plaquettes (84 comprimés)	Sans objet
EU/2/97/004/045	Metacam	1 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Voie orale	Plaquettes (AL/AL)	7 comprimés	36 plaquettes (252 comprimés)	Sans objet
EU/2/97/004/046	Metacam	2,5 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Voie orale	Plaquettes (AL/AL)	7 comprimés	1 plaquette (7 comprimés)	Sans objet
EU/2/97/004/047	Metacam	2,5 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Voie orale	Plaquettes (AL/AL)	7 comprimés	12 plaquettes (84 comprimés)	Sans objet
EU/2/97/004/048	Metacam	2,5 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Voie orale	Plaquettes (AL/AL)	7 comprimés	36 plaquettes (252 comprimés)	Sans objet
EU/2/97/004/049	Metacam	0,5 mg/ml	Suspension orale	Chats, cochons d'Inde	Voie orale	Polyéthylène flacon	30 ml	1 flacon	Sans objet

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/97/004/050	Metacam	40 mg/ml	Solution injectable	Bovins et chevaux	Voie intraveineuse (bovins et chevaux), sous-cutanée (bovins)	Flacon (de verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (chevaux) Lait : 5 jours (bovins)
EU/2/97/004/051	Metacam	40 mg/ml	Solution injectable	Bovins et chevaux	Voie intraveineuse (bovins et chevaux), sous-cutanée (bovins)	Flacon (de verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (chevaux) Lait : 5 jours (bovins)
EU/2/97/004/052	Metacam	40 mg/ml	Solution injectable	Bovins et chevaux	Voie intraveineuse (bovins et chevaux), sous-cutanée (bovins)	Flacon (de verre)	50 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (chevaux) Lait : 5 jours (bovins)
EU/2/97/004/053	Metacam	40 mg/ml	Solution injectable	Bovins et chevaux	Voie intraveineuse (bovins et chevaux), sous-cutanée (bovins)	Flacon (de verre)	100 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (chevaux) Lait : 5 jours (bovins)