

| Numéro (AMM) UE | Nom de fantaisie | Dosage | Forme pharmaceutique | Espèces cibles | Voie d'administration | Conditionnement | Contenu | Taille de l'emballage | Temps d'attente |
|------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------------|--|
| EU/2/20/263/001 | Rexxolide | 100 mg/ml | Solution injectable | Bovins, porcins, ovins | Voie sous-cutanée (bovins), Voie intramusculaire (porcins et ovins) | Flacon (verre) | 50 ml | 1 flacon | Viande et abats : Bovins : 22 jours. Porcins : 13 jours. Ovins : 16 jours. |
| EU/2/20/263/002 | Rexxolide | 100 mg/ml | Solution injectable | Bovins, porcins, ovins | Voie sous-cutanée (bovins), Voie intramusculaire (porcins et ovins) | Flacon (verre) | 100 ml | 1 flacon | Viande et abats : Bovins : 22 jours. Porcins : 13 jours. Ovins : 16 jours. |
| EU/2/20/263/003 | Rexxolide | 100 mg/ml | Solution injectable | Bovins, porcins, ovins | Voie sous-cutanée (bovins), Voie intramusculaire (porcins et ovins) | Flacon (verre) | 250 ml | 1 flacon | Viande et abats : Bovins : 22 jours. Porcins : 13 jours. Ovins : 16 jours. |