

Numero EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, Suini e Ovini	Usosottocutaneo (bovini), Uso intramuscolare (suinie, ovini)	Flacone (vetro)	50 ml	1 flacone	Carne e visceri: Bovini: 22 giorni; Suini: 13 giorni; Ovini: 16 giorni
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, Suini e Ovini	Usosottocutaneo (bovini), Uso intramuscolare (suinie, ovini)	Flacone (vetro)	100 ml	1 flacone	Carne e visceri: Bovini: 22 giorni; Suini: 13 giorni; Ovini: 16 giorni
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, Suini e Ovini	Usosottocutaneo (bovini), Uso intramuscolare (suinie, ovini)	Flacone (vetro)	250 ml	1 flacone	Carne e visceri: Bovini: 22 giorni; Suini: 13 giorni; Ovini: 16 giorni