

Anness III

Emendi għas-sezzjonijiet rilevanti tal-informazzjoni dwar il-prodott

Nota:

Din l-informazzjoni dwar il-prodott hija r-riżultat tal-proċedura ta' riferiment li magħha hija relatata din id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

L-informazzjoni dwar il-prodott tista' sussegwentement tiġi aġġornata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru, flimkien mal-Istat Membru ta' Referenza, kif xieraq, f'konformità mal-proċeduri stabbiliti fil-Kapitolu 4 tat-Titolu III tad-Direttiva 2001/83/KE.

Emendi għat-taqsimiet rilevanti tal-informazzjoni tal-prodott

[Għall-prodotti kollha fl-Anness I, l-informazzjoni eżistenti dwar il-prodott għandha tiġi emendata (inserzjoni, sostituzzjoni jew tħassir tat-test, kif xieraq) biex tirrifletti l-kliem miftiehem kif ipprovdut hawn taht]

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

[Il-kontra-indikazzjonijiet li ġejjin għandhom jiddaħħlu]

- **Pressjoni għolja severa jew pressjoni għolja mhux ikkontrollata**
- **Mard tal-kliwi sever akut jew kroniku/insuffiċjenza renali**

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

[Għandha tiżdied twissija kif ġej]

Sindromu ta' enċefalopatija riversibbli ta' wara (PRES) u sindromu ta' vażokostrizzjoni ċerebrali riversibbli (RCVS)

Każijiet ta' PRES u RCVS ġew irrapportati bl-użu ta' prodotti li fihom pseudoephedrine (ara sezzjoni 4.8). Ir-riskju jiżdied f'pazjenti bi pressjoni għolja severa jew mhux ikkontrollata, jew b'mard tal-kliwi/insuffiċjenza renali akuta jew kronika severa (ara sezzjoni 4.3).

Pseudoephedrine għandu jitwaqqaf u tingħata għajnuna medika immedjata jekk iseñhu s-sintomi li ġejjin: uġiġħ ta' ras qawwi f'daqqa jew uġiġħ ta' ras b'ragħad, dardir, rimettar, konfużjoni, aċċessjonijiet u/jew disturbi fil-vista. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet irrapportati ta' PRES u RCVS solvew wara t-twaqqif u t-trattament xieraq.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

[Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin għandhom jiġu miżjuda jew riveduti taht is-SOC 'Disturbi fis-sistema nervuża' bi frekwenza 'Mhux magħrufa']

Sindromu ta' enċefalopatija riversibbli ta' wara (PRES) (ara sezzjoni 4.4)

Sindromu ta' vażokostrizzjoni ċerebrali riversibbli (RCVS) (ara session 4.4)

Fuljett ta' tagħrif

Sezzjoni 2. X'għandek tkun taf qabel tiegħu <Isem tal-Prodott>

Tiegħu/tużax <Isem tal-Prodott>

- jekk għandek pressjoni tad-demem għolja hafna (pressjoni għolja severa) jew pressjoni għolja mhux ikkontrollata mill-medikazzjoni tiegħek
- - jekk għandek mard tal-kliewi akut (f'daqqa) jew kroniku (fit-tul) sever jew insuffiċjenza tal-kliewi

Twissijiet u prekawzjonijiet

Każijiet ta' sindromu ta' enċefalopatija reversibbli posterjuri (PRES) u sindromu ta' vażokostrizzjoni ċerebrali reversibbli (RCVS) ġew irrappurtati wara l-użu ta' mediċini li fihom pseudoephedrine. PRES u RCVS huma kundizzjonijiet rari li jistgħu jinvolvu tnaqqis fil-provvista tad-demem għall-moħħ. Tiegħaf tuża <Isem tal-Prodott> immedjatament u fittex għajnuna medika immedjata jekk tiżviluppa sintomi li jistgħu jkunu sinjali ta' PRES jew RCVS (ara sezzjoni 4 "Effetti sekondarji possibbli" għas-sintomi)

Sezzjoni 4. Effetti sekondarji possibbli

[L-effett sekondarju l-aktar serju li ġej jeħtieġ li jiġi elenkat ***l-ewwel*** fis-sezzjoni 4]

Mhux magħruf: il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mid-dejta disponibbli

- kundizzjonijiet serji li jaffettwaw il-vini tad-demem fil-moħħ magħrufa bħala sindromu ta' enċefalopatija reversibbli posterjuri (PRES) u sindromu ta' vażokostrizzjoni ċerebrali reversibbli (RCVS)

Tiegħaf tuża <Isem tal-Prodott> immedjatament u fittex attenzjoni medika urġenti jekk tiżviluppa sintomi, li jistgħu jkunu sinjali ta' sindromu ta' enċefalopatija reversibbli posterjuri (PRES) u sindromu ta' vażokostrizzjoni ċerebrali reversibbli (RCVS).

- uqigħ ta' ras qawwi f'daqqa
- tħossok ma tiflaħx
- rimettar
- konfużjoni
- aċċessjonijiet
- bidliet fil-vista