

| MT (EU)-nummer | Legemidlets navn | Styrke | Legemiddelform | Dyreart | Administrasjons-vei | Pakning | Innhold | Paknings-størrelse | Tilbakeholdelsestid |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|---------|--------------------|--|
| EU/2/97/004/001 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe og gris | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris) | Hetteglass (glass) | 100 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris) |
| EU/2/97/004/003 | Metacam | 1,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hund | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 10 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/004 | Metacam | 1,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hund | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 32 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/005 | Metacam | 1,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hund | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 100 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/006 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Hund og katt | Subkutan eller intravenøs bruk (hund), subkutan bruk (katt) | Hetteglass (glass) | 10 ml | 1 hetteglass | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/007 | Metacam | 20 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 50 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |
| EU/2/97/004/008 | Metacam | 20 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 100 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |
| EU/2/97/004/009 | Metacam | 15 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hest | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 100 ml | 1 flaske | Slakt: 3 dager |
| EU/2/97/004/010 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe og gris | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris) | Hetteglass (glass) | 100 ml | 12 flasker | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris) |

| MT (EU)-nummer | Legemidlets navn | Styrke | Legemiddelform | Dyreart | Administrasjonsvei | Pakning | Innhold | Pakningsstørrelse | Tilbakeholdelsestid |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|---------|-------------------|--|
| EU/2/97/004/011 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Hund og katt | Subkutan eller intravenøs bruk (hund) , subkutan bruk (katt) | Hetteglass (glass) | 20 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/012 | Metacam | 0,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hund | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 15 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/013 | Metacam | 0,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hund | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 30 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/014 | Metacam | 20mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 50 ml | 12 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |
| EU/2/97/004/015 | Metacam | 20 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 100 ml | 12 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |
| EU/2/97/004/026 | Metacam | 0,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Katt, marsvin | Oral bruk | Polyetylen flaske | 15 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/027 | Metacam | 20 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 20 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |

| MT (EU)-nummer | Legemidlets navn | Styrke | Legemiddelform | Dyreart | Administrasjonsvei | Pakning | Innhold | Pakningsstørrelse | Tilbakeholdelsestid |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|---------|-------------------|--|
| EU/2/97/004/028 | Metacam | 20 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 20 ml | 12 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |
| EU/2/97/004/029 | Metacam | 1,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hund | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 180 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/030 | Metacam | 15 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Hest | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 250 ml | 1 flaske | Slakt: 3 dager |
| EU/2/97/004/031 | Metacam | 20 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 250 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |
| EU/2/97/004/032 | Metacam | 20 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris og hest | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris), intravenøs bruk (heste) | Hetteglass (glass) | 250 ml | 6 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris/ hest) Melk: 5 dager |
| EU/2/97/004/033 | Metacam | 0,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Katt, marsvin | Oral bruk | Polyetylen flaske | 10 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/034 | Metacam | 0,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Katt, marsvin | Oral bruk | Polyetylen flaske | 3 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/035 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris) | Hetteglass (glass) | 20 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris) |

| MT (EU)-nummer | Legemidlets navn | Styrke | Legemiddelform | Dyreart | Administrasjonsvei | Pakning | Innhold | Pakningsstørrelse | Tilbakeholdelsestid |
|-----------------|------------------|----------|-----------------------------|--------------|--|---------------------|-------------|----------------------------|--|
| EU72/97/004/036 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris) | Hetteglass (glass) | 20 ml | 12 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris) |
| EU72/97/004/037 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris) | Hetteglass (glass) | 50 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris) |
| EU72/97/004/038 | Metacam | 5 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe, gris | Subkutan eller intravenøs bruk (storfe), intramuskulær bruk (gris) | Hetteglass (glass) | 50 ml | 12 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (gris) |
| EU/2/97/004/039 | Metacam | 2 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Katt | Subkutan bruk | Hetteglass (glass) | 10 ml | 1 hetteglass | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/040 | Metacam | 2 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Katt | Subkutan bruk | Hetteglass (glass) | 20 ml | 1 hetteglass | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/041 | Metacam | 15 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Gris | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 100 ml | 1 flaske | Slakt: 5 dager |
| EU/2/97/004/042 | Metacam | 15 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Gris | Oral bruk | Flaske (polyetylen) | 250 ml | 1 flaske | Slakt: 5 dager |
| EU/2/97/004/043 | Metacam | 1 mg | Tyggetabletter | Hund | Oral bruk | Blister (Alu/Alu) | 7 tabletter | 1 blister (7 tabletter) | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/044 | Metacam | 1 mg | Tyggetabletter | Hund | Oral bruk | Blister (Alu/Alu) | 7 tabletter | 12 blister (84 tabletter) | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/045 | Metacam | 1 mg | Tyggetabletter | Hund | Oral bruk | Blister (Alu/Alu) | 7 tabletter | 36 blister (252 tabletter) | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/046 | Metacam | 2,5 mg | Tyggetabletter | Hund | Oral bruk | Blister (Alu/Alu) | 7 tabletter | 1 blister (7 tabletter) | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/047 | Metacam | 2,5 mg | Tyggetabletter | Hund | Oral bruk | Blister (Alu/Alu) | 7 tabletter | 12 blister (84 tabletter) | Ikke relevant |

| MT (EU)-nummer | Legemidlets navn | Styrke | Legemiddelform | Dyreart | Administrasjons-vei | Pakning | Innhold | Paknings-størrelse | Tilbake-holdelsestid |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------|----------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| EU/2/97/004/048 | Metacam | 2,5 mg | Tyggetabletter | Hund | Oral bruk | Blister (Alu/Alu) | 7 Tabletter | 36 blister (252 tabletter) | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/049 | Metacam | 0,5 mg/ml | Mikstur, suspensjon | Katt, marsvin | Oral bruk | Polyethylen flaske | 30 ml | 1 flaske | Ikke relevant |
| EU/2/97/004/050 | Metacam | 40 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe og hest | Intravenøs bruk (storfe og hest); Subkutan bruk (storfe) | Hetteglass (glass) | 50 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (hest) Melk: 5 dager (storfe) |
| EU/2/97/004/051 | Metacam | 40 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe og hest | Intravenøs bruk (storfe og hest); Subkutan bruk (storfe) | Hetteglass (glass) | 100 ml | 1 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (hest) Melk: 5 dager (storfe) |
| EU/2/97/004/052 | Metacam | 40 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe og hest | Intravenøs bruk (storfe og hest); Subkutan bruk (storfe) | Hetteglass (glass) | 50 ml | 12 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (hest) Melk: 5 dager (storfe) |
| EU/2/97/004/053 | Metacam | 40 mg/ml | Injeksjonsvæske, oppløsning | Storfe og hest | Intravenøs bruk (storfe og hest); Subkutan bruk (storfe) | Hetteglass (glass) | 100 ml | 12 hetteglass | Slakt: 15 dager (storfe), 5 dager (hest) Melk: 5 dager (storfe) |