

Процедурен номер	Търговско наименование На ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържани	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/12/144/001	Contacera	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, свине и коне	говеда s.c/i.v свине: s.c/i.v коне: i.v.	Безцветен стъклен флакон инжекция с гумена запушалка и пломбиран с алуминиево капаче	20 ml	1	говеда Месо и вътрешни органи: 15 дни. Мляко: 5 дни Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни. Коне: Месо и вътрешни органи 5 дни. Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка онсумация.
EU/2/12/144/002	Contacera	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, свине и коне	говеда s.c/i.v свине: s.c/i.v коне: i.v.	Безцветен стъклен флакон инжекция с гумена запушалка и пломбиран с алуминиево капаче	50 ml	1	говеда Месо и вътрешни органи: 15 дни. Мляко: 5 дни Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни. Коне: Месо и вътрешни органи 5 дни. Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
EU/2/12/144/003	Contacera	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, свине и коне	говеда s.c/i.v свине: s.c/i.v коне: i.v.	Безцветен стъклен флакон инжекция с гумена запушалка и пломбиран с	100 ml	1	говеда Месо и вътрешни органи: 15 дни. Мляко: 5 дни Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни.

						алуминиево капаче				Коне: Месо и вътрешни органи 5 дни. Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
EU/2/12/144/004	Contacera	20 mg/ml	Инжекционен разтвор	говеда, свине и коне	говеда s.c/i.v свине: s.c/i.v коне: i.v.	Безцветен стъклен флакон инжекция с гумена запушалка и пломбиран с алуминиево капаче	250 ml	1		говеда Месо и вътрешни органи: 15 дни. Мляко: 5 дни Свине: Месо и вътрешни органи: 5 дни. Коне: Месо и вътрешни органи 5 дни. Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.
EU/2/12/144/005	Contacera	15 mg/ml	перорална суспензия	коне	За перорална употреба.	Бутилка от полиетилен с висока плътност	100 ml	1		Месо и вътрешни органи: 3 дни.
EU/2/12/144/006	Contacera	15 mg/ml	перорална суспензия	коне	За перорална употреба.	Бутилка от полиетилен с висока плътност	250 ml	1		Месо и вътрешни органи: 3 дни.