

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (PET) jeringa (PP)	42 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (PET) jeringa (PP)	100 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (PET) jeringa (PP)	200 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensión oral	Perros	Vía oral	Frasco (HDPE) jeringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	Comprimidos masticables	Perros	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimidos (Dosis unitaria)	no es aplicable
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Oral	Frasco (HDPE)	100 ml	1 frasco + 1 jeringa	Carne: 3 días
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensión oral	Equino	Oral	jeringa (PP)	250 ml	1 frasco + 1 jeringa	Carne: 3 días
EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, cerdos y equino	Bovino: s.c./i.v. Cerdos: i.m. Equino: i.v.	viale (vidrio)	20 ml	1 viale	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, cerdos y equino	Bovino: s.c./i.v. Cerdos: i.m. Equino: i.v.	viale (vidrio)	50 ml	1 viale	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días

									(Cerdos)
EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, cerdos y equino	Bovino: s.c./i.v. Cerdos: i.m. Equino: i.v.	viale (vidrio)	100 ml	1 viale	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	solución inyectable	bovino, cerdos y equino	Bovino: s.c./i.v. Cerdos: i.m. Equino: i.v.	viale (vidrio)	250 ml	1 viale	Carne: 15 días (Bovino) Leche: 5 días (Bovino) Carne: 5 días (Equino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	solución inyectable	Perros y gatos	Perros: s.c./i.v. Gatos: s.c.	viale (vidrio)	10 ml	1 viale	no es aplicable
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	solución inyectable	Perros y gatos	Perros: s.c./i.v. Gatos: s.c.	viale (vidrio)	20 ml	1 viale	no es aplicable
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	solución inyectable	Perros y gatos	Perros: s.c./i.v. Gatos: s.c.	viale (vidrio)	100 ml	1 viale	no es aplicable
EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	solución inyectable	Bovino y cerdos	Bovinos: intravenosa o subcutánea Cerdos: intramuscular	viale (vidrio)	20 ml	1 viale	Carne: 15 días (Bovino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	solución inyectable	Bovino y cerdos	Bovinos: intravenosa o subcutánea Cerdos: intramuscular	viale (vidrio)	50 ml	1 viale	Carne: 15 días (Bovino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	solución inyectable	Bovino y cerdos	Bovinos: intravenosa o subcutánea Cerdos: intramuscular	viale (vidrio)	100 ml	1 viale	Carne: 15 días (Bovino) Carne: 5 días (Cerdos)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Granulado en sobre	Equino	Administración en el alimento.	Sobre (papel/PE/aluminio/PE)		100 sobres	Carne: 3 días
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensión	Gatos	Vía oral	Frasco (HDPE),	10 ml	1 frasco + 1	no es

			oral			jeringa (PP)		jeringa	aplicable
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos	Vía oral	Frasco (HDPE), jeringa (PP)	15 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos	Vía oral	Frasco (PP), jeringa (PP)	3 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensión oral	Gatos	Vía oral	Frasco (PP), jeringa (PP)	5 ml	1 frasco + 1 jeringa	no es aplicable
EU/2/07/078/026	Rheumocam	330 mg	Granulado en sobre	Equino	Administración en el alimento.	Sobre (papel/PE/aluminio/PE)		10 sobres	Carne: 3 días