



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/336458/2007
EMA/V/C/000040

Halocur (*halofuginoon*)

Ravimi Halocur ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Mis on Halocur ja milleks seda kasutatakse?

Halocur on veterinaarravim, mida kasutatakse vastsündinud vasikatel parasiidi *Cryptosporidium parvum* põhjustatud kõhulahtisuse ennetamiseks või vähendamiseks. *C. parvum* on ainurakne parasiit, mis tungib seedetrakti ja põhjustab kõhulahtisust. Infektsiooni nimetatakse krüptosporidioosiks.

Ravim sisaldab toimeainena halofuginooni.

Kuidas Halocuri kasutatakse?

Halocur on retseptiravim ja seda turustatakse suukaudse lahuseks. Ravimit antakse vastsündinud vasikatele üks kord ööpäevas ühe nädala jooksul. Kõhulahtisuse ennetamise ravi peab algama 24–48 tunni jooksul pärast sündi; kõhulahtisuse vähendamise ravi peab algama 24 tunni jooksul pärast kõhulahtisuse algust. Halocuri tuleb anda pärast söötmist.

Kui vajate Halocuriga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole.

Kuidas Halocur toimib?

Halocuri toimeaine halofuginoon takistab parasiidi *C. parvum* kasvu. Samuti piirab see haiguse levikut, takistades ootsüstide (parasiidi elutsükli teatud etapp) teket ja nende sattumist loomade väljaheitesse. Halofuginooni täpne toimemehhanism ei ole teada.

Milles seisneb uuringute põhjal Halocuri kasulikkus?

Eri põllumajandusettevõtete vasikatega tehti mitu väliuuringut. Ühte uuringusse kaasati 4–10päevased vasikad 40 põllumajandusettevõttest. Uuring tõendas, et ravi Halocuriga 7 järjestikuse päeva jooksul vähendab kõhulahtisust ja parasiidi *C. parvum* eritumist rohkem kui platseebo (näiv ravim). Teises uuringus, milles võrreldi Halocuri samuti platseeboga 24–48 tunni vanustel vasikatel, tõendati, et ravim on efektiivne parasiidi *C. parvum* põhjustatud kõhulahtisuse ennetamisel. Kõige kasulikumaks osutus varane ravi (24–48 tunni jooksul pärast sündi).

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



Mis riskid Halocuriga kaasnevad?

Halocuri ei tohi anda vasikatele, kellel kõhulahtisus on kestnud üle 24 tunni, ega nõrkadele loomadele.

Halocuri kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Halocuri korduv käsitlemine võib tekitada inimestel nahaallergiat. Kasutajad peavad vältima ravimi sattumist nahale ja silma. Nahale ja silma sattumisel tuleb ravimiga kokkupuutunud kohta põhjalikult pesta puhta veega. Kui silmaärritus püsib, tuleb pöörduda arsti poole. Ravimi käsitlemisel tuleb kanda kaitsekindaid ja pärast kasutamist pesta käsi.

Halocur ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teisele veeorganismidele. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel?

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha inimtoiduks tarvitada.

Halocuriga ravitud vastsündinud vasikate liha keeluaeg on 13 päeva.

Halocuri Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Euroopa Raviamet otsustas, et Halocuri kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita.

Muu teave Halocuri kohta

Halocuri müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 29. oktoobril 1999.

Lisateave ravimi Halocur kohta on ameti veebilehel:

ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2020.