

Numéro EU	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/11/134/001	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Usage Oral	Flacon (HDPE) seringue (PP)	15 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable
EU/2/11/134/002	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Usage Oral	Flacon (PET) seringue (PP)	42 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable
EU/2/11/134/003	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Usage Oral	Flacon (PET) seringue (PP)	100 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable
EU/2/11/134/004	Inflacam	1.5 mg/ml	Suspension orale	Chiens	Usage Oral	Flacon (PET) seringue (PP)	200 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable
EU/2/11/134/005	Inflacam	20 mg/ml	solution injectable	Bovins, chevaux et porcins	Usage sous-cutané, usage intraveineuse e usage intramusculaire	Flacons (verre)	20ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (Bovins) Lait : 5 jours (Bovins) Viande et abats: 5 jours (Chevaux) Viande et abats: 5 jours (Porcins)
EU/2/11/134/006	Inflacam	20 mg/ml	solution injectable	Bovins, chevaux et porcins	Usage sous-cutané, usage intraveineuse e usage intramusculaire	Flacons (verre)	50ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (Bovins) Lait : 5 jours (Bovins) Viande et abats: 5 jours (Chevaux) Viande et abats: 5 jours (Porcins)
EU/2/11/134/007	Inflacam	20 mg/ml	solution injectable	Bovins, chevaux et porcins	Usage sous-cutané, usage intraveineuse e usage intramusculaire	Flacons (verre)	100ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (Bovins) Lait : 5 jours (Bovins) Viande et abats: 5 jours (Chevaux) Viande et abats: 5 jours (Porcins)
EU/2/11/134/008	Inflacam	20 mg/ml	solution injectable	Bovins, chevaux et porcins	Usage sous-cutané, usage intraveineuse e usage	Flacons (verre)	250ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (Bovins) Lait : 5 jours

					intramusculaire				(Bovins) Viande et abats: 5 jours (Chevaux) Viande et abats: 5 jours (Porcins)
EU/2/11/134/009	Inflacam	15 mg/ml	Suspension orale	Chevaux	Orale	Flacon (HDPE) seringue (PP)	100 ml	1 flacon + 1 seringue	Viande et abats: 3 jours
EU/2/11/134/0010	Inflacam	15 mg/ml	Suspension orale	Chevaux	Orale	Flacon (HDPE) seringue (PP)	250 ml	1 flacon + 1 seringue	Viande et abats: 3 jours
EU/2/11/134/011	Inflacam	1 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimés Dose unitaire	Non applicable
EU/2/11/134/012	Inflacam	1 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimés Dose unitaire	Non applicable
EU/2/11/134/013	Inflacam	2.5 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Oral	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 comprimés Dose unitaire	Non applicable
EU/2/11/134/014	Inflacam	2.5 mg	Comprimés à croquer	Chiens	Oral	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 comprimés Dose unitaire	Non applicable
EU/2/11/134/015	Inflacam	5 mg/ml	solution injectable	Chiens et chats	Chiens : intraveineuse ou sous-cutanée Chats : sous- cutanée	Flacons (verre)	10 ml	1 flacon	Non applicable
EU/2/11/134/016	Inflacam	5 mg/ml	solution injectable	Chiens et chats	Chiens : intraveineuse ou sous-cutanée Chats : sous- cutanée	Flacons (verre)	20 ml	1 flacon	Non applicable
EU/2/11/134/017	Inflacam	5 mg/ml	solution injectable	Chiens et chats	Chiens : intraveineuse ou sous-cutanée Chats : sous- cutanée	Flacons (verre)	100 ml	1 flacon	Non applicable
EU/2/11/134/018	Inflacam	5 mg/ml	solution injectable	Bovins et porcins	Bovins : intraveineuse ou sous-cutanée Porcins : intramusculaire	Flacons (verre)	20 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (Bovins) Viande et abats: 5 jours (Porcins)

EU/2/11/134/019	Inflacam	5 mg/ml	solution injectable	Bovins et porcins	Bovins : intraveineuse ou sous-cutanée Porcins : intramusculaire	Flacons (verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (Bovins) Viande et abats: 5 jours (Porcins)
EU/2/11/134/020	Inflacam	5 mg/ml	solution injectable	Bovins et porcins	Bovins : intraveineuse ou sous-cutanée Porcins : intramusculaire	Flacons (verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (Bovins) Viande et abats: 5 jours (Porcins)
EU/2/11/134/021	Inflacam	330 mg	Granules	Chevaux	Pour utilisation dans l'alimentation.	Sachets (papier/PE/aluminium/PE)		100 sachets	Viande et abats : 3 jours
EU/2/11/134/022	Inflacam	330 mg	Granules	Chevaux	Pour utilisation dans l'alimentation.	Sachets (papier/PE/aluminium/PE)		20 sachets	Viande et abats : 3 jours
EU/2/11/134/023	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension orale	Chats	Usage Oral	Flacon (HDPE), seringue (PP)	10 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable
EU/2/11/134/024	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension orale	Chats	Usage Oral	Flacon (HDPE), seringue (PP)	15 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable
EU/2/11/134/025	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension orale	Chats	Usage Oral	Flacon (PP), seringue (PP)	3 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable
EU/2/11/134/026	Inflacam	0.5 mg/ml	Suspension orale	Chats	Usage Oral	Flacon (PP), seringue (PP)	5 ml	1 flacon + 1 seringue	Non applicable