

## Annexe A

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/11/135/002	Panacur AquaSol	200 mg/mL	Suspension buvable	Porcs et poulets	Utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (HDPE)	1 L	1 flacon	<p><u>Porcs:</u> Viande et abats: 4 jours</p> <p><u>Poulets:</u> Viande et abats: 6 jours pour 1 dose de 1 mg de fenbendazole/kg ; 9 jours pour 1 dose de 2 mg de fenbendazole//kg</p> <p>Œufs: zéro jour</p>
EU/2/11/135/003	Panacur AquaSol	200 mg/mL	Suspension buvable	Porcs et poulets	Utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (HDPE)	4 L	1 flacon	<p><u>Porcs:</u> Viande et abats: 4 jours</p> <p><u>Poulets:</u> Viande et abats: 6 jours pour 1 dose de 1 mg de fenbendazole/kg ; 9 jours pour 1 dose de 2 mg de fenbendazole//kg</p> <p>Œufs: zéro jour</p>