

Numéro AMM UE	Nom (de fantaisie)	Dosage	Forme pharmaceutique	Voie d'administration	Conditionnement primaire	Contenu	Présentation
EU/1/09/508/001	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie
EU/1/09/508/002	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies
EU/1/09/508/003	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie + 1 aiguille
EU/1/09/508/004	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	10 seringues préremplies + 10 aiguilles
EU/1/09/508/005	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	1 seringue préremplie + 2 aiguilles
EU/1/09/508/006	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	0,5 ml	1 flacon
EU/1/09/508/007	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	0,5 ml	10 flacons
EU/1/09/508/008	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	0,5 ml	100 flacons
EU/1/09/508/009	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	1 ml	100 flacons (multidose)
EU/1/09/508/010	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Seringue préremplie (verre)	0,5 ml	50 seringues préremplies
EU/1/09/508/012	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	2,0 ml	10 flacons (multidose)
EU/1/09/508/013	Synflorix	-- ¹	Suspension injectable	Voie intramusculaire	Flacon (verre)	2,0 ml	100 flacons (multidose)

--¹ Une dose de 0,5 ml contient :

Polysaccharide pneumococcique sérotype 1* ¹	1 microgramme
Polysaccharide pneumococcique sérotype 4* ¹	3 microgrammes
Polysaccharide pneumococcique sérotype 5* ¹	1 microgramme
Polysaccharide pneumococcique sérotype 6B* ¹	1 microgramme
Polysaccharide pneumococcique sérotype 7F* ¹	1 microgramme
Polysaccharide pneumococcique sérotype 9V* ¹	1 microgramme
Polysaccharide pneumococcique sérotype 14* ¹	1 microgramme
Polysaccharide pneumococcique sérotype 18C* ²	3 microgrammes
Polysaccharide pneumococcique sérotype 19F* ³	3 microgrammes
Polysaccharide pneumococcique sérotype 23F* ¹	1 microgramme

* adsorbé sur phosphate d'aluminium	0,5 milligramme Al ³⁺
¹ conjugué à la protéine vectrice D (dérivée de l' <i>Haemophilus influenzae</i> non typable)	9-16 microgrammes
² conjugué à la protéine vectrice de la anatoxine tétanique	5-10 microgrammes
³ conjugué à la protéine vectrice de la anatoxine diphtérique	3-6 microgrammes