

**ANNEXE I**

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

## 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Pluvicto 1 000 MBq/mL solution injectable/pour perfusion

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Un mL de solution contient 1 000 MBq de lutécium (<sup>177</sup>Lu) vipivotide tétraxétan à la date et à l'heure de la calibration.

La quantité totale de radioactivité par flacon unidose est de 7 400 MBq ± 10 % à la date et à l'heure de l'administration. L'activité volumique étant fixée à 1 000 MBq/mL à la date et à l'heure de la calibration, le volume de solution dans le flacon peut être ajusté entre 7,5 mL et 12,5 mL afin d'obtenir la quantité de radioactivité requise à la date et à l'heure de l'administration.

### Caractéristiques physiques

Le lutécium-177 se désintègre en un hafnium-177 stable avec une demi-vie physique de 6,647 jours en émettant un rayonnement bêta-moins avec une énergie maximale de 0,498 MeV (79 %) et un rayonnement photonique ( $\gamma$ ) de 0,208 MeV (11 %) et 0,113 MeV (6,4 %).

### Excipient à effet notoire :

Chaque mL de solution contient jusqu'à 0,312 mmol (7,1 mg) de sodium. Chaque flacon contient jusqu'à 88,75 mg de sodium.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution injectable/pour perfusion.

Solution transparente, incolore à légèrement jaune, pH : 4,5 à 7,0.

## 4. INFORMATIONS CLINIQUES

### 4.1 Indications thérapeutiques

Pluvicto en association avec une suppression androgénique et avec ou sans hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes est indiqué pour le traitement de patients adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration (CPRCm), progressif, positif à l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) qui ont été traités par hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes et par chimiothérapie à base de taxane (voir rubrique 5.1).

## 4.2 Posologie et mode d'administration

### Instructions de sécurité importantes

Pluvicto ne doit être administré que par des personnes autorisées à manipuler des produits radiopharmaceutiques dans un environnement clinique agréé (voir rubrique 6.6) et après évaluation du patient par un médecin qualifié.

Les produits radiopharmaceutiques, dont Pluvicto, doivent être utilisés par ou sous la supervision de professionnels de santé qualifiés, grâce à une formation spécifique et en raison de leurs expériences d'utilisation et de manipulation en toute sécurité des produits radiopharmaceutiques, et dont l'expérience et la formation ont été validées par l'autorité compétente appropriée autorisée à délivrer une autorisation d'utilisation des produits radiopharmaceutiques.

### Vérification de l'éligibilité des patients

Pour recevoir le traitement, les patients doivent être identifiés par une imagerie au PSMA.

### Posologie

Le schéma thérapeutique recommandé de Pluvicto est de 7 400 MBq par voie intraveineuse toutes les 6 semaines ( $\pm 1$  semaine) jusqu'à un maximum de 6 doses, à moins d'une progression de la maladie ou d'une toxicité inacceptable.

La castration chimique avec un analogue de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) doit être poursuivie pendant le traitement chez les patients non castrés chirurgicalement.

### Surveillance du traitement

Des analyses biologiques doivent être effectuées avant et pendant le traitement par Pluvicto. Il pourra être nécessaire de modifier la posologie en fonction des résultats d'analyse (voir tableau 1).

- Hématologie (hémoglobine, numération des globules blancs, nombre absolu de neutrophiles, numération plaquettaire)
- Fonction rénale (créatinine sérique, clairance de la créatinine [CLcr] calculée)
- Fonction hépatique (alanine aminotransférase, aspartate aminotransférase, phosphatase alcaline, albumine sérique, bilirubine sanguine totale)

### Adaptation de la dose en cas d'effets indésirables

Les modifications de dose de Pluvicto recommandées en cas d'effets indésirables sont présentées dans le tableau 1. La prise en charge des effets indésirables sévères ou intolérables peut nécessiter une interruption temporaire de dose (en prolongeant l'intervalle d'administration de 4 semaines, le faisant passer de 6 semaines jusqu'à 10 semaines), une diminution de la dose ou l'arrêt définitif du traitement par Pluvicto. Si le traitement est différé pendant plus de 4 semaines et que l'effet indésirable persiste, le traitement par Pluvicto doit être arrêté. La dose de Pluvicto peut être réduite de 20 % une fois ; la dose ne doit pas être réaugmentée. Si un patient présente des effets indésirables qui nécessiteraient une diminution supplémentaire de la dose, le traitement par Pluvicto doit être arrêté.

**Tableau 1 Modifications de dose de Pluvicto recommandées en cas d'effets indésirables**

<b>Effet indésirable</b>	<b>Sévérité<sup>a</sup></b>	<b>Modification de la dose</b>
Sécheresse buccale	Grade 3	Diminuer la dose de Pluvicto de 20 %.
Toxicité gastro-intestinale	Grade $\geq$ 3 (non gérable par une intervention médicale)	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration à un grade 2 ou retour à l'état initial. Diminuer la dose de Pluvicto de 20 %.
Anémie, thrombopénie, leucopénie, neutropénie, pancytopénie	Grade 2	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration à un grade 1 ou retour à l'état initial. Prendre en charge selon ce qui est jugé approprié. L'utilisation de facteurs de croissance est autorisée mais doit être arrêtée après amélioration à un grade 1 ou retour à l'état initial. Vérification des paramètres hématiniques (fer, B12 et folate) ; une supplémentation est préconisée. Des transfusions peuvent être administrées si cliniquement indiquées.
	Grade $\geq$ 3	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration à un grade 1 ou retour à l'état initial. Diminuer la dose de Pluvicto de 20 %.
Toxicité rénale	Définie comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation confirmée de la créatinine sérique (grade <math>\geq</math> 2)</li> <li>• CLcr confirmée <math>&lt;</math> 50 mL/min ; calculée avec la formule de Cockcroft-Gault et le poids corporel actuel</li> </ul>	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration.
	Définie comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation confirmée <math>\geq</math> 40 % de la créatinine sérique par rapport à l'état initial</li> </ul> <u>et</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminution confirmée <math>&gt;</math> 40 % par rapport à la CLcr à l'état initial ; calculée avec la formule de Cockcroft-Gault et le poids corporel actuel</li> </ul>	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration ou retour à l'état initial. Diminuer la dose de Pluvicto de 20 %.
	Toxicité rénale récurrente (grade $\geq$ 3)	Arrêter définitivement Pluvicto.
Compression de la moelle épinière	Tous grades	Suspendre Pluvicto jusqu'à ce que la compression ait été traitée de manière adéquate, que les éventuelles séquelles neurologiques soient stabilisées et que l'indice de performance ECOG se soit stabilisé.

Fracture du squelette axial	Tous grades	Suspendre Pluvicto jusqu'à ce que la fracture soit stabilisée/traitée de manière adéquate et que l'indice de performance ECOG se soit stabilisé.
Fatigue	Grade $\geq 3$	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration à un grade 2 ou retour à l'état initial.
Anomalies électrolytiques ou métaboliques	Grade $\geq 2$	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration à un grade 1 ou retour à l'état initial.
Toxicité non-hématologique (cliniquement significatif, sauf indication contraire)	Grade $\geq 2$	Suspendre Pluvicto jusqu'à amélioration à un grade 1 ou retour à l'état initial.
Élévation de l'ASAT ou de l'ALAT	ASAT ou ALAT $> 5$ fois la LSN en l'absence de métastases hépatiques	Arrêter définitivement Pluvicto.
<p>Abréviations : CLcr, clairance de la créatinine ; ECOG, <i>Eastern Cooperative Oncology Group</i> ; ASAT, aspartate aminotransférase ; ALAT, alanine aminotransférase ; LSN, limite supérieure de la normale. Grade déterminé conformément aux critères actuels communs de terminologie pour les événements indésirables (CTCAE).</p> <p><sup>a</sup> Les mêmes seuils s'appliquent aussi aux valeurs à l'état initial au moment de l'instauration du traitement par Pluvicto.</p>		

### Populations particulières

#### *Sujets âgés*

Aucun ajustement de dose n'est recommandé chez les patients âgés de 65 ans ou plus.

#### *Insuffisance rénale*

Aucun ajustement de dose n'est recommandé chez les patients atteints d'insuffisance rénale légère à modérée avec une CLcr à l'état initial  $\geq 50$  mL/min selon la formule de Cockcroft-Gault. Le traitement par Pluvicto n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance rénale modérée à sévère avec une CLcr à l'état initial  $< 50$  mL/min ou d'insuffisance rénale terminale, car le profil pharmacocinétique et la tolérance de Pluvicto n'ont pas été étudiés chez ces patients (voir rubriques 4.4 et 5.2).

#### *Insuffisance hépatique*

Aucun ajustement de dose n'est recommandé chez les patients atteints d'insuffisance hépatique. Pluvicto n'a pas été étudié chez les patients atteints d'insuffisance hépatique modérée à sévère (voir rubrique 5.2).

#### *Population pédiatrique*

Il n'existe pas d'utilisation justifiée de Pluvicto dans la population pédiatrique dans l'indication du traitement du cancer de la prostate exprimant le PSMA.

## Mode d'administration

Pluvicto est une solution injectable/pour perfusion prête à l'emploi, à usage unique exclusivement.

### Instructions pour l'administration

La dose recommandée de Pluvicto peut être administrée par voie intraveineuse sous forme d'injection avec une seringue jetable équipée d'un protège-seringue (avec ou sans pousse-seringue), en perfusion en utilisant la méthode par gravité (avec ou sans pompe à perfusion), ou en perfusion en utilisant le flacon (avec une pompe à perfusion péristaltique).

Une dose réduite de Pluvicto doit être administrée en utilisant la méthode avec la seringue (avec ou sans pousse-seringue) ou le flacon (avec une pompe à perfusion péristaltique). Il n'est pas recommandé d'utiliser la méthode par gravité pour administrer une dose réduite de Pluvicto, car cela pourrait entraîner l'administration d'un volume incorrect de Pluvicto si la dose n'est pas ajustée avant administration.

Avant administration, rincer le cathéter intraveineux utilisé exclusivement pour l'administration de Pluvicto avec une solution  $\geq 10$  mL injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) pour vérifier sa perméabilité et minimiser le risque d'extravasation. Les cas d'extravasation doivent être pris en charge conformément aux directives de l'établissement. Il conviendra de conseiller aux patients de rester bien hydratés et d'uriner fréquemment avant et après administration de Pluvicto (voir rubrique 4.4).

Pour les instructions concernant la méthode de préparation et les méthodes d'administration par voie intraveineuse, voir la rubrique 12.

Pour la préparation du patient, voir la rubrique 4.4.

## **4.3 Contre-indications**

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

## **4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi**

### Bénéfice individuel/justification des risques

Pour chaque patient, l'exposition au rayonnement doit être justifiée par le bénéfice attendu. L'activité administrée doit dans tous les cas être la plus faible dose de rayonnement pour l'obtention de l'effet thérapeutique recherché.

### Risque lié à l'exposition aux rayonnements

Pluvicto entraîne une exposition cumulée et à long terme du patient aux rayonnements. Une exposition cumulée aux rayonnements à long terme est associée à un risque accru de cancer.

L'exposition aux rayonnements des patients, du personnel médical et des personnes du foyer doit être minimisée pendant et après le traitement par Pluvicto, conformément aux bonnes pratiques de radioprotection de l'établissement, aux procédures de prise en charge des patients et aux instructions de suivi de radioprotection au domicile fournies au patient.

### Préparation du patient

Les patients doivent être encouragés à consommer plus de liquides par voie orale et être incités à uriner aussi souvent que possible pour réduire l'exposition de la vessie aux rayonnements, en particulier après des activités élevées, p. ex., thérapie par radionucléide.

### Après la procédure

Avant la sortie du patient, le médecin spécialiste en médecine nucléaire ou le professionnel de santé doit expliquer au patient les précautions nécessaires de radioprotection à suivre pour minimiser l'exposition d'autres personnes aux rayonnements.

Après chaque administration de Pluvicto, les recommandations générales suivantes relatives au patient peuvent être envisagées en accord avec les procédures et réglementations nationales, locales et institutionnelles.

- Limiter les contacts proches (à moins d'1 mètre) avec les autres personnes du foyer pendant 2 jours, ou avec les enfants et les femmes enceintes pendant 7 jours.
- Ne pas avoir d'activité sexuelle pendant 7 jours.
- Dormir dans une chambre séparée de celle des autres personnes du foyer pendant 3 jours, des enfants pendant 7 jours ou des femmes enceintes pendant 15 jours.

### Myélosuppression

Dans l'étude VISION, une myélosuppression, y compris des cas fatals, est survenue plus fréquemment chez les patients recevant Pluvicto en association avec le meilleur soin de référence (BSoC) que chez les patients recevant le BSoC seul (voir rubrique 4.8).

Des analyses hématologiques incluant hémoglobine, numération des globules blancs, nombre absolu de neutrophiles et numération plaquettaire, doivent être réalisées avant et pendant le traitement par Pluvicto. Pluvicto doit être suspendu, la dose réduite ou le traitement définitivement arrêté, et les patients doivent bénéficier d'une prise en charge clinique selon ce qui est jugé approprié en fonction de la sévérité de la myélosuppression (voir rubrique 4.2).

### Toxicité rénale

Dans l'étude VISION, une toxicité rénale est survenue plus fréquemment chez les patients recevant Pluvicto en association avec le BSoC que chez les patients recevant le BSoC seul (voir rubrique 4.8).

Avant et après administration de Pluvicto, les patients doivent être encouragés à consommer plus de liquides par voie orale et être incités à uriner aussi souvent que possible, en particulier après des activités élevées, p. ex., thérapie par radionucléide. Des analyses de la fonction rénale, incluant créatinine sérique et CLcr calculée, doivent être réalisées avant et pendant le traitement par Pluvicto. Le traitement par Pluvicto doit être suspendu, la dose réduite ou le traitement définitivement arrêté, selon la sévérité de la toxicité rénale (voir rubrique 4.2).

### Insuffisance rénale/hépatique

Une évaluation soigneuse du rapport bénéfice-risque chez ces patients est requise, en raison d'une possible augmentation de l'exposition aux rayonnements.

L'exposition (ASC) au lutécium (<sup>177</sup>Lu) vipivotide tétraxétan devrait augmenter avec le degré d'insuffisance rénale (voir rubrique 5.2). Les patients atteints d'insuffisance rénale légère ou modérée pourraient être exposés à un plus grand risque de toxicité. La fonction rénale et les effets indésirables doivent être surveillés fréquemment chez les patients atteints d'insuffisance rénale légère à modérée (voir rubrique 4.2). Le traitement par Pluvicto n'est pas recommandé chez les patients atteints d'insuffisance rénale modérée à sévère avec une CLcr à l'état initial < 50 mL/min ou d'insuffisance rénale terminale.

## Fertilité

Les rayonnements du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan peuvent avoir potentiellement des effets toxiques sur les gonades mâles et la spermatogenèse. La dose cumulée recommandée de 44 400 MBq de Pluvicto donne lieu à une dose de rayonnement absorbée au niveau des testicules comprise dans l'intervalle où Pluvicto peut provoquer une infertilité. Une consultation génétique est recommandée si le patient souhaite avoir des enfants après le traitement. La cryoconservation du sperme peut être envisagée pour les hommes avant le traitement (voir rubrique 4.6).

## Contraception chez les hommes

Il est conseillé aux patients de sexe masculin de ne pas concevoir d'enfant et d'utiliser un préservatif lors des rapports sexuels pendant le traitement par Pluvicto et pendant 14 semaines après la dernière dose (voir rubrique 4.6).

## Mises en garde particulières

### Teneur en sodium

Ce médicament contient jusqu'à 3,9 mmol (88,75 mg) de sodium par flacon, ce qui équivaut à 4,4 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé par l'OMS de 2 g de sodium pour un adulte.

Pour les précautions vis-à-vis des risques environnementaux, voir rubrique 6.6.

## **4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions**

Aucune étude clinique d'interaction médicamenteuse n'a été réalisée.

## **4.6 Fertilité, grossesse et allaitement**

### Contraception chez l'homme

En raison d'effets potentiels sur la spermatogenèse liés aux rayonnements du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan, il est conseillé aux patients de sexe masculin de ne pas concevoir d'enfant et d'utiliser un préservatif lors des rapports sexuels pendant le traitement par Pluvicto et pendant 14 semaines après la dernière dose (voir rubrique 4.4).

### Grossesse

Pluvicto n'est pas indiqué chez la femme. Aucune étude chez l'animal n'a été menée pour déterminer les effets du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan sur la fonction reproductrice et le développement embryofœtal. Cependant, tous les produits radiopharmaceutiques, y compris Pluvicto, ont le potentiel d'affecter le fœtus lorsqu'ils sont administrés à une femme enceinte.

### Allaitement

Pluvicto n'est pas indiqué chez la femme. Aucune donnée n'est disponible concernant la présence de lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan dans le lait maternel, sur ses effets sur le nouveau-né/nourrisson allaité ou sur la production de lait.



## Fertilité

Aucune étude n'a été menée pour déterminer les effets du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan sur la fertilité. Les rayonnements du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan peuvent avoir potentiellement des effets toxiques sur les gonades mâles et la spermatogenèse. La dose cumulée recommandée de 44 400 MBq de Pluvicto donne lieu à une dose de rayonnement absorbée au niveau des testicules comprise dans l'intervalle où Pluvicto peut provoquer une infertilité. Une consultation génétique est recommandée si le patient souhaite avoir des enfants après le traitement. La cryoconservation de sperme peut être envisagée pour les hommes avant le traitement (voir rubrique 4.4).

### **4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

Pluvicto peut avoir une influence mineure sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### **4.8 Effets indésirables**

#### Résumé du profil de sécurité

Sauf indication contraire, la fréquence des effets indésirables listés est fondée sur les données de l'étude VISION dans laquelle 529 patients ont reçu au moins une dose de 7 400 MBq (le nombre médian de doses a été de cinq).

Les effets indésirables les plus fréquents incluent : fatigue (43,1 %), sécheresse buccale (39,3 %), nausées (35,3 %), anémie (31,8 %), diminution de l'appétit (21,2 %) et constipation (20,2 %). Les effets indésirables de grade 3 à 4 les plus fréquents incluent : anémie (12,9 %), thrombopénie (7,9 %), lymphopénie (7,8 %) et fatigue (5,9 %).

#### Tableau récapitulatif des effets indésirables

Les effets indésirables (tableau 2) sont présentés par classe de systèmes d'organes MedDRA. Au sein de chaque classe de systèmes d'organes, les effets indésirables sont classés par ordre de fréquence, les effets les plus fréquents apparaissant en premier. De plus, la catégorie de fréquence de chaque effet indésirable est fondée sur la convention suivante (CIOMS III) : très fréquent ( $\geq 1/10$ ) ; fréquent ( $\geq 1/100$  à  $< 1/10$ ) ; peu fréquent ( $\geq 1/1\ 000$  à  $< 1/100$ ) ; rare ( $\geq 1/10\ 000$  à  $< 1/1\ 000$ ) ; très rare ( $< 1/10\ 000$ ).

**Tableau 2 Effets indésirables survenus avec une incidence plus élevée chez les patients ayant reçu Pluvicto en association avec le BSoC que chez les patients ayant reçu le BSoC seul dans l'étude VISION<sup>a</sup>**

Classe de systèmes d'organes Effet indésirable	Catégorie de fréquence	Tous grades n (%)	Grades 3 à 4 <sup>b</sup> n (%)
<b>Affections hématologiques et du système lymphatique</b>			
Anémie	Très fréquent	168 (31,8)	68 (12,9)
Thrombopénie	Très fréquent	91 (17,2)	42 (7,9)
Leucopénie <sup>c</sup>	Très fréquent	83 (15,7)	22 (4,2)
Lymphopénie	Très fréquent	75 (14,2)	41 (7,8)
Pancytopenie <sup>d</sup>	Fréquent	9 (1,7)	7 (1,3) <sup>b</sup>
<b>Affections du système nerveux</b>			
Étourdissements	Fréquent	44 (8,3)	5 (0,9)
Céphalée	Fréquent	37 (7,0)	4 (0,8)
Dysgueusie <sup>e</sup>	Fréquent	37 (7,0)	0 (0,0)
<b>Affections oculaires</b>			
Sécheresse oculaire	Fréquent	16 (3,0)	0 (0,0)
<b>Affections de l'oreille et du labyrinthe</b>			
Vertiges	Fréquent	11 (2,1)	0 (0,0)
<b>Affections gastro-intestinales</b>			
Sécheresse buccale <sup>f</sup>	Très fréquent	208 (39,3)	0 (0,0)
Nausées	Très fréquent	187 (35,3)	7 (1,3)
Constipation	Très fréquent	107 (20,2)	6 (1,1)
Vomissement <sup>g</sup>	Très fréquent	101 (19,1)	5 (0,9)
Diarrhée	Très fréquent	100 (18,9)	4 (0,8)
Douleur abdominale <sup>h</sup>	Très fréquent	59 (11,2)	6 (1,1)
<b>Affections du rein et des voies urinaires</b>			
Infection des voies urinaires <sup>i</sup>	Très fréquent	61 (11,5)	20 (3,8)
Insuffisance rénale aiguë <sup>j</sup>	Fréquent	45 (8,5)	17 (3,2)
<b>Troubles généraux et anomalies au site d'administration</b>			
Fatigue	Très fréquent	228 (43,1)	31 (5,9)
Diminution de l'appétit	Très fréquent	112 (21,2)	10 (1,9)
Perte de poids	Très fréquent	57 (10,8)	2 (0,4)
Œdème périphérique <sup>k</sup>	Fréquent	52 (9,8)	2 (0,4)
Pyrexie	Fréquent	36 (6,8)	2 (0,4)
Abréviation : BSoC ( <i>best standard of care</i> = meilleur soin de référence).			
<sup>a</sup> Critères communs de terminologie de l'Institut National contre le Cancer pour les événements indésirables (NCI CTCAE), version 5.0			
<sup>b</sup> Inclut seulement les effets indésirables de grade 3 à 4, à l'exception de la pancytopenie. Une pancytopenie de grade 5 (fatale) a été rapportée chez 2 patients qui ont reçu Pluvicto en association avec le BSoC.			
<sup>c</sup> Leucopénie inclut leucopénie et neutropénie.			
<sup>d</sup> Pancytopenie inclut pancytopenie et bicytopenie.			
<sup>e</sup> Dysgueusie inclut dysgueusie et trouble du goût.			
<sup>f</sup> Sécheresse buccale inclut sécheresse buccale, apyalisme et gorge sèche.			
<sup>g</sup> Vomissement inclut vomissement et haut-le-cœur.			
<sup>h</sup> Douleur abdominale inclut douleur abdominale, douleur abdominale haute, inconfort abdominal, douleur abdominale basse, sensibilité abdominale et douleur gastro-intestinale.			
<sup>i</sup> Infection des voies urinaires inclut infection des voies urinaires, cystite et cystite bactérienne.			
<sup>j</sup> Insuffisance rénale aiguë inclut augmentation de la créatinine sanguine, insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale et augmentation de l'urée sanguine.			
<sup>k</sup> Œdème périphérique inclut œdème périphérique, rétention de fluide et surcharge volémique.			

## Description de certains effets indésirables

### Myélosuppression

Dans l'étude VISION, une myélosuppression est survenue plus fréquemment chez les patients ayant reçu Pluvicto en association avec le BSoC que chez les patients ayant reçu le BSoC seul (tous grades/grade  $\geq 3$ ) : anémie (31,8 %/12,9 %) *versus* (13,2 %/4,9 %) ; thrombopénie (17,2 %/7,9 %) *versus* (4,4 %/1,0 %) ; leucopénie (12,5 %/2,5 %) *versus* (2,0 %/0,5 %) ; lymphopénie (14,2 %/7,8 %) *versus* (3,9 %/0,5 %) ; neutropénie (8,5 %/3,4 %) *versus* (1,5 %/0,5 %) ; pancytopénie (1,5 %/1,1 %) *versus* (0 %/0 %), dont deux événements fatals de pancytopénie chez des patients ayant reçu Pluvicto en association avec le BSoC ; et bicytopenie (0,2 %/0,2 %) *versus* (0 %/0 %).

Les effets indésirables de myélosuppression ayant entraîné l'arrêt définitif du traitement chez  $\geq 0,5$  % des patients recevant Pluvicto en association avec le BSoC incluent : anémie (2,8 %), thrombopénie (2,8 %), leucopénie (1,3 %), neutropénie (0,8 %) et pancytopenie (0,6 %). Les effets indésirables de myélosuppression ayant entraîné des interruptions de l'administration/diminutions de dose chez  $\geq 0,5$  % des patients recevant Pluvicto en association avec le BSoC incluent : anémie (5,1 %/1,3 %), thrombopénie (3,6 %/1,9 %), leucopénie (1,5 %/0,6 %) et neutropénie (0,8 %/0,6 %).

### Toxicité rénale

Dans l'étude VISION, la toxicité rénale est survenue plus fréquemment chez les patients recevant Pluvicto en association avec le BSoC que chez les patients recevant le BSoC seul (tous grades/grades 3 à 4) : augmentation de la créatinine sanguine (5,3 %/0,2 %) *versus* (2,4 %/0,5 %) ; insuffisance rénale aiguë (3,6 %/3,0 %) *versus* (3,9 %/2,4 %) ; insuffisance rénale (0,2 %/0 %) *versus* (0 %/0 %) et augmentation de l'urée sanguine (0,2 %/0 %) *versus* (0 %/0 %).

Les effets indésirables rénaux qui ont entraîné l'arrêt définitif du traitement chez  $\geq 0,2$  % des patients recevant Pluvicto en association avec le BSoC incluaient : augmentation de la créatinine sanguine (0,2 %). Les effets indésirables rénaux ayant entraîné des interruptions de l'administration/diminutions de dose chez  $\geq 0,2$  % des patients recevant Pluvicto en association avec le BSoC incluaient : augmentation de la créatinine sanguine (0,2 %/0,4 %) et insuffisance rénale aiguë (0,2 %/0 %).

### Seconds cancers primitifs

L'exposition aux rayonnements ionisants est liée au développement potentiel de cancers et d'anomalies héréditaires. La dose de rayonnement résultant d'une exposition thérapeutique peut entraîner une incidence plus élevée de cancers et de mutations. Dans tous les cas, il convient de s'assurer que les risques liés aux rayonnements sont moindres que ceux de la maladie elle-même. Etant donné que Pluvicto entraîne une exposition cumulée et à long terme du patient aux rayonnements qui est associée à un risque accru de cancer (voir rubrique 4.4), un risque potentiel de second cancer primitif ne peut être exclu pour des produits radiopharmaceutiques tels que Pluvicto. Au moment de l'analyse primaire de VISION (date de clôture le 27-Jan-2021), des cas de carcinome épidermoïde (4 patients ; 0,8 %) et de carcinome basocellulaire, de mélanome malin et de carcinome épidermoïde de la peau (1 patient chacun ; 0,2 % chacun) ont été rapportés chez les patients ayant reçu Pluvicto en association avec le BSoC.

### Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir [Annexe V](#).

## **4.9 Surdosage**

En cas d'administration d'un surdosage de rayonnement avec Pluvicto, la dose absorbée par le patient doit être réduite lorsque c'est possible en augmentant l'élimination du radionucléide par l'organisme par des mictions fréquentes ou par diurèse forcée et évacuation fréquente de la vessie. Il peut être utile d'estimer la dose réelle administrée.

## 5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

### 5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : Produits radiopharmaceutiques thérapeutiques, Autres produits radiopharmaceutiques thérapeutiques, code ATC : V10XX05

#### Mécanisme d'action

La fraction active de Pluvicto est le radionucléide lutécium-177 qui est lié à une petite molécule ligand qui cible et se lie avec une forte affinité au PSMA, une protéine transmembranaire fortement exprimée dans le cancer de la prostate, dont le CPRCm. Lors de la liaison de Pluvicto aux cellules cancéreuses exprimant le PSMA, l'émission bêta-moins émise par le lutécium-177 délivre un rayonnement thérapeutique à la cellule cible et aux cellules qui l'entourent, ce qui induit des lésions de l'ADN pouvant causer la mort cellulaire.

#### Effets pharmacodynamiques

Le vipivotide tétraxétan non marqué ne présente aucune activité pharmacodynamique.

#### Efficacité et sécurité cliniques

##### VISION

L'efficacité de Pluvicto chez des patients atteints d'un CPRCm progressif, positif au PSMA a été évaluée dans VISION, une étude de phase III randomisée, multicentrique, en ouvert. Huit-cent trente et un patients adultes (N=831) ont été randomisés (2:1) pour recevoir soit Pluvicto 7 400 MBq toutes les 6 semaines, jusqu'à un maximum de 6 doses, en association avec le meilleur soin de référence (BSoC) (N=551), soit le BSoC seul (N=280). Les patients ayant reçu 4 doses de Pluvicto ont été réévalués au niveau de la preuve de réponse, des signes de maladie résiduelle et de la tolérance ; ils pouvaient ensuite recevoir 2 doses supplémentaires, à la discrétion du médecin.

Afin de maintenir la castration, tous les patients ont continué de recevoir un analogue de la GnRH ou avaient subi au préalable une orchidectomie bilatérale. Pour être éligibles, les patients devaient présenter un CPRCm progressif, positif au PSMA, un indice de 0 à 2 dans l'échelle du statut de performance de l'*Eastern Cooperative Oncology Group* (ECOG), au moins une lésion métastatique visible à la tomодensitométrie (TDM), à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou à la scintigraphie osseuse, ainsi qu'une fonction rénale, hépatique et hématologique adéquate.

Les patients éligibles devaient aussi avoir reçu au moins une hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes, comme l'acétate d'abiratéron ou l'enzalutamide, et 1 ou 2 protocoles de chimiothérapie à base de taxane (un protocole étant défini par une exposition minimale à 2 cycles de taxane). Les patients ayant reçu au préalable qu'un seul protocole de chimiothérapie à base de taxane étaient éligibles si le patient refusait ou si le médecin jugeait le patient inapte à recevoir un second protocole. Les patients présentant des métastases cérébrales symptomatiques et/ou instables ou une compression médullaire symptomatique ou cliniquement/radiologiquement imminente n'étaient pas éligibles pour l'étude. Les patients ont fait l'objet d'un examen par imagerie par tomographie par émission de positons (TEP) au gallium (<sup>68</sup>Ga) gozétotide pour évaluer l'expression du PSMA au niveau des lésions, définie par les critères de lecture centralisée. Les patients éligibles devaient avoir un CPRCm positif au PSMA défini par la présence d'au moins une lésion tumorale avec fixation du gallium (<sup>68</sup>Ga) gozétotide plus importante que celle dans le foie sain. Les patients étaient exclus si les lésions dépassant les critères de taille pour l'axe court (organes  $\geq$  1 cm, ganglions lymphatiques  $\geq$  2,5 cm, os [tissu mou]  $\geq$  1 cm) présentaient une fixation inférieure ou égale à la fixation dans le foie sain.

Les BSoC administrés à la discrétion du médecin incluait : des traitements de support tels que la gestion de la douleur, l'hydratation, les transfusions sanguines, etc. ; kétoconazole ; radiothérapie (y compris curi-thérapie ou radiothérapie externe [y compris radiothérapie stéréotaxique du corps et radiothérapie externe palliative]) sur des cibles localisées du cancer de la prostate ; des médicaments traitant l'os tels que l'acide zolédronique, le dénosumab et les bisphosphonates ; des agents anti-androgènes tels que des analogues de la GnRH, des corticoïdes et des inhibiteurs de la 5-alpha réductases ; une hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes. Le BSoC excluait les agents expérimentaux, la chimiothérapie cytotoxique, l'immunothérapie, d'autres radio-isotopes systémiques et la radiothérapie hémicorps.

Les patients ont continué le traitement randomisé jusqu'à la mise en évidence d'une progression tumorale (sur la base de l'évaluation par l'investigateur selon les critères du *Prostate Cancer Working Group 3* [PCWG3]), la survenue d'une toxicité inacceptable, l'utilisation d'un traitement interdit, une non-observance ou un retrait, ou l'absence de bénéfice clinique.

Les critères d'évaluation primaires de l'efficacité étaient la survie globale (SG) et la survie sans progression radiographique (SSPr) évalués d'après une revue centralisée indépendante en aveugle (RCIA) selon les critères PCWG3. Parmi les critères d'évaluation secondaire de l'efficacité, figuraient le taux de réponse globale (TRG) évalué d'après la RCIA selon les critères d'évaluation de la réponse dans les tumeurs solides (RECIST) v1.1 et le délai écoulé avant le premier événement symptomatique osseux (ESO), défini comme le premier et nouvel événement symptomatique tel qu'une fracture osseuse pathologique, une compression médullaire, une intervention chirurgicale orthopédique liée à la tumeur, la nécessité d'une radiothérapie pour soulager les douleurs osseuses ou toute cause de décès, quel que soit celui survenant le premier. L'imagerie radiographique pour l'évaluation de la tumeur (TDM avec contraste/IRM et scintigraphie osseuse) a été réalisée toutes les 8 semaines ( $\pm 4$  jours) après la première dose pendant les 24 premières semaines (indépendamment des retards d'administration), puis toutes les 12 semaines ( $\pm 4$  jours).

Les caractéristiques démographiques et pathologiques à l'état initial étaient équilibrées entre les bras de traitement. L'âge médian était de 71 ans (intervalle : 40 à 94 ans) ; 86,8 % des sujets étaient blancs, 6,6 % étaient noirs ou afro-américains, 2,4 % étaient asiatiques, 92,4 % avaient un indice de performance ECOG de 0-1, et 7,6 % avaient un indice de performance ECOG de 2. La randomisation a été stratifiée selon le taux initial de lactate déshydrogénase ( $LDH \leq 260$  UI/L vs  $> 260$  UI/L), la présence de métastases hépatiques (oui vs non), l'indice de performance ECOG (0 ou 1 vs 2), et l'inclusion d'une hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes dans les BSoC au moment de la randomisation (oui vs non). Lors de la randomisation, tous les patients (100,0 %) avaient reçu préalablement au moins un protocole de chimiothérapie à base de taxane et 41,2 % des patients en avaient reçu deux ; 97,1 % des patients avaient reçu du docétaxel et 38,0 % des patients avaient reçu du cabazitaxel. Lors de la randomisation, 51,3 % des patients avaient reçu préalablement une hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes, 41,0 % des patients en avaient reçu 2 et 7,7 % des patients en avaient reçu 3 ou plus. Pendant la période de traitement randomisée, 52,6 % des patients du bras Pluvicto en association avec BSoC et 67,8 % des patients du bras BSoC seul ont reçu au moins une hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes.

Les résultats d'efficacité de VISION sont présentés dans le tableau 3 et sur les figures 1 et 2. Les analyses finales de SG et de SSPr étaient guidées par les événements et ont été conduites après la survenue de respectivement 530 décès et 347 événements.

**Tableau 3 Résultats d'efficacité de VISION**

Paramètre d'efficacité	Pluvicto en association avec BSoC	BSoC
<b>Critères d'évaluation primaires de l'efficacité</b>		
<b>Survie globale (SG)<sup>a</sup></b>	N=551	N=280
Décès, n (%)	343 (62,3 %)	187 (66,8 %)
Médiane, mois (IC à 95 %) <sup>b</sup>	15,3 (14,2 ; 16,9)	11,3 (9,8 ; 13,5)
Hazard ratio (IC à 95 %) <sup>c</sup>	0,62 (0,52 ; 0,74)	
Valeur de p <sup>d</sup>	< 0,001	
<b>Survie sans progression radiographique (SSPr)<sup>e,f</sup></b>	N=385	N=196
Événements (progression ou décès), n (%)	254 (66,0 %)	93 (47,4 %)
Progressions radiographiques, n (%)	171 (44,4 %)	59 (30,1 %)
Décès, n (%)	83 (21,6 %)	34 (17,3 %)
Médiane, mois (IC à 99,2 %) <sup>b</sup>	8,7 (7,9 ; 10,8)	3,4 (2,4 ; 4,0)
Hazard ratio (IC à 99,2 %) <sup>c</sup>	0,40 (0,29 ; 0,57)	
Valeur de p <sup>d</sup>	< 0,001	
<b>Critères d'évaluation secondaires de l'efficacité</b>		
<b>Délai de survenue du premier événement symptomatique osseux (ESO)<sup>f</sup></b>	N=385	N=196
Événements (ESO ou décès), n (%)	256 (66,5 %)	137 (69,9 %)
ESO, n (%)	60 (15,6 %)	34 (17,3 %)
Décès, n (%)	196 (50,9 %)	103 (52,6 %)
Médiane, mois (IC à 95 %) <sup>b</sup>	11,5 (10,3 ; 13,2)	6,8 (5,2 ; 8,5)
Hazard ratio (IC à 95 %) <sup>c</sup>	0,50 (0,40 ; 0,62)	
Valeur de p <sup>g</sup>	< 0,001	
<b>Meilleure réponse globale</b>		
Patients avec lésion évaluable à l'inclusion	N=319	N=120
Réponse complète (RC), n (%)	18 (5,6 %)	0 (0 %)
Réponse partielle (RP), n (%)	77 (24,1 %)	2 (1,7 %)
<b>Taux de réponse globale (TRG)<sup>h,i</sup></b>	95 (29,8 %)	2 (1,7 %)
Valeur de p <sup>j</sup>	< 0,001	
<b>Durée de la réponse (DR)<sup>h</sup></b>		
Médiane, mois (IC à 95 %) <sup>b</sup>	9,8 (9,1 ; 11,7)	10,6 (NE ; NE) <sup>k</sup>

BSoC : meilleur soin de référence ; IC : intervalle de confiance ; NE : non évaluable ; RCIA : revue centralisée indépendante en aveugle ; PCWG3 : groupe de travail 3 sur le cancer de la prostate ; RECIST : critères d'évaluation de la réponse dans les tumeurs solides.

<sup>a</sup> Analysé selon le principe de l'intention de traiter (ITT) chez tous les patients randomisés.

<sup>b</sup> Basé sur l'estimation de Kaplan-Meier.

<sup>c</sup> Hazard ratio basé sur le modèle des risques proportionnels de Cox. Hazard ratio < 1 en faveur de Pluvicto en association avec BSoC.

<sup>d</sup> Test de Log-rank stratifié, valeur de p unilatérale.

<sup>e</sup> Selon la RCIA, conformément aux critères PCWG3. L'analyse principale de la SSPr a inclus la censure des patients avec ≥ 2 évaluations tumorales consécutives non réalisées immédiatement avant progression ou décès. Les résultats pour la SSPr avec ou sans censure des évaluations non réalisées étaient concordants.

<sup>f</sup> Analysé selon le principe ITT chez tous les patients randomisés le 05 mars 2019 ou après, date à laquelle des actions ont été mises en place pour limiter les abandons prématurés dans le groupe BSoC.

<sup>g</sup> Test de Log-rank stratifié, valeur de p bilatérale.


<sup>h</sup> Selon la RCIA, conformément aux critères RECIST v1.1.

<sup>i</sup> TRG : RC+RP. Réponse confirmée pour la RC et la RP.

<sup>j</sup> Test du Chi-2 de Wald stratifié, valeur de p bilatérale.

<sup>k</sup> La DR médiane dans le groupe BSoC seul n'était pas fiable puisque 1 seul des deux patients ayant répondu a eu une progression radiographique selon les critères RECIST v1.1 ou est décédé.


**Figure 1 Courbe de Kaplan-Meier de la SG dans VISION**



Test de Log-rank stratifié et modèle de Cox stratifié utilisant des strates par technologie de réponse interactive (IRT) défini par le taux de LDH, la présence de métastases hépatiques, l'indice de performance ECOG et l'inclusion d'une hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes dans les BSoC au moment de la randomisation.

n/N : nombre d'événements/nombre de patients dans le bras de traitement.

**Figure 2 Courbe de Kaplan-Meier de la SSPr d'après la RCIA dans VISION**



Test de Log-rank stratifié et modèle de Cox stratifié utilisant des strates par IRT définies par le taux de LDH, la présence de métastases hépatiques, l'indice de performance ECOG et l'inclusion d'une hormonothérapie inhibitrice de la voie des androgènes dans les BSoC au moment de la randomisation.

n/N : nombre d'événements/nombre de patients dans le groupe de traitement.



## Population pédiatrique

L'Agence européenne des médicaments a accordé une dérogation à l'obligation de soumettre les résultats d'études réalisées avec Pluvicto dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique pour le traitement du cancer de la prostate exprimant le PSMA (voir rubrique 4.2 pour les informations concernant l'usage pédiatrique).

## **5.2 Propriétés pharmacocinétiques**

La pharmacocinétique du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan a été caractérisée chez 30 patients de la sous-étude de phase III VISION.

### Absorption

Pluvicto est administré par voie intraveineuse et est immédiatement et entièrement biodisponible.

La moyenne géométrique de l'exposition sanguine (aire sous la courbe [ASC<sub>inf</sub>]) pour le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan à la dose recommandée est de 52,3 ng.h/mL (moyenne géométrique du coefficient de variation [CV] 31,4 %). La moyenne géométrique de la concentration sanguine maximale (C<sub>max</sub>) pour le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan est de 6,58 ng/mL (CV 43,5 %).

### Distribution

La moyenne géométrique du volume de distribution (V<sub>z</sub>) pour le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan est de 123 L (CV 78,1 %).

Le vipivotide tétraxétan non marqué et le lutécium ( $^{175}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan non-radioactif sont liés respectivement à 60 % et à 70 % aux protéines plasmatiques humaines.

### Fixation aux organes

La biodistribution du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan montre une fixation principalement dans les glandes lacrymales, les glandes salivaires, les reins, la paroi de la vessie, le foie, l'intestin grêle et le côlon (côlon gauche et droit).

### Élimination

La moyenne géométrique de la clairance (CL) pour le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan est de 2,04 L/h (CV 31,5 %).

Le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan est éliminé principalement par voie rénale.

### Demi-vie

Pluvicto est éliminé de façon bi-exponentielle avec une moyenne géométrique de demi-vie d'élimination terminale (t<sub>1/2</sub>) de 41,6 heures (CV 68,8 %).

### Biotransformation

Le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan ne subit pas de métabolisme hépatique ou rénal.

### Evaluation *in vitro* du potentiel d'interaction médicamenteuse

#### Enzymes du CYP450

Le vipivotide tétraxétan n'est pas un substrat des enzymes du cytochrome P450 (CYP450). Il n'est pas inducteur du cytochrome P450 (CYP) 1A2, 2B6 ni 3A4 et il n'est pas inhibiteur du cytochrome P450 (CYP) 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 ou 3A4/5 *in vitro*.

### Transporteurs

Le vipivotide tétraxétan n'est pas un substrat de la BCRP, de la P-gp, de MATE1, de MATE2-K, d'OAT1, d'OAT3 ni d'OCT2, et ce n'est pas un inhibiteur de la BCRP, de la P-gp, de BSEP, de MATE1, de MATE2-K, d'OAT1, d'OAT3, d'OATP1B1, d'OATP1B3, d'OCT1 ni d'OCT2 *in vitro*.

### Populations spéciales

#### Effets de l'âge et du poids corporel

Aucun effet cliniquement significatif sur les paramètres pharmacocinétiques du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan n'a été identifié pour les covariables suivantes évaluées chez 30 patients de la sous-étude de phase III VISION : âge (médiane : 67 ans ; intervalle : 52 à 80 ans) et poids corporel (médiane : 88,8 kg ; intervalle : 63,8 à 143,0 kg).

#### Insuffisance rénale

L'exposition (ASC) au lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan a augmenté de 20 % chez les patients atteints d'une insuffisance rénale modérée en comparaison à une fonction rénale normale. La demi-vie de la dosimétrie rénale a également augmenté chez les patients atteints d'une insuffisance rénale modérée en comparaison à une fonction rénale normale, 51 heures versus 37 heures, respectivement. Les patients atteints d'une insuffisance légère à modérée peuvent présenter un risque plus élevé de toxicité (voir rubrique 4.4). Aucune donnée de pharmacocinétique n'est disponible pour les patients atteints d'insuffisance rénale modérée à sévère avec une CLcr à l'état initial < 50 mL/min ou d'insuffisance rénale terminale.

### **5.3 Données de sécurité préclinique**

Aucun effet toxicologique n'a été observé lors des études de pharmacologie sur la sécurité, de toxicité de dose unique chez le rat et le miniporc ayant reçu une formulation non radioactive contenant du vipivotide tétraxétan non marqué et du lutécium ( $^{175}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan, ou lors des études de toxicité de doses répétées chez le rat ayant reçu du vipivotide tétraxétan non marqué.

### Carcinogénicité et mutagénicité

Aucune étude de mutagénicité ni de carcinogénicité à long terme n'a été réalisée avec le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan ; cependant, les rayonnements sont carcinogènes et mutagènes.

## **6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES**

### **6.1 Liste des excipients**

Acide acétique  
Acétate de sodium  
Acide gentisique  
Ascorbate de sodium  
Acide pentétique  
Eau pour préparations injectables

### **6.2 Incompatibilités**

Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments à l'exception de ceux mentionnés dans les rubriques 4.2 et 12.

### **6.3 Durée de conservation**

120 heures (5 jours) à partir de la date et de l'heure de la calibration.

## **6.4 Précautions particulières de conservation**

Ne pas congeler.

Conserver dans l'emballage d'origine pour protéger des rayonnements ionisants (blindage en plomb).

La conservation des produits radiopharmaceutiques doit s'effectuer conformément à la réglementation nationale relative aux substances radioactives.

## **6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Flacon en verre de type I transparent, incolore, fermé avec un bouchon en caoutchouc de bromobutyle et un joint en aluminium.

Chaque flacon contient un volume de solution pouvant être compris entre 7,5 mL et 12,5 mL correspondant à une radioactivité de 7 400 MBq  $\pm$ 10 % à la date et à l'heure d'administration.

Le flacon est contenu dans un pot plombé à des fins de radioprotection.

## **6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation**

### Mises en garde générales

Les produits radiopharmaceutiques ne doivent être réceptionnés, utilisés et administrés que par des personnes autorisées dans un service agréé. Leur réception, conservation, utilisation, transfert et élimination sont soumis aux réglementations et/ou autorisations appropriées des autorités compétentes.

Les produits radiopharmaceutiques doivent être préparés de manière à satisfaire à la fois aux normes de radioprotection et de qualité pharmaceutique. Les précautions appropriées d'asepsie doivent être prises.

Pour les instructions concernant la préparation du médicament avant administration, voir la rubrique 12.

Si à tout moment lors de la préparation de ce médicament, l'intégrité du pot plombé ou du flacon est compromise, le médicament ne doit pas être utilisé.

Les procédures d'administration doivent être effectuées de manière à limiter le risque de contamination du médicament et d'exposition des opérateurs aux rayonnements. Un blindage adéquat est obligatoire.

L'administration de produits radiopharmaceutiques présente des risques pour les autres personnes en raison des rayonnements externes ou de la contamination liée aux fuites urinaires, aux vomissements, etc. Des mesures de protection contre les rayonnements doivent donc être prises, conformément aux réglementations nationales.

Il est probable que cette préparation induise une dose de rayonnement relativement élevée chez la plupart des patients. L'administration de Pluvicto peut induire un risque environnemental significatif. Ceci pourrait concerner la famille proche des patients recevant le traitement ou la population générale selon le niveau d'activité administré. Afin d'éviter toute contamination, des précautions adaptées concernant l'activité éliminée par les patients doivent être prises en conformité avec les réglementations nationales.

Le lutécium-177 pour Pluvicto peut être préparé en utilisant deux sources différentes d'isotopes stables (soit le lutécium-176 ou l'ytterbium-176). Le lutécium-177 pour Pluvicto préparé en utilisant l'isotope stable lutécium-176 (« avec métastable ») nécessite une attention particulière en termes de gestion des déchets en raison de la présence d'une impureté du lutécium-177 métastable ( $^{177m}\text{Lu}$ ) à durée de vie longue avec une demi-vie de 160,4 jours. Le lutécium-177 pour Pluvicto est préparé en utilisant l'ytterbium-176 (« sans métastable ») sauf indication contraire sur le certificat de libération de lot du produit. L'utilisateur doit consulter le certificat de libération de lot du produit qui a été fourni avant d'utiliser Pluvicto, pour garantir une gestion appropriée des déchets.

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Novartis Europharm Limited  
Vista Building  
Elm Park, Merrion Road  
Dublin 4  
Irlande

## **8. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/22/1703/001

## **9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

09 décembre 2022

## **10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE**

## **11. DOSIMÉTRIE**

La dose absorbée par les organes, qui ne sont pas nécessairement des organes ciblés par la thérapie, peut être significativement influencée par des modifications physiopathologiques induites par le processus pathologique. Ceci doit être pris en compte lors de l'utilisation des informations ci-dessous.

La dosimétrie du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan a été collectée chez 29 patients dans la sous-étude de phase III VISION afin de calculer la dosimétrie du rayonnement pour le corps entier et pour les organes. La moyenne et l'écart type (ET) des doses absorbées estimées dans différents organes chez des patients adultes recevant Pluvicto sont présentés dans le tableau 4. Les organes ayant absorbés les doses les plus élevées sont les glandes lacrymales et les glandes salivaires.

La pénétration maximum du lutécium-177 dans les tissus est d'environ 2 mm et la pénétration moyenne est de 0,67 mm.

**Tableau 4 Dose absorbée estimée pour Pluvicto dans la sous-étude VISION**

Organe	Dose absorbée par unité d'activité (mGY/MBq) <sup>a</sup> (N=29)		Dose absorbée calculée lors de l'administration de 7 400 MBq (Gy) <sup>a</sup>		Dose absorbée calculée pour 6 x 7 400 MBq (activité cumulée de 44 400 MBq) (Gy) <sup>a</sup>	
	Moyenne	ET	Moyenne	ET	Moyenne	ET
Surrénales	0,033	0,025	0,24	0,19	1,5	1,1
Cerveau	0,007	0,005	0,049	0,035	0,30	0,22
Yeux	0,022	0,024	0,16	0,18	0,99	1,1
Paroi de la vésicule biliaire	0,028	0,026	0,20	0,19	1,2	1,1
Paroi cardiaque	0,17	0,12	1,2	0,83	7,8	5,2
Reins	0,43	0,16	3,1	1,2	19	7,3
Glandes lacrymales	2,1	0,47	15	3,4	92	21
Côlon gauche	0,58	0,14	4,1	1,0	26	6,0
Foie	0,090	0,044	0,64	0,32	4,0	2,0
Poumons	0,11	0,11	0,76	0,81	4,7	4,9
Œsophage	0,025	0,026	0,18	0,19	1,1	1,1
Cellules ostéogéniques	0,036	0,028	0,26	0,21	1,6	1,3
Pancréas	0,027	0,026	0,19	0,19	1,2	1,1
Prostate	0,027	0,026	0,19	0,19	1,2	1,1
Moelle rouge	0,035	0,020	0,25	0,15	1,5	0,90
Rectum	0,56	0,14	4,0	1,1	25	6,2
Côlon droit	0,32	0,078	2,3	0,58	14	3,4
Glandes salivaires	0,63	0,36	4,5	2,6	28	16
Intestin grêle	0,071	0,031	0,50	0,23	3,1	1,4
Rate	0,067	0,027	0,48	0,20	3,0	1,2
Paroi de l'estomac	0,025	0,026	0,18	0,19	1,1	1,1
Testicules	0,023	0,025	0,16	0,18	1,0	1,1
Thymus	0,025	0,026	0,18	0,19	1,1	1,1
Thyroïde	0,26	0,37	1,8	2,7	11	16
Corps entier	0,037	0,027	0,27	0,20	1,6	1,2
Paroi de la vessie	0,32	0,025	2,3	0,19	14	1,1
Dose efficace <sup>b</sup>	0,120 mSv/MBq	0,043 mSv/MBq	0,886 Sv	0,315 Sv	5,319 Sv	1,892 Sv
<sup>a</sup> Les estimations de la dose absorbée ont été calculées en utilisant OLINDA v2.2. Les valeurs ont été calculées sur la base d'estimations de la dosimétrie à un niveau de précision maximale, et arrondies aux chiffres significatifs. <sup>b</sup> Dérivée de la publication 103 de la CIPR.						

## 12. INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES

L'utilisateur doit consulter le certificat de libération de lot du produit qui a été fourni avant d'utiliser Pluvicto, pour garantir une gestion appropriée des déchets (voir rubrique 6.6).

Les prélèvements doivent avoir lieu dans des conditions d'asepsie. Les flacons ne doivent pas être ouverts avant désinfection du bouchon ; la solution doit être prélevée via le bouchon avec une seringue unidose équipée d'un protège-seringue plombé et d'une aiguille stérile jetable, ou en utilisant un système de prélèvement automatisé autorisé.

## Instructions pour la préparation

- Utiliser une technique aseptique et un blindage contre les rayonnements lors de la manipulation ou de l'administration de Pluvicto, et utiliser des pinces si nécessaire pour minimiser l'exposition aux rayonnements.
- Inspecter visuellement le flacon derrière un écran blindé pour vérifier l'absence de particules et de changement de couleur avant administration. Jeter le flacon s'il contient des particules et/ou si la solution a changé de couleur.
- Ne pas injecter la solution de Pluvicto directement dans une autre solution intraveineuse.
- Confirmer la quantité de radioactivité administrée au patient à l'aide d'un dosimètre étalonné de façon appropriée immédiatement avant et après administration de Pluvicto.

## Méthodes d'administration par voie intraveineuse

### *Instructions pour la méthode avec une seringue (avec ou sans pousse-seringue)*

- Après désinfection du bouchon du flacon, prélever un volume approprié de solution de Pluvicto pour administrer la radioactivité souhaitée en utilisant une seringue jetable équipée d'un protège seringue et d'une aiguille jetable stérile.
- Administrer Pluvicto au patient en injection intraveineuse lente pendant environ 1 à 10 minutes (soit avec un pousse-seringue ou manuellement sans pousse seringue) via un cathéter intraveineux préalablement rempli d'une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) et utilisé exclusivement pour l'administration de Pluvicto au patient.
- Une fois la radioactivité de Pluvicto souhaitée administrée, rincer le cathéter intraveineux du patient avec une solution  $\geq 10$  mL injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %).

### *Instructions pour la méthode par gravité (avec ou sans pompe à perfusion)*

- Insérer une aiguille de 2,5 cm, 20 gauge (aiguille courte) dans le flacon de Pluvicto et le relier via un cathéter à 500 mL de solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) (utilisée pour transporter la solution de Pluvicto pendant la perfusion). Vérifier que l'aiguille courte ne touche pas la solution de Pluvicto dans le flacon et ne pas connecter l'aiguille courte directement au patient. Ne pas laisser la solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) s'écouler dans le flacon de Pluvicto avant le début de la perfusion de Pluvicto et ne pas injecter la solution de Pluvicto directement dans la solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %).
- Insérer une seconde aiguille de 9 cm, 18 gauge (aiguille longue) dans le flacon de Pluvicto en s'assurant que l'aiguille longue touche et reste en contact avec le fond du flacon de Pluvicto pendant toute la durée de la perfusion. Connecter l'aiguille longue au patient via un cathéter intraveineux préalablement rempli de solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) et utilisé exclusivement pour la perfusion de Pluvicto au patient.
- Utiliser un clamp ou une pompe à perfusion pour réguler le flux de solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) via l'aiguille courte dans le flacon de Pluvicto (la solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) entrant dans le flacon via l'aiguille courte entrainera la solution de Pluvicto du flacon au patient via le cathéter intraveineux connecté à l'aiguille longue pendant environ 30 minutes).
- Pendant la perfusion, vérifier que le niveau de solution dans le flacon de Pluvicto reste constant.
- Déconnecter le flacon de la tubulure de l'aiguille longue et clamper la tubulure de chlorure de sodium lorsque le niveau de radioactivité est stable pendant au moins cinq minutes.
- Après la perfusion, rincer le cathéter intraveineux avec une solution  $\geq 10$  mL injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %).

### Instructions pour la méthode avec le flacon (avec une pompe à perfusion péristaltique)

- Insérer une aiguille de 2,5 cm, 20 gauge (aiguille d'aération courte) dans le flacon de Pluvicto. Vérifier que l'aiguille courte ne touche pas la solution Pluvicto dans le flacon et ne pas connecter l'aiguille courte directement au patient ou à la pompe à perfusion péristaltique.
- Insérer une seconde aiguille de 9 cm, 18 gauge (aiguille longue) dans le flacon de Pluvicto en vérifiant que l'aiguille longue touche et reste en contact avec le fond du flacon de Pluvicto pendant toute la durée de la perfusion. Connecter l'aiguille longue et une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) à une valve à trois voies via une tubulure appropriée.
- Connecter la sortie de la valve à 3 voies à la tubulure installée sur le côté d'entrée de la pompe à perfusion péristaltique en suivant les instructions du fabricant de la pompe.
- Préremplir la tubulure en ouvrant la valve à 3 voies et en pompant la solution de Pluvicto dans la tubulure jusqu'à ce qu'elle atteigne la sortie de la valve.
- Préremplir le cathéter intraveineux qui sera connecté au patient en ouvrant la valve à 3 voies à la solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) et en pompant la solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %) jusqu'à ce qu'elle sorte de l'extrémité de la tubulure du cathéter.
- Connecter le cathéter intraveineux prérempli au patient et régler la valve à 3 voies de telle sorte que la solution de Pluvicto soit connectée avec la pompe à perfusion péristaltique.
- Perfuser un volume approprié de la solution de Pluvicto à un débit d'environ 25 mL/h pour administrer la radioactivité souhaitée.
- Lorsque la radioactivité de Pluvicto souhaitée a été administrée, arrêter la pompe à perfusion péristaltique puis changer la position de la valve à 3 voies de sorte que la pompe à perfusion péristaltique soit connectée avec la solution injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %). Relancer la pompe à perfusion péristaltique et rincer le cathéter intraveineux avec une solution  $\geq 10$  mL injectable stérile de chlorure de sodium à 9 mg/mL (0,9 %).

### Contrôle de la qualité

La solution doit faire l'objet d'une inspection visuelle avant utilisation pour vérifier l'absence de dommage ou de contamination, et des solutions transparentes et exemptes de particules visibles doivent exclusivement être utilisées. L'inspection visuelle de la solution doit avoir lieu derrière un écran blindé à des fins de radioprotection. Le flacon ne doit pas être ouvert.

Si, à tout moment lors de la préparation de ce médicament, l'intégrité du pot plombé ou du flacon est compromise, le produit ne doit pas être utilisé.

La quantité de radioactivité présente dans le flacon doit être mesurée avant l'administration en utilisant un système de calibration de la radioactivité adapté afin de confirmer que la quantité de radioactivité réelle à administrer est égale à la quantité prévue au moment de l'administration.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments <http://www.ema.europa.eu/>

## **ANNEXE II**

- A. FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS**
- B. CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION**
- C. AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**
- D. CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D'UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT**



## **A. FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS**

### Nom et adresse du fabricant responsable de la libération des lots

Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L.  
Via Ribes 5  
10010  
Colleretto Giacosa (TO)  
Italie

Advanced Accelerator Applications Ibérica, S.L.U.  
Polígono Industrial la Cuesta – Sector 3  
Parcelas 1 y 2 La Almunia de Doña Godina  
50100 Zaragoza  
Espagne

Le nom et l'adresse du fabricant responsable de la libération du lot concerné doivent figurer sur la notice du médicament.

## **B. CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION**

Médicament soumis à prescription médicale restreinte (voir Annexe I: Résumé des Caractéristiques du Produit, rubrique 4.2).

## **C. AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

### **• Rapports périodiques actualisés de sécurité (PSURs)**

Les exigences relatives à la soumission des PSURs pour ce médicament sont définies dans la liste des dates de référence pour l'Union (liste EURD) prévue à l'article 107 quater, paragraphe 7, de la directive 2001/83/CE et ses actualisations publiées sur le portail web européen des médicaments.

Le titulaire soumet le premier PSUR pour ce médicament dans un délai de 6 mois suivant l'autorisation.

## **D. CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D'UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT**

### **• Plan de gestion des risques (PGR)**

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché réalise les activités de pharmacovigilance et interventions requises décrites dans le PGR adopté et présenté dans le Module 1.8.2 de l'autorisation de mise sur le marché, ainsi que toutes actualisations ultérieures adoptées du PGR.

De plus, un PGR actualisé doit être soumis:

- à la demande de l'Agence européenne des médicaments;
- dès lors que le système de gestion des risques est modifié, notamment en cas de réception de nouvelles informations pouvant entraîner un changement significatif du profil bénéfice/risque, ou lorsqu'une étape importante (pharmacovigilance ou réduction du risque) est franchie.

- **Mesures additionnelles de réduction du risque**

Avant la commercialisation de Pluvicto dans chaque état membre, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit valider avec l'autorité nationale compétente le contenu et le format du guide patient y compris les moyens de communication, les modalités de distribution, ainsi que tout autre aspect du programme.

Le guide patient vise à réduire le risque d'exposition accidentelle aux rayonnements.

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché devra s'assurer que, dans chaque état membre dans lequel Pluvicto est commercialisé, les patients ont accès au guide patient.

Le guide patient de Pluvicto comprend les principaux éléments suivants :

- Qu'est-ce que Pluvicto et comment agit-il
- Une description de la gestion des risques concernant :
  - L'hydratation
  - Les contacts proches
  - Les aides-soignants
  - L'activité sexuelle et la contraception
  - L'utilisation des toilettes
  - La douche et la lessive
  - L'élimination des déchets

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

## MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

### POT AVEC BLINDAGE AU PLOMB

#### 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Pluvicto 1 000 MBq/mL solution injectable/pour perfusion  
lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan

#### 2. COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Un mL contient 1 000 MBq de lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan au moment de la calibration.  
Activité volumique au moment de la calibration : 1 000 MBq/mL - {JJ/MM/AAAA hh:mm UTC}

#### 3. LISTE DES EXCIPIENTS

Acide acétique, acétate de sodium, acide gentisique, ascorbate de sodium, acide pentétique, eau pour préparation injectable. Voir la notice pour plus d'informations.

#### 4. FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Solution injectable/pour perfusion

1 flacon unidosé

N° du flacon : {X}

Volume : {Y} mL

Activité au moment de l'administration : {Z} MBq - {JJ/MM/AAAA hh:mm UTC}

#### 5. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie intraveineuse

#### 6. MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

#### 7. AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE



**8. DATE DE PÉREMPTION**

EXP: {JJ/MM/AAAA hh:mm UTC}

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Ne pas congeler.

À conserver dans le conditionnement d'origine pour protéger des rayonnements ionisants (blindage au plomb).

**10. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A LIEU**

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales.

**11. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Novartis Europharm Limited  
Vista Building  
Elm Park, Merrion Road  
Dublin 4  
Irlande

**12. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

EU/1/22/1703/001

**13. NUMÉRO DU LOT**

Lot:

**14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE**

**15. INDICATIONS D'UTILISATION**

**16. INFORMATIONS EN BRAILLE**

Justification de ne pas inclure l'information en Braille acceptée.

**17. IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D**

Sans objet.

**18. IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS**

Sans objet.

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS  
PRIMAIRES**

**FLACON**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Pluvicto 1 000 MBq/mL solution injectable/pour perfusion  
lutécium (<sup>177</sup>Lu) vipivotide tétraxétan  
Voie intraveineuse

**2. MODE D'ADMINISTRATION**

Flacon unidose

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP: {JJ/MM/AAAA hh:mm UTC}

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot:

**5. CONTENU EN POIDS, VOLUME OU UNITÉ**

N° du flacon : {X}  
Volume : {Y} mL  
Activité volumique au moment de la calibration : 1 000 MBq/mL - {JJ/MM/AAAA hh:mm UTC}  
Activité au moment de l'administration : {Z} MBq - {JJ/MM/AAAA hh:mm UTC}

**6. AUTRE**



**Fabricant**

Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L.  
Via Ribes 5  
10010  
Colleretto Giacosa (TO)  
Italie



Advanced Accelerator Applications Ibérica, S.L.U.  
Polígono Industrial la Cuesta – Sector 3  
Parcelas 1 y 2 La Almunia de Doña Godina  
50100 Zaragoza  
Espagne

**B. NOTICE**

## Notice : Information du patient

### Pluvicto 1 000 MBq/mL solution injectable/pour perfusion lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Voir en fin de rubrique 4 comment déclarer les effets indésirables.

**Veillez lire attentivement cette notice avant de recevoir ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin spécialiste en médecine nucléaire qui supervisera la procédure.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin spécialiste en médecine nucléaire. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

#### Que contient cette notice?:

1. Qu'est-ce que Pluvicto et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pluvicto
3. Comment Pluvicto est utilisé
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment Pluvicto est conservé
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Pluvicto et dans quels cas est-il utilisé

##### Qu'est-ce que Pluvicto

Pluvicto contient du lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan. Ce médicament est un produit radiopharmaceutique à usage thérapeutique uniquement.

##### Dans quel cas Pluvicto est-il utilisé

Pluvicto est utilisé pour traiter les adultes atteints d'un cancer de la prostate progressif résistant à la castration, qui s'est propagé à d'autres parties du corps (métastatique) et qui a déjà été traité avec d'autres traitements contre le cancer. Le cancer de la prostate résistant à la castration est un cancer de la prostate (une glande du système reproductif masculin) qui ne répond pas aux traitements qui réduisent les hormones masculines. Pluvicto est utilisé si les cellules du cancer de la prostate ont une protéine sur leur surface appelée antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA).

##### Comment agit Pluvicto

Pluvicto se lie au PSMA retrouvé à la surface des cellules du cancer de la prostate. Une fois liée, la substance radioactive de Pluvicto, le lutécium-177, émet un rayonnement qui provoque la mort des cellules du cancer de la prostate.

Votre médecin effectuera des examens pour voir si le PSMA est présent à la surface des cellules cancéreuses. Il est très probable que votre cancer réponde au traitement par Pluvicto si le résultat de l'examen est positif.

L'utilisation de Pluvicto implique une exposition à une certaine quantité de radioactivité. Votre médecin et le médecin spécialiste en médecine nucléaire ont estimé que le bénéfice clinique que vous obtiendrez de cette procédure avec le produit radiopharmaceutique est supérieur au risque lié aux rayonnements.

Si vous avez des questions sur le mode d'action de Pluvicto ou si vous souhaitez savoir pourquoi ce médicament vous a été prescrit, interrogez votre médecin spécialiste en médecine nucléaire.

## **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Pluvicto**

Suivez attentivement toutes les instructions données par votre médecin spécialiste en médecine nucléaire. Elles pourront différer des informations générales contenues dans cette notice.

### **Pluvicto ne doit pas être utilisé**

- si vous êtes allergique au lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés à la rubrique 6).

### **Avertissements et précautions**

Si l'une des situations suivantes s'applique à vous, informez votre médecin spécialiste en médecine nucléaire avant de recevoir Pluvicto :

- si vous avez un faible taux de certains types de cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, neutrophiles, plaquettes)
- si vous avez ou avez présenté une fatigue, une faiblesse, une pâleur, un essoufflement, des saignements ou bleus plus facilement que la normale ou des saignements qui durent plus longtemps que la normale, ou des infections fréquentes avec des signes tels que de la fièvre, des frissons, des maux de gorge ou des ulcères dans la bouche (signes possibles d'une myélosuppression [une maladie où la moelle osseuse ne peut pas produire suffisamment de cellules sanguines])
- si vous avez ou avez eu des problèmes de rein
- si vous avez ou avez eu un autre type de cancer ou de traitement contre le cancer, car Pluvicto contribue à votre exposition globale cumulée aux rayonnements à long terme

### **Avant l'administration de Pluvicto, vous devez :**

- boire beaucoup d'eau pour rester hydraté et uriner aussi souvent que possible durant les premières heures suivant l'administration

### **Enfants et adolescents**

La sécurité et l'efficacité de ce médicament n'ont pas été établies chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Ce médicament ne doit pas être donné aux enfants ou aux adolescents âgés de moins de 18 ans en raison de l'absence de données disponibles dans cette tranche d'âge.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Pluvicto n'est pas destiné à une utilisation chez la femme.

Avant de recevoir Pluvicto, informez votre médecin spécialiste en médecine nucléaire si vous êtes sexuellement actif car tous les produits radiopharmaceutiques, y compris Pluvicto, ont le potentiel d'affecter le bébé à naître.

### **Fertilité**

Pluvicto peut provoquer une infertilité. Demandez à votre médecin spécialiste en médecine nucléaire comment cela peut vous affecter, en particulier si vous prévoyez d'avoir des enfants à l'avenir. Vous pourrez demander conseil sur la conservation du sperme avant le début du traitement.

### **Contraception chez les hommes**

- Vous devez éviter d'avoir une activité sexuelle pendant 7 jours après l'administration de Pluvicto.
- Vous ne devez pas concevoir un enfant et vous devez utiliser un préservatif lors des rapports sexuels pendant le traitement par Pluvicto et durant 14 semaines après votre dernière dose.
- Informer immédiatement votre médecin spécialiste en médecine nucléaire si vous concevez un enfant à tout moment au cours de cette période.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Il est considéré comme peu probable que Pluvicto ait un effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### **Pluvicto contient du sodium**

Ce médicament contient jusqu'à 88,75 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par flacon. Cela équivaut à 4,4 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.

## **3. Comment utiliser Pluvicto**

Il existe des réglementations strictes concernant l'utilisation, la manipulation et l'élimination des produits radiopharmaceutiques. Pluvicto sera utilisé exclusivement dans un environnement radio-protégé. Ce produit radiopharmaceutique ne sera manipulé et ne vous sera administré que par des personnes formées et qualifiées pour l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes prendront un soin particulier à utiliser ce produit radiopharmaceutique en toute sécurité et vous tiendront informé de leurs actions.

### **Quelle dose de Pluvicto est administrée**

Le schéma thérapeutique recommandé de Pluvicto est de 7 400 MBq (mégabecquerel, unité utilisée pour exprimer la radioactivité), qui est administré environ toutes les 6 semaines jusqu'à un total de 6 doses.

### **Administration de Pluvicto et conduite de la procédure**

Pluvicto est administré directement dans une veine.

### **Durée de la procédure**

Votre médecin spécialiste en médecine nucléaire vous informera de la durée habituelle de la procédure.

Si vous avez des questions sur la durée pendant laquelle vous recevrez Pluvicto, demandez à votre médecin spécialiste en médecine nucléaire.

### **Suivi du traitement**

Votre médecin spécialiste en médecine nucléaire vous demandera de réaliser des analyses de sang avant et pendant le traitement pour vérifier votre état de santé et détecter tout effet indésirable éventuel le plus tôt possible. Selon les résultats, votre médecin spécialiste en médecine nucléaire pourra décider de décaler, de modifier ou d'arrêter votre traitement par Pluvicto si nécessaire.

### **Après l'administration de Pluvicto, vous devez :**

- boire beaucoup d'eau pendant 2 jours pour rester hydraté et uriner aussi souvent que possible pour éliminer le produit radiopharmaceutique de votre organisme

Étant donné que ce médicament est radioactif, vous devrez suivre les instructions indiquées ci-dessous pour minimiser l'exposition des autres aux rayonnements, sauf indication contraire de votre médecin spécialiste en médecine nucléaire.

### Contact avec les autres membres de votre foyer, les enfants et/ou les femmes enceintes

- Limiter les contacts proches (à moins d'1 mètre) avec :
  - les autres personnes de votre foyer pendant 2 jours
  - les enfants et les femmes enceintes pendant 7 jours
- Dormir dans une chambre séparée :
  - de celle des autres personnes de votre foyer pendant 3 jours
  - des enfants pendant 7 jours
  - des femmes enceintes pendant 15 jours
- Eviter d'avoir une activité sexuelle pendant 7 jours.
- Ne pas concevoir d'enfant et utiliser un préservatif lors des rapports sexuels pendant le traitement par Pluvicto et durant les 14 semaines après votre dernière dose.

### Utilisation des toilettes

Prenez des précautions particulières pour éviter toute contamination pendant les 2 jours qui suivent votre administration :

- Vous devez toujours vous asseoir lorsque vous utilisez les toilettes.
- Il est essentiel que vous utilisiez du papier toilette à chaque fois que vous utilisez les toilettes.
- Toujours bien se laver les mains après être allé aux toilettes.
- Jetez dans les toilettes toutes les lingettes et/ou le papier toilette immédiatement après utilisation.
- Jetez dans les toilettes tous les mouchoirs en papier ou tous les autres éléments contenant des déchets corporels, tels que du sang, de l'urine et des matières fécales. Les éléments qui ne peuvent pas être jetés dans les toilettes, tels que les compresses et les pansements doivent être placés dans des sacs en plastique séparés dédiés à l'élimination des déchets (selon les « Recommandations d'élimination des déchets » ci-dessous).
- Tout équipement médical spécial qui pourrait être contaminé par vos fluides corporels (p.ex. poches reliées à un cathéter, poches de colostomie, vase de nuit, buse d'eau) doit être vidé immédiatement dans les toilettes et ensuite nettoyé.

### Douche et lessive

- Prenez une douche chaque jour pendant au moins les 7 jours qui suivent le traitement.
- Lavez vos sous-vêtements, pyjamas, draps et tout vêtement contenant de la sueur, du sang ou des urines séparément du linge des autres membres du foyer, en utilisant un cycle de lavage standard. Il est inutile d'utiliser un agent blanchissant et de procéder à des rinçages supplémentaires.

### Aides-soignants

Pendant les 2-3 jours qui suivent le traitement :

- Les personnes qui sont alitées ou qui ont une mobilité réduite recevront de préférence l'assistance d'un aide-soignant. Lors de l'assistance à la toilette, il est recommandé que l'aide-soignant porte des gants jetables.
- Les aides-soignants qui nettoient les vomissures, le sang, l'urine ou les selles doivent porter des gants en plastique qui doivent être jetés dans un sac-poubelle en plastique séparé (voir « Recommandations d'élimination des déchets » ci-dessous).

### Recommandations d'élimination des déchets

- Tous les articles à jeter doivent l'être dans un sac en plastique séparé qui ne doit être utilisé qu'à cette fin.
- Gardez les sacs poubelle en plastique à l'écart des autres déchets ménagers et hors de portée des enfants et des animaux.
- Un membre du personnel hospitalier vous dira comment et quand vous débarrasser de ces sacs poubelle.

### Hospitalisation et soins d'urgence

- Si pour quelque raison, vous nécessitez d'une assistance médicale d'urgence ou si vous êtes admis de manière inattendue à l'hôpital pendant les 7 premiers jours qui suivent le traitement, vous devez informer les professionnels de santé du nom, de la date et de la dose de votre traitement radioactif.

### Autres précautions

- Le médecin spécialiste en médecine nucléaire vous informera de toute autre précaution particulière que vous devrez prendre après l'administration de ce médicament. Contactez votre médecin spécialiste en médecine nucléaire si vous avez des questions.

### **Si vous avez reçu plus de Pluvicto que vous n'auriez dû**

Un surdosage est peu probable car vous recevrez une dose unique de Pluvicto qui a été contrôlée avec précision par le médecin spécialiste en médecine nucléaire qui supervise la procédure. Toutefois, en cas de surdosage, vous recevrez le traitement approprié.

### **Si vous oubliez de recevoir Pluvicto**

Si vous manquez un rendez-vous pour recevoir Pluvicto, contactez votre médecin spécialiste en médecine nucléaire le plus rapidement possible pour replanifier un rendez-vous.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de Pluvicto, demandez plus d'informations au médecin spécialiste en médecine nucléaire qui supervise la procédure.

## **4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Certains effets indésirables peuvent être graves**

Si vous ressentez l'un des effets indésirables graves décrits ci-dessous, prévenez **immédiatement votre médecin spécialiste en médecine nucléaire**.

#### **Très fréquent** : peut affecter plus d'1 personne sur 10

- fatigue, faiblesse, pâleur ou essoufflement (signes possibles d'un faible nombre de globules rouges [*anémie*])
- saignements ou bleus survenant plus facilement que la normale ou saignements qui durent plus longtemps que la normale (signes possibles d'un faible nombre de plaquettes [*thrombopénie*])
- infections fréquentes avec des signes tels que de la fièvre, des maux de gorge ou des ulcères dans la bouche (signes possibles d'un faible nombre de globules blancs [*leucopénie*, *lymphopénie*])

#### **Fréquent** : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- mictions moins fréquentes ou en plus petites quantités que d'habitude (signe possible de troubles rénaux [*insuffisance rénale aiguë*])
- fatigue, faiblesse, pâleur, essoufflement, saignements ou bleus survenant plus facilement que la normale ou saignements qui durent plus longtemps que la normale ou infections plus fréquentes avec des signes tels que de la fièvre, des frissons, des maux de gorge ou des ulcères dans la bouche (signes possibles d'un faible nombre de cellules sanguines [*pancytopénie*])

### **Autres effets indésirables possibles**

Les autres effets indésirables incluent ceux de la liste qui suit. Si ces effets indésirables deviennent sévères, avertissez s'il-vous-plaît votre médecin spécialiste en médecine nucléaire.

**Très fréquent** : peut affecter plus d'1 personne sur 10

- fatigue
- bouche sèche
- nausées
- perte d'appétit
- modification du transit intestinal (constipation ou diarrhée)
- vomissements
- miction fréquente avec douleur ou sensation de brûlure (*infection du tractus urinaire*)
- douleurs abdominales
- perte de poids

**Fréquent** : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- gonflement des mains, des chevilles ou des pieds (*œdème périphérique*)
- étourdissements
- maux de tête
- modification du goût (*dysgueusie*)
- fièvre (*pyrexie*)
- yeux secs
- étourdissements, avec sensation de tête qui tourne (*vertige*)

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin spécialiste en médecine nucléaire. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via **le système national de déclaration** décrit en [Annexe V](#). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. Comment conserver Pluvicto**

Vous n'aurez pas à conserver ce médicament. Ce médicament est conservé sous la responsabilité du spécialiste dans des locaux appropriés. La conservation des produits radiopharmaceutiques s'effectuera conformément à la réglementation nationale relative aux substances radioactives.

Les informations suivantes sont destinées exclusivement au spécialiste :

- Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne pas congeler.
- Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger des rayonnements ionisants (blindage en plomb).
- Pluvicto ne doit pas être utilisé après la date et l'heure de péremption qui sont indiquée sur les étiquettes du pot plombé et du flacon après EXP.
- Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.



## 6. Contenu de l'emballage et autres informations

### Ce que contient Pluvicto

- La substance active est le lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan. Un mL de solution contient 1 000 MBq de lutécium ( $^{177}\text{Lu}$ ) vipivotide tétraxétan à la date et à l'heure de la calibration.
- Les autres composants sont : acide acétique, acétate de sodium, acide gentisique, ascorbate de sodium, acide pentétique, eau pour préparations injectables (voir « Pluvicto contient du sodium » à la rubrique 2).

### Comment se présente Pluvicto et contenu de l'emballage extérieur

Pluvicto est une solution transparente, incolore à légèrement jaune, fournie dans un flacon de verre de type I transparent, incolore, fermé avec un bouchon en caoutchouc de bromobutyle et un joint en aluminium.

Chaque flacon contient un volume de solution pouvant être compris entre 7,5 mL et 12,5 mL, correspondant à une radioactivité de 7 400 MBq  $\pm 10\%$  à la date et à l'heure de l'administration. Le flacon est contenu dans un pot plombé à des fins de radioprotection.

### Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché

Novartis Europharm Limited  
Vista Building  
Elm Park, Merrion Road  
Dublin 4  
Irlande

### Fabricant

Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L.  
Via Ribes 5  
10010  
Colleretto Giacosa (TO)  
Italie

Advanced Accelerator Applications Ibérica, S.L.U.  
Polígono Industrial la Cuesta – Sector 3  
Parcelas 1 y 2 La Almunia de Doña Godina  
50100 Zaragoza  
Espagne

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

**België/Belgique/Belgien**

Novartis Pharma N.V.  
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

**България**

Novartis Bulgaria EOOD  
Тел: +359 2 489 98 28

**Česká republika**

Novartis s.r.o.  
Tel: +420 225 775 111

**Danmark**

SAM Nordic  
Sverige  
Tel: +46 8 720 58 22

**Deutschland**

Novartis Pharma GmbH  
Tel: +49 911 273 0

**Eesti**

SAM Nordic  
Rootsi  
Tel: +46 8 720 58 22

**Ελλάδα**

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ  
Τηλ: +30 22920 63900  
ή  
Novartis (Hellas) A.E.B.E.  
Τηλ: +30 210 281 17 12

**España**

Advanced Accelerator Applications Ibérica,  
S.L.U.  
Tel: +34 97 6600 126

**France**

Advanced Accelerator Applications  
Tél: +33 1 55 47 63 00

**Hrvatska**

Novartis Hrvatska d.o.o.  
Tel. +385 1 6274 220

**Ireland**

Novartis Ireland Limited  
Tel: +353 1 260 12 55

**Lietuva**

SAM Nordic  
Švedija  
Tel: +46 8 720 58 22

**Luxembourg/Luxemburg**

Novartis Pharma N.V.  
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

**Magyarország**

Novartis Hungária Kft.  
Tel.: +36 1 457 65 00

**Malta**

Novartis Pharma Services Inc.  
Tel: +356 2122 2872

**Nederland**

Novartis Pharma B.V.  
Tel: +31 88 04 52 111

**Norge**

SAM Nordic  
Sverige  
Tlf: +46 8 720 58 22

**Österreich**

Novartis Pharma GmbH  
Tel: +43 1 86 6570

**Polska**

Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z  
o.o.  
Tel.: +48 22 275 56 47

**Portugal**

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.  
Tel: +351 21 000 8600

**România**

Novartis Pharma Services Romania SRL  
Tel: +40 21 31299 01

**Slovenija**

Novartis Pharma Services Inc.  
Tel: +386 1 300 75 50

**Ísland**

SAM Nordic  
Svíþjóð  
Sími: +46 8 720 58 22

**Italia**

Novartis Farma S.p.A.  
Tel: +39 02 96 54 1

**Κύπρος**

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ  
Τηλ: +30 22920 63900  
ή  
Novartis Pharma Services Inc.  
Τηλ: +357 22 690 690

**Latvija**

SAM Nordic  
Zviedrija  
Tel: +46 8 720 58 22

**Slovenská republika**

Novartis Slovakia s.r.o.  
Tel: +421 2 5542 5439

**Suomi/Finland**

SAM Nordic  
Ruotsi/Sverige  
Puh/Tel: +46 8 720 58 22

**Sverige**

SAM Nordic  
Tel: +46 8 720 58 22

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Novartis Ireland Limited  
Tel: +44 1276 698370

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est**

**Autres sources d'informations**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments : <http://www.ema.europa.eu>.

-----  
Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de la santé :

Le RCP complet de Pluvicto est fourni comme document séparé dans l'emballage du médicament, dans le but de fournir aux professionnels de la santé des informations pratiques et scientifiques supplémentaires concernant l'administration et l'utilisation de ce radiopharmaceutique.

Veillez-vous reporter au RCP.