

EU broj odobrenja	Izmišljeno ime	Jačina	Farmaceutski oblik	Ciljne vrste životinja	Put primjene	Pakovanje	Sastav	Veličina pakovanja	Karencija
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (PET) špricu (PP)	42 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (PET) špricu (PP)	100 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (PET) špricu (PP)	200 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	oralna suspenzija	Psi	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) špricu (PP)	15 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		20 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	tablete za žvakanje	Psi	Oralnu uporabu	blisters (PVC/PVDC)		100 x 1 tableta (Jedinična doza)	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	oralna suspenzija	Konji	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) špricu (PP)	100 ml	1 boca + 1 špricu	Meso i jestive iznutrice: 3 dana.
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	oralna suspenzija	Konji	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) špricu (PP)	250 ml	1 boca + 1 špricu	Meso i jestive iznutrice: 3 dana.

EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska  Svinje: intramuskularna Konje: intravenska	bočica (staklenih)	20 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.
EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska  Svinje: intramuskularna Konje: intravenska	bočica (staklenih)	50 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.
EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska  Svinje: intramuskularna Konje: intravenska	bočica (staklenih)	100 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.

EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	otopina za injekcije	goveda, svinje i konje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna Konje: intravenska	bočica (staklenih)	250 ml	1 bočica	Goveda: Meso i jestive iznutrice: 15 dana; mlijeko: 5 dana Svinje: Meso i jestive iznutrice: 5 dana Konji: Meso i jestive iznutrice: 5 dana.
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	otopina za injekcije	pse i mačke	Psi: supkutana ili intravenska mačke: supkutana	bočica (staklenih)	10 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	otopina za injekcije	pse i mačke	Psi: supkutana ili intravenska mačke: supkutana	bočica (staklenih)	20 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	otopina za injekcije	pse i mačke	Psi: supkutana ili intravenska mačke: supkutana	bočica (staklenih)	100 ml	1 bočica	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	otopina za injekcije	Goveda I svinje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna	bočica (staklenih)	20 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (Goveda), Meso i jestive iznutrice offal: 5 dana (Svinje)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	otopina za injekcije	Goveda I svinje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje:	bočica (staklenih)	50 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (Goveda), Meso i jestive

					intramuskularna				iznutrice: 5 dana (Svinje)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	otopina za injekcije	Goveda I svinje	Goveda: supkutana ili intravenska Svinje: intramuskularna	bočica (staklenih)	100 ml	1 bočica	Meso i jestive iznutrice: 15 dana (Goveda), Meso i jestive iznutrice: 5 dana (Svinje)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Granule u vrećici.	Konji	Primjena u hrani.	Vrećice (papir/PE/alu/PE)	1	100 vrećica	Meso i jestive iznutrice: 3 dana
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) šprice (pp)	10 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (HDPE) šprice (pp)	15 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (PP) šprice (pp)	3 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	oralna suspenzija	Mačke	Oralnu uporabu	Boca (PP) šprice (pp)	5 ml	1 boca + 1 špricu	Nije primjenjivo
EU/2/07/078/026	Rheumocam	330 mg	Granule u vrećici.	Konji	Primjena u hrani.	Vrećice (papir/PE/alu/PE)	1	10 vrećica	Meso i jestive iznutrice: 3 dana