

EMA/95270/2023
EMEA/H/C/005778

Sitagliptin/metforminklorid Sun (*sitagliptin/metformiklorid*)

Pregled informacija o lijeku Sitagliptin/metforminklorid Sun i zašto je odobren u EU-u

Što je Sitagliptin/metforminklorid Sun i za što se koristi?

Sitagliptin/metforminklorid Sun lijek je za kontrolu razine glukoze (šećera) u krvi u odraslih s dijabetesom tipa 2. Koristi se uz dijetalnu prehranu i tjelovježbu na sljedeće načine:

- kod bolesnika čija se razina glukoze u krvi ne može zadovoljavajuće kontrolirati metforminom (lijekom protiv šećerne bolesti) kao monoterapijom
- kod bolesnika koji već uzimaju kombinaciju sitagliptina i metformina kao zasebne tablete
- u kombinaciji sa sulfonilurejom, PPAR-gama agonistom poput tiazolidinediona ili inzulinom (drugim vrstama lijekova protiv dijabetesa) u bolesnika čija se razina glukoze u krvi ne može zadovoljavajuće kontrolirati tim pojedinačnim lijekovima i metforminom.

Sitagliptin/metforminklorid Sun sadrži djelatne tvari sitagliptin i metforminklorid te je „generički lijek“. To znači da Sitagliptin/metforminklorid Sun sadrži iste djelatne tvari i djeluje na isti način kao i „referentni lijek“ koji je već odobren u EU-u pod nazivom Janumet. Više informacija o generičkim lijekovima potražite u dokumentu s pitanjima i odgovorima [ovdje](#).

Kako se Sitagliptin/Metforminklorid Sun primjenjuje?

Sitagliptin/metforminklorid Sun dostupan je u obliku tableta i izdaje se samo na recept. Lijek se uzima dvaput na dan, a doza ovisi o dozi drugih lijekova protiv dijabetesa koje je bolesnik prethodno uzimao.

Ako se Sitagliptin/metforminklorid Sun uzima sa sulfonilurejom ili inzulinom, dozu sulfonilureje ili inzulina možda će trebati smanjiti kako bi se izbjegla hipoglikemija (niska razina šećera u krvi).

Za više informacija o primjeni lijeka Sitagliptin/metforminklorid Sun pročitajte uputu o lijeku, odnosno obratite se liječniku ili ljekarniku.



Kako djeluje Sitagliptin/metforminklorid Sun?

Dijabetes tipa 2 bolest je pri kojoj gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina za kontrolu razine glukoze u krvi ili kada tijelo ne može učinkovito iskoristiti inzulin. Djelatne tvari lijeka Sitagliptin/metforminklorid Sun različito djeluju kako bi se to ispravilo.

Sitagliptin je inhibitor dipeptidil peptidaze 4 (DPP 4). On djeluje blokiranjem razgradnje inkretinskih hormona u tijelu koji se oslobađaju nakon obroka i stimuliraju gušteraču da luči inzulin. Podizanjem razine inkretinskih hormona u krvi sitagliptin stimulira gušteraču da izluči više inzulina kad je razina glukoze u krvi visoka. Sitagliptin ne djeluje ako je razina glukoze u krvi niska. Sitagliptin također smanjuje količinu glukoze koju proizvodi jetra povećavanjem razine inzulina i snižavanjem razine hormona glukagona.

Metformin uglavnom djeluje blokirajući stvaranje glukoze i smanjujući njezinu apsorpciju u crijevima.

Te radnje zajedno smanjuju razinu glukoze u krvi, što pomaže u kontroli dijabetesa tipa 2.

Kako je Sitagliptin/metforminklorid Sun ispitivan?

Ispitivanja koristi i rizika od djelatnih tvari u odobrenoj primjeni već su provedena s referentnim lijekom Janumet i stoga ih nije potrebno ponavljati za Sitagliptin/metforminklorid Sun.

Kao i za svaki lijek, tvrtka je dostavila podatke o kakvoći lijeka Sitagliptin/metforminklorid Sun. Tvrta je također provela ispitivanja koja su pokazala da je lijek „bioekivalentan“ referentnom lijeku. Dva su lijeka bioekivalentna ako u tijelu postižu iste razine djelatne tvari i stoga se očekuje da imaju isti učinak.

Koje su koristi i rizici od lijeka Sitagliptin/Metforminklorid Sun?

Budući da je Sitagliptin/metforminklorid Sun generički lijek te je bioekivalentan referentnom lijeku, smatra se da su njegove koristi i rizici isti kao i oni referentnog lijeka.

Zašto je Sitagliptin/metforminklorid Sun odobren u EU-u?

Europska agencija za lijekove zaključila je kako je, u skladu sa zahtjevima EU-a, utvrđeno da lijek Sitagliptin/metforminklorid Sun ima usporedivu kakvoću te da je bioekivalentan lijeku Janumet. Stoga je stav Agencije da koristi od lijeka Sitagliptin/metforminklorid Sun, kao i od lijeka Janumet, nadmašuju identificirane rizike te da lijek može biti odobren za primjenu u EU-u.

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena lijeka Sitagliptin/metforminklorid Sun?

Preporuke i mjere opreza kojih se zdravstveni radnici i bolesnici trebaju pridržavati u cilju sigurne i učinkovite primjene lijeka Sitagliptin/metforminklorid Sun nalaze se u sažetku opisa svojstava i u uputi o lijeku.

Kao i za sve lijekove, podatci o primjeni lijeka Sitagliptin/metforminklorid Sun kontinuirano se prate. Sumnje na nuspojave prijavljene za lijek Sitagliptin/metforminklorid Sun pažljivo se procjenjuju i poduzimaju se sve potrebne mjere za zaštitu bolesnika.

Ostale informacije o lijeku Sitagliptin/metforminklorid Sun

Više informacija o lijeku Sitagliptin/metforminklorid Sun dostupno je na mrežnom mjestu Agencije: ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/sitagliptin-metformin-hydrochloride-Sun. Informacije o referentnom lijeku dostupne su i na mrežnom mjestu Agencije.