

VIÐAUKI I
SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur
Sunosi 150 mg filmuhúðaðar töflur

2. INNIHALDSLÝSING

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð, sem jafngildir 75 mg af solríamfetóli.

Sunosi 150 mg filmuhúðaðar töflur

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð, sem jafngildir 150 mg af solríamfetóli.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Filmuhúðuð tafla (tafla)

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur

Gul eða dökkgul, ílöng tafla, 7,6 mm x 4,4 mm, með ígreypu „75“ á annarri hliðinni og deiliskoru á hinn hliðinni.

Töflunni má skipta í jafna skammta.

Sunosi 150 mg filmuhúðaðar töflur

Gul ílöng tafla, 9,5 mm x 5,6 mm, með ígreypu „150“ á annarri hliðinni.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Sunosi er ætlað til að auka vökuvitund og draga úr óhóflegri dagsyfju hjá fullorðnum sjúklingum með drómasýki (með eða án máttleysiskasta (cataplexy)).

Sunosi er ætlað til að auka vökuvitund og draga úr óhóflegri dagsyfju hjá fullorðnum sjúklingum með kæfisvefn þegar ekki hefur tekist að draga úr óhóflegri dagsyfju á fullnægjandi hátt með grunnmeðferð við kæfisvefni, svo sem svefnöndunartæki (continuous positive airway pressure, CPAP).

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Heilbrigðisstarfsmaður með reynslu af meðferð við drómasýki eða kæfisvefni skal hefja meðferðina.

Sunosi er ekki meðferð við undirliggjandi hindruninni í öndunarveginum hjá sjúklingum með kæfisvefn. Viðhalda skal grunnmeðferð við kæfisvefni hjá þessum sjúklingum.

Mæla þarf blóðþrýsting og hjartsláttartíðni áður en meðferð með solríamfetóli er hafin og viðhafa reglulegt eftirlit meðan á meðferð stendur, einkum eftir skammtahækkun. Meðhöndla skal undirliggjandi háþrýsting áður en meðferð með solríamfetóli er hafin og gæta skal varúðar við meðferð sjúklinga í aukinni hættu á alvarlegum hjarta- og æðatilvikum, einkum sjúklinga með undirliggjandi háþrýsting, sjúklinga með þekktan hjarta- og æðasjúkdóm eða sjúkdóm í heilæðum og aldraðra sjúklinga.

Meta skal reglulega þörfina fyrir áframhaldandi meðferð með solríamfetóli. Ef sjúklingur fær aukningu á blóðþrýstingi eða hjartsláttartíðni sem svarar ekki minnkun á skammti solríamfetóls eða öðru viðeigandi lækisfræðilegu innngripi, skal íhuga að hætta meðferð með solríamfetóli. Gæta skal varúðar við notkun annarra lyfja sem auka blóðþrýsting og hjartsláttartíðni (sjá kafla 4.5).

Skammtar

Drómasyki

Ráðlagður upphafsskammtur er 75 mg einu sinni á dag, við vöknun. Íhuga má upphafsskammtinn 150 mg hjá sjúklingum með syfju á alvarlegri stigum ef um klíniska ábendingu er að ræða. Með hliðsjón af klínískri svörun má auka skammtinn enn frekar með því að tvöfalda skammtinn á a.m.k. 3 daga fresti, en ráðlagður hámarksskammtur á dag er 150 mg einu sinni á dag.

Kæfisvefn

Ráðlagður upphafsskammtur er 37,5 mg einu sinni á dag, við vöknun. Með hliðsjón af klínískri svörun má auka skammtinn enn frekar með því að tvöfalda skammtinn á a.m.k. 3 daga fresti, en ráðlagður hámarksskammtur á dag er 150 mg einu sinni á dag.

Sunosi má taka með eða án matar.

Forðast skal töku Sunosi innan við 9 klst. áður en gengið er til náða, þar sem það getur haft áhrif á nætursvefn.

Langtímanotkun

Meta skal reglulega þörfina fyrir áframhaldandi meðferð og viðeigandi skammt meðan á langtímameðferð stendur hjá sjúklingum sem hafa fengið ávísað solríamfetóli.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir (> 65 ára)

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um aldraða sjúklinga. Íhuga skal notkun á minni skömmtum og hafa skal náð eftirlit með þessum sjúklingahópi (sjá kafla 4.4). Solríamfetól skilst að stærstum hluta út um nýrun og þar sem líklegra er að aldraðir sjúklingar hafi skerta nýrnastarfsemi, gæti þurft að aðlaga skammta út frá kreatínínúthreinsun hjá þessum sjúklingum.

Skert nýrnastarfsemi

Væg skerðing á nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun sem nemur 60-89 ml/mín.): Ekki þarf að breyta skömmtum.

Miðlungsmikil skerðing á nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun sem nemur 30-59 ml/mín.): Ráðlagður upphafsskammtur er 37,5 mg einu sinni á dag. Auka má skammtinn í allt að 75 mg einu sinni á dag eftir 5 daga.

Veruleg skerðing á nýrnastarfsemi (kreatínínúthreinsun sem nemur 15-29 ml/mín.): Ráðlagður skammtur er 37,5 mg einu sinni á dag.

Nýrnasjúkdómur á lokastigi (kreatínínúthreinsun < 15 ml/mín.): Solríamfetól er ekki ætlað til notkunar handa sjúklingum með nýrnasjúkdóm á lokastigi.

Börn

Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun Sunosi hjá börnum og unglíngum (<18 ára). Engar upplýsingar liggja fyrir.

Lyfjagjöf

Sunosi er til inntöku.

Gefa má 37,5 mg skammt með því að brjóta 75 mg töflu til helminga með því að nota deiliskoruna.

4.3 Frábendingar

- Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.
- Hjartadrep á síðastliðnu ári, óstöðug hjartaöng, ómeðhöndlaður háþrýstingur, alvarlegar hjartsláttartruflanir og önnur alvarleg hjartavandamál.
- Samhliða notkun mónóamín oxídasahemla (MAOI) eða innan 14 daga eftir að meðferð með MAO-hemlum var hætt (sjá kafla 4.5).

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Geðræn einkenni

Solríamfetól hefur ekki verið metið hjá sjúklingum með sögu um eða samhliða geðrof eða geðhvarfasjúkdóma. Gæta skal varúðar við meðferð slíkra sjúklinga vegna geðrænna aukaverkana sem gætu aukið á einkenni (t.d. geðhæðarlotur) fyrirbyggjandi geðraskana.

Fylgjast skal náið með sjúklingum sem fá meðferð með solríamfetóli með tilliti til aukaverkana eins og kvíða, svefnleysis og þirringis. Algengt var að þessar aukaverkanir kæmu fram við upphaf meðferðar en þær höfðu tilhneigingu til að ganga til baka með áframhaldandi meðferð. Ef þessi einkenni ganga ekki til baka eða versna, skal íhuga að minnka skammta eða stöðva meðferð.

Blóðþrýstingur og hjartsláttartíðni

Greiningar á gögnum úr klínískum rannsóknum sýndu að meðferð með solríamfetóli veldur skammtaháðri aukningu á slagbilsþrýstingi, þanbilsþrýstingi og hjartsláttartíðni.

Faraldsfræðileg gögn sýna að langvinn hækkun á blóðþrýstingi eykur hættu á alvarlegum hjarta- og æðatilvikum (MACE), þ.m.t. heilablóðföllum, hjartaáföllum og dauðsföllum vegna hjarta- og æðasjúkdóma. Umfang þessarar áhættuaukningar er háð hækkuninni á blóðþrýstingi og undirliggjandi hættu á alvarlegum hjarta- og æðatilvikum hjá sjúklingum sem eru í meðferð. Margir sjúklingar með drómasýki og kæfisvefn eru með fleiri áhættuþætti fyrir alvarlegum hjarta- og æðatilvikum, þar á meðal háþrýsting, sykursýki, blóðfituhækkun og háan líkamsþyngdarstuðul (BMI).

Lyfið er ekki ætlað til notkunar hjá sjúklingum með óstöðugan hjarta- og æðasjúkdóm, alvarlegar hjartsláttartruflanir og önnur alvarleg hjartavandamál (sjá kafla 4.3).

Sjúklingar með miðlungsmikla eða verulega skerðingu á nýrnastarfsemi geta verið í meiri hættu á að fá aukningu á blóðþrýstingi eða hjartsláttartíðni vegna lengds helmingunartíma solríamfetóls.

Misnotkun

Sunosi var metið í rannsókn á tilhneigingu til misnotkunar hjá mönnum sem sýndi litla tilhneigingu til misnotkunar. Niðurstöður úr þessari klínísku rannsókn sýndu fram á að hærri skor fyrir vellíðunartilfinningu vegna lyfs (drug liking scores) fengust með solríamfetóli heldur en lyfleysu, en þau voru almennt sambærileg eða lægri en með fentermíni (veikt örvandi lyf). Gæta skal varúðar við meðferð sjúklinga með sögu um misnotkun örvandi lyfja (t.d. metýlfenídats, amfetamíns) eða áfengis

og fylgjast skal með þessum sjúklingum með tilliti til merkja um ranga notkun eða misnotkun solríamfetóls.

Þrönghornsgláka

Ljósopsvíkkun getur komið fyrir hjá sjúklingum sem taka solríamfetól. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með hækkaðan augnþrýsting eða sem eru í hættu á að fá þrönghornsgláku.

Konur á barneignaraldri eða makar þeirra

Konur á barneignaraldri eða karlkyns makar þeirra þurfa að nota örugga getnaðarvörn meðan á notkun solríamfetóls stendur (sjá kafla 4.6).

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á milliverkunum (sjá kafla 5.2).

Ekki má gefa solríamfetól samhliða MAO-hemlum eða innan 14 daga eftir að meðferð með MAO-hemlum var hætt vegna þess að það getur aukið hættuna á háþrýstingsviðbrögðum (sjá kafla 4.3).

Gæta skal varúðar við samhliða notkun lyfja sem auka blóðþrýsting og hjartsláttartíðni (sjá kafla 4.4).

Lyf sem auka magn dópamíns eða bindast dópamínviðtökum beint gætu valdið lyfhrifamilliverkunum við solríamfetól. Gæta skal varúðar við samhliða notkun slíkra lyfja.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstgjöf

Meðganga

Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun solríamfetóls á meðgöngu. Dýrarannsóknir hafa sýnt eituverkanir á æxlun (sjá kafla 5.3). Sunosi er hvorki ætlað til notkunar á meðgöngu né handa konum á barneignaraldri sem ekki nota getnaðarvarnir.

Brjóstgjöf

Ekki er þekkt hvort solríamfetól skilst út í brjóstamjólk. Dýrarannsóknir hafa sýnt að solríamfetól skilst út í móðurmjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti. Vega þarf og meta kosti brjóstgjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstgjöf eða hætta/stöðva tímabundið meðferð með Sunosi.

Frjósemi

Áhrif solríamfetóls á menn eru ekki þekkt. Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á frjósemi (sjá kafla 5.3).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Gert er ráð fyrir litlum áhrifum á hæfni til aksturs hjá sjúklingum sem fá ávallt sama skammtinn af solríamfetóli. Vart getur orðið við sundl og skerta athygli eftir inntöku solríamfetóls (sjá kafla 4.8).

Gera skal sjúklingum sem finna fyrir óeðlilegri syfju og taka solríamfetól grein fyrir því að ekki sé víst að vökuvitund þeirra verði eðlileg á ný. Endurmeta skal oft syfjustig sjúklunga sem finna fyrir óhóflegri dagsyfju, þ.m.t. hjá þeim sem taka solríamfetól, og þeim skal ráðlagt að forðast akstur eða aðrar mögulega hættulegar athafnir ef við á, einkum í upphafi meðferðar eða þegar skammti er breytt.

4.8 Aukaverkanir

Samantekt á öryggi

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur (11,1%), ógleði (6,6%) og minnkuð matarlyst (6,8%).

Tafla yfir aukaverkanir

Tíðni aukaverkana er skilgreind með eftirfarandi MedDRA tíðniflokkun: mjög algengar ($\geq 1/10$), algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$), sjaldgæfar ($\geq 1/1.000$ til $< 1/100$), mjög sjaldgæfar ($\geq 1/10.000$ til $< 1/1.000$), koma örsjaldan fyrir ($< 1/10.000$), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Flokkun eftir líffærum	Aukaverkun	Tíðni
Efnaskipti og næring	Minnkuð matarlyst	Algengar
Geðræn vandamál	Kvíði	Algengar
	Svefnleysi	Algengar
	Píringur	Algengar
	Tannagnístur	Algengar
	Æsingur	Sjaldgæfar
	Eirðarleysi	Sjaldgæfar
Taugakerfi	Höfuðverkur	Mjög algengar
	Sundl	Algengar
	Athyglístruflun	Sjaldgæfar
	Skjálfti	Sjaldgæfar
Hjarta	Hjartsláttarónot	Algengar
	Hraðtaktur	Sjaldgæfar
Æðar	Háþrýstingur	Sjaldgæfar
Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti	Hósti	Algengar
	Mæði	Sjaldgæfar
Meltingarfæri	Ógleði	Algengar
	Niðurgangur	Algengar
	Munnþurrkur	Algengar
	Kviðverkur	Algengar
	Hægðatregða	Algengar
	Uppköst	Algengar
Húð og undirhúð	Ofsvitnun	Algengar
Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað	Taugaspenna	Algengar
	Óþægindi fyrir brjósti	Algengar
	Brjóstverkur	Sjaldgæfar
	Þorsti	Sjaldgæfar
Rannsóknaniðurstöður	Aukin hjartsláttartíðni	Sjaldgæfar
	Hækkaður blóðþrýstingur	Algengar
	Þyngdartap	Sjaldgæfar

Lýsing á völdum aukaverkunum

Upphaf meðferðar

Meirihluti þeirra aukaverkana sem oftast var tilkynnt um komu fyrir á fyrstu 2 vikunum frá upphafi meðferðar og gengu til baka hjá meirihluta sjúklinga með miðgildi tímallengdar sem var innan við 2 vikur.

Ofnæmisviðbrögð

Eftir markaðssetningu lyfsins hefur verið tilkynnt um ofnæmisviðbrögð sem einkennast af einu eða fleiri af eftirfarandi: roðaútbrotum, útbrotum, ofsakláða (sjá kafla 4.3).

Skammtaháðar aukaverkanir

Í 12 vikna klínísku rannsóknunum þar sem 37,5 mg, 75 mg og 150 mg/dag skammtar af solríamfetóli voru bornir saman við lyfleysu voru eftirfarandi aukaverkanir skammtaháðar: höfuðverkur, ógleði, minnkuð matarlyst, kvíði, niðurgangur og munnþurrkur. Skammtatengingin var almennt sambærileg hjá sjúklingum með kæfisvefn og drómasýki. Tilteknar aukaverkanir eins og kvíði, svefnleysi, þirringur og óróleiki komu oft fram við upphaf meðferðar en höfðu tilhneigingu til að ganga til baka við áframhaldandi meðferð. Ef þessi einkenni eru viðvarandi eða versna, skal íhuga að minnka skammta eða hætta meðferð (sjá kafla 4.4).

Meðferð hætt

Í 12 vikna rannsóknunum með samanburði við lyfleysu var meðferð hætt hjá 11 af 396 sjúklingum (3%) sem fengu solríamfetól vegna aukaverkana samanborið við 1 af 226 sjúklingum (<1%) sem fengu lyfleysu. Aukaverkanirnar sem leiddu til þess að meðferðinni var hætt og komu fyrir hjá fleiri en einum sjúklingi sem fékk solríamfetól og í hærra hlutfalli en hjá þeim sem fengu lyfleysu voru kvíði, hjartsláttarónot og eirðarleysi, sem komu allar fyrir með tíðni sem var innan við 1%.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá [Appendix V](#).

4.9 Ofskömmun

Engar tilkynningar um ofskömmun solríamfetóls komu fram í klínískum rannsóknum.

Hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum kom fram eitt tilvik vægrar síðkominnar hreyfitruflunar og eitt tilvik miðlungsmikils hvíldaróþols við gjöf á 900 mg skammti, sem er stærri skammtur en meðferðarskammtur (supratherapeutic dose); einkenni gengu til baka eftir að meðferð var hætt.

Ekkert sértækt mótefni er til staðar. Ef um er að ræða ofskömmun fyrir slysi skal veita einkenna- og stuðningsmeðferð og fylgjast vel með sjúklingum, eftir því sem við á.

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: geðlyf, adrenerg lyf sem verka á miðtaugakerfið, ATC-flokkur: N06BA14

Verkunarháttur

Verkunarháttur solríamfetóls til aukningar á vökuvitund hjá sjúklingum með óhóflega dagsyfju sem tengist drómasýki eða kæfisvefni hefur ekki verið skýrður að fullu. Hins vegar getur verkun þess verið miðlað í gegnum virkni þess sem dópamín og noradrenalín endurupptökuhemils.

Lyfhrif

In vitro gögn

Í rannsóknunum á tengingu geislabindils (radioligand binding studies) með frumum sem tjá klónaða viðtaka/flutningsprótein manna, sýndi solríamfetól sækni í flutningsprótein dópamíns (endurtekinn $K_i=6,3$ og $14,2 \mu\text{M}$) og noradrenalíns (endurtekinn $K_i=3,7$ og $> 10 \mu\text{M}$) en enga merkjanlega sækni í serótónín flutningspróteinið. Solríamfetól hamlaði endurupptöku dópamíns (endurtekið $IC_{50}=2,9$ og $6,4 \mu\text{M}$) og noradrenalíns ($IC_{50}= 4,4 \mu\text{M}$) en ekki serótóníns hjá þessum frumum.

In vivo gögn um dýr

Solríamfetól jók einstaklingsbundið magn dópamíns í rákakjarna (striatum) og noradrenalíns í framheilaberki (prefrontal cortex) við skammta gefna með inndælingu, sem leiddi til greinilegra vökuhvetjandi áhrifa hjá rottum, og sýndi ekki merkjanlega bindingu við flutningsprótein dópamíns og noradrenalíns hjá rottum í tilraun með geislamyndatöku.

Verkun og öryggi

Drómasyki

Í rannsókn 1 sem var 12 vikna, slembiröðuð, tvíblind rannsókn með samanburði við lyfleysu og samhliða hópum, var verkun solríamfetóls rannsökuð hjá fullorðnum sjúklingum með drómasyki (með eða án máttleysiskasta).

Til að fá inngöngu í rannsóknina þurftu sjúklingar að finna fyrir óhóflegri dagsyfju (skor á Epworth syfjukvarðanum [ESS] 10 eða hærra) og eiga í erfiðleikum með að viðhalda vökuvitund (tíminn sem það tekur sjúkling að sofna (sleep latency) er að meðaltali styttri en 25 mínútur) samkvæmt skráðu meðaltali úr fyrstu 4 mælingunum með 40 mínútna MWT-prófinu (Maintenance of Wakefulness Test) við upphaf rannsóknanna.

Mælikvarði á verkun var breyting frá grunngildi fram í viku 12 á: hæfni til að halda sér vakandi samkvæmt mælingum á meðaltali tímans sem það tekur sjúkling að sofna á MWT-prófinu, óhóflegri dagsyfju samkvæmt mælingum með ESS og framför hvað varðar klínískt heildarástand samkvæmt mati með PGIC kvarðanum (Patient Global Impression of Change). ESS er 8 atriða mælikvarði þar sem sjúklingur metur sjálfur líkurnar á því að sofna við hefðbundnar athafnir daglegs lífs. PGIC er 7 atriða kvarði sem nær allt frá „mjög miklar framfarir“ til „mjög mikil versnun“ og leggur mat á hvernig sjúklingur lýsir breytingum á klínísku ástandi sínu.

Einkennandi fyrir sjúklinga með drómasyki var skert vökuvitund eins og fram kemur í upphafsgildum á MWT-prófi fyrir tímenn sem það tekur sjúkling að sofna að meðaltali og óhófleg dagsyfja skv. ESS-skorum í upphafi (tafla 1). Flestir sjúklingar höfðu áður notað geðörvunarlyf. Máttleysisköst voru til staðar hjá u.þ.b. helmingi sjúklinga í heild; lýðfræðilegir eiginleikar og upphafseiginleikar voru svipaðir hjá sjúklingum með máttleysisköst og þeim sem ekki höfðu fengið máttleysisköst.

Í rannsókninni var sjúklingum með drómasyki slembiraðað til að fá solríamfetól 75 mg, 150 mg eða 300 mg (tvöfaldur ráðlagður hámarksdagsskammtur), eða lyfleysu einu sinni á dag. Í 12. viku sýndu sjúklingar sem slembiraðað var til að fá 150 mg skammtinn, tölfræðilega marktækar framfarir á MWT og ESS (samsettur aðalendapunktur), sem og á PGIC (lykilaukaendapunktur), samanborið við lyfleysu. Sjúklingar sem slembiraðað var til að fá 75 mg sýndu tölfræðilega marktækar framfarir á ESS, en ekki á MWT eða PGIC (tafla 1). Þessi áhrif voru skammtaháð, komu fram í viku 1 og héldust yfir allan rannsóknartímenn (mynd 1). Almenn kom í ljós minna umfang áhrifa við sömu skammta hjá sjúklingum með syfju á alvarlegri stigum við upphaf rannsóknarinnar samanborið við sjúklinga sem voru með syfju á vægari stigum. Í 12. viku sýndu sjúklingar sem slembiraðað var til að fá 150 mg af solríamfetóli viðvarandi framfarir hvað varðar vökuvitund á daginn sem voru tölfræðilega marktækar samanborið við lyfleysu í öllum MWT prófunum 5, sem stóðu yfir í u.þ.b. 9 klst. eftir skömmtun. Skammtaháðar framfarir hvað varðar hæfni til að sinna athöfnum daglegs lífs komu í ljós samkvæmt mælingum með FOSQ-10 spurningalistanum (Functional Outcomes of Sleep Questionnaire Short Version). Skammtar stærri en 150 mg á dag veita ekki nægilega aukna verkun til að veita þyngra en skammtatengdar aukaverkanir.

Notkun solríamfetóls hafði ekki áhrif á nætursvefn samkvæmt mælingum með svefnrita (polysomnography).


Tafla 1. Yfirlit yfir verkunarniðurstöður í 12. viku hjá sjúklingum með drómasýki í rannsókn 1

	Meðferðarhópar (N)	Meðalskor í upphafi (SD)	Meðal-breyting frá upphafsgildi	Munur frá lyfleysu (95% CI)	P-gildi
MWT (mín.)	<i>Rannsókn 1</i>		LS meðaltal (SE)		
	Lyfleysa (58)	6,15 (5,68)	2,21 (1,29)	-	-
	Sunosi 75 mg (59)	7,50 (5,39)	4,74 (1,34)	2,62 (-1,04; 6,28)	0,1595
	Sunosi 150 mg (55)	7,85 (5,74)	9,77 (1,33)	7,65 (3,99; 11,31)	<0,0001
ESS	<i>Rannsókn 1</i>		LS meðaltal (SE)		
	Lyfleysa (58)	17,3 (2,86)	-1,6 (0,65)	-	-
	Sunosi 75 mg (59)	17,3 (3,53)	-3,8 (0,67)	-2,2 (-4,0; -0,3)	0,0211
	Sunosi 150 mg (55)	17,0 (3,55)	-5,4 (0,66)	-3,8 (-5,6; -2,0)	<0,0001
		Prósentuhlutfall sjúklinga sem fundu fyrir framförum*	Prósentuhlutfalls-munur frá lyfleysu (95% CI)	P-gildi	
PGIc	<i>Rannsókn 1</i>				
	Lyfleysa (58)	39,7%		-	-
	Sunosi 75 mg (59)	67,8%		28,1 (10,8; 45,5)	0,0023 [†]
	Sunosi 150 mg (55)	78,2%		38,5 (21,9; 55,2)	<0,0001

SD = staðalfrávik; SE = staðalskekkja; LS meðaltal = meðaltal minnstu kvaðrata; Munur frá lyfleysu = LS meðaltalsmunur á milli breytinga frá upphafsgildi fyrir virkt lyf og lyfleysu. Niðurstöður úr MWT eru fengnar úr fyrstu 4 mælingunum með MWT og jákvæð breyting frá upphafsgildi táknar framfarir hvað varðar tímann sem það tekur sjúkling að sofna (sleep latency time). Á ESS táknar neikvæð breyting frá upphafsgildi framfarir hvað varðar óhóflega dagsyfju. *Prósentuhlutfall sjúklinga sem sýna framfarir á PGIc á við um þá sem tilkynntu um mjög miklar, miklar og lágmarksframfarir;

[†]Nafngildi p-gildis.

Mynd 1: Samsettur aðalendapunktur verkunar hjá sjúklingum með drómasýki í rannsókn 1



Kæfisvefn

Í rannsókn 2 sem var 12 vikna, slembiröðuð, tvíblind rannsókn með samanburði við lyfleysu og samhliða hópum, var verkun solríamfetóls rannsökuð hjá fullorðnum sjúklingum með kæfisvefn. Samsetti aðalendapunkturinn og lykilaukaendapunktur rannsóknarinnar voru þeir sömu og í rannsókn 1. Í rannsókn 3 sem var 6 vikna, tvíblind rannsókn með slembiraðaðri afturköllun (withdrawal) og samanburði við lyfleysu, var verkun solríamfetóls rannsökuð hjá fullorðnum sjúklingum með kæfisvefn. Mælikvarði á verkun á slembiraðaða afturköllunartímabilinu var breyting frá upphafi til loka slembiraðaða afturköllunartímabilsins á MWT, ESS og versnun á klínísku heildarástandi samkvæmt mati með PGIC.

Inngönguskilyrði í báðar rannsóknirnar voru að finna fyrir óhóflegri dagsyfju (ESS skor ≥ 10) og erfiðleikum við að viðhalda vökuvitund (meðaltal tímans sem það tekur sjúkling að sofna < 30 mínútur samkvæmt meðaltali úr fyrstu 4 mælingunum með MWT) við upphaf rannsóknanna. Sjúklingar voru hæfir ef þeir: 1) voru að nota grunnmeðferð við kæfisvefni (óháð meðferðarheldni); 2) höfðu áður notað grunnmeðferð í að minnsta kosti einn mánuð með að minnsta kosti einni skráðri aðlögun meðferðarinnar; eða 3) höfðu farið í skurðaðgerð til þess að reyna að meðhöndla undirliggjandi hindrun. Sjúklingar voru hvattir til að halda áfram á núverandi grunnmeðferð við kæfisvefni með sömu meðferðarheldni út alla rannsóknina. Sjúklingar voru eingöngu útilokaðir á grundvelli grunnmeðferðarinnar sem þeir notuðu ef þeir höfðu neitað að prófa grunnmeðferð eins og svefnöndunartæki, bitgóm eða skurðaðgerð til að meðhöndla undirliggjandi hindrun hjá sér.

Einkennandi fyrir sjúklinga með kæfisvefn í rannsókn 2 var skert vökuvitund eins og fram kemur í upphafsgildum á MWT-prófi fyrir tímamann sem það tekur sjúkling að sofna að meðaltali og óhófleg dagsyfja skv. ESS-skorum í upphafi (tafla 2). Um það bil 71% sjúklinganna fylgdu grunnmeðferðinni (t.d. ≥ 4 klukkustundir á nóttu í $\geq 70\%$ nóttu); lýðfræðilegir eiginleikar og upphafseiginleikar voru svipaðir á milli sjúklinga, óháð meðferðarheldni við grunnmeðferð við kæfisvefni. Í upphafi var

grunnmeðferð við kæfisvefni notuð hjá u.þ.b. 73% sjúklinga; af þessum sjúklingum notuðu 92% sjúklinga svefnöndunartæki (PAP).

Sjúklingum var slembiraðað til að fá solríamfetól 37,5 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg (tvöfaldan ráðlagðan hámarksdagsskammt) eða lyfleysu einu sinni á dag. Í 12. viku sýndu sjúklingar sem slembiraðað var í 75 mg og 150 mg skammtaarma, tölfræðilega marktækar framfarir á MWT og ESS (samsettur aðalendapunktur), sem og á PGIc (lykilaukaendapunktur) samanborið við lyfleysu (tafla 2). Sjúklingar sem slembiraðað var til að fá 37,5 mg af solríamfetóli sýndu tölfræðilegar marktækar framfarir byggt á MWT og EES. Þessi áhrif komu fram í viku 1, héldust yfir allan rannsóknartímamann og voru skammtaháð (mynd 2). Í 12. viku sýndu sjúklingar sem slembiraðað var til að fá 75 mg og 150 mg af Sunosi viðvarandi framfarir hvað varðar vökuvitund á daginn sem voru tölfræðilega marktækar samanborið við lyfleysu í öllum MWT prófunum 5, sem stóðu yfir í u.þ.b. 9 klst. eftir skömmtun. Skammtaháðar framfarir hvað varðar hæfni til að sinna athöfnum daglegs lífs komu í ljós samkvæmt mælingum með FOSQ-10 spurningalistanum. Skammtar stærri en 150 mg á dag veita ekki nægilega aukna verkun til að veiga þyngra en skammtatengdar aukaverkanir.

Notkun solríamfetóls hafði ekki áhrif á nætursvefn samkvæmt mælingum með svefnrita (polysomnography) í rannsókn 2. Engar klínískt mikilvægar breytingar á notkun sjúklinga á grunnmeðferð við kæfisvefni komu fram á 12 vikna rannsóknartímabilinu í neinum meðferðarhópi. Meðferðarheldni/skortur á meðferðarheldni við grunnmeðferð við kæfisvefni sýndi ekki fram á vísbendingar um mismun á verkun.

Í rannsókn 3 voru lýðfræðilegir eiginleikar og sjúkdómseiginleikar í upphafi rannsóknar svipaðir og í hjá rannsóknarþýðinu í rannsókn 2. Í upphafi var gefinn 75 mg skammtur einu sinni á dag sem auka mátti um eitt skammtastig með a.m.k. 3 daga millibili, samkvæmt verkun og þoli, í 150 mg eða 300 mg. Sjúklingar máttu einnig minnka skammtinn í 75 mg eða 150 mg. Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með solríamfetóli héldust framfarirnar en sjúklingum sem fengu lyfleysu versnaði (LS munur var að meðaltali 11,2 mínútur á MWT og -4,6 á ESS; í báðum tilvikum var $p < 0,0001$) meðan á slembiraðaða afturköllunartímabilinu stóð eftir 4 vikna opna meðferð. Færri sjúklingar sem fengu meðferð með solríamfetóli tilkynntu um versnun á PGIc (prósentuhlutfallsmunur var -30%; $p = 0,0005$).


Tafla 2. Yfirlit yfir verkunarniðurstöður í 12. viku hjá sjúklingum með kæfisvefn í rannsókn 2

	Meðferðarhópur (N)	Meðalskor í upphafi (SD)	Meðal-breyting frá upphafsgildi	Munur frá lyfleysu (95% CI)	P-gildi
MWT (mín.)	Lyfleysa (114)	12,58 (7,14)	LS meðaltal (SE) 0,21 (1,0)	-	-
	Sunosi 37,5 mg (56)	13,6 (8,15)	4,74 (1,42)	4,53 (1,16; 7,90)	<0,0086
	Sunosi 75 mg (58)	12,44 (6,91)	9,08 (1,36)	8,87 (5,59; 12,14)	<0,0001
	Sunosi 150 mg (116)	12,54 (7,18)	10,96 (0,97)	10,74 (8,05; 13,44)	<0,0001
ESS	Lyfleysa (114)	15,6 (3,32)	LS meðaltal (SE) -3,3 (0,45)	-	-
	Sunosi 37,5 mg (56)	15,1 (3,53)	-5,1 (0,64)	-1,9 (-3,4; -0,3)	0,0161
	Sunosi 75 mg (58)	15,0 (3,51)	-5,0 (0,62)	-1,7 (-3,2; -0,2)	<0,0233
	Sunosi 150 mg (116)	15,1 (3,37)	-7,7 (0,44)	-4,5 (-5,7; -3,2)	<0,0001

	Meðferðarhópur (N)	Meðalskor í upphafi (SD)	Meðal-breyting frá upphafsgildi	Munur frá lyfleysu (95% CI)	P-gildi
		Prósentuhlutfall sjúklinga sem fundu fyrir framförum*		Prósentuhlutfalls-munur frá lyfleysu (95% CI)	P-gildi
PGIc	Lyfleysa (114)	49,1%		-	
	Sunosi 37,5 mg (56)	55,4%		6,2 (-9,69; 22,16)	0,4447
	Sunosi 75 mg (58)	72,4%		23,3 (8,58; 38,01)	0,0035
	Sunosi 150 mg (116)	89,7%		40,5 (29,81; 51,25)	<0,0001

SD = staðalfrávik; SE = staðalskekking; LS meðaltal = meðaltal minnstu kvaðrata; Munur frá lyfleysu = LS meðaltalsmunur á breytingu frá upphafsgildi fyrir virkt lyf og lyfleysu. Niðurstöður úr MWT eru fengnar úr fyrstu 4 mælingunum með MWT og jákvæð breyting frá upphafsgildi táknað framfarir hvað varðar tímann sem það tekur sjúkling að sofna (sleep latency time). Á ESS táknað neikvæð breyting frá upphafsgildi framfarir hvað varðar óhöflega dagsyfju. *Prósentuhlutfall sjúklinga sem sýna framfarir á PGIc á við um þá sem tilkynntu um mjög miklar, miklar og lágmarksframfarir.

Mynd 2: Samsettur aðalendapunktur verkunar hjá sjúklingum með kæfisvefn í rannsókn 2



Langtímaverkun við drómasýki og kæfisvefni

Rannsókn 4 var langtímarannsókn á öryggi og áframhaldi verkunar sem tók til allt að eins árs meðferðar með solríamfetóli, ásamt 2 vikna slembiröðuðu afturköllunartímabili (randomised-withdrawal period) með samanburði við lyfleysu eftir að minnsta kosti 6 mánaða meðferð með solríamfetóli hjá fullorðnum sjúklingum með drómasýki eða kæfisvefn sem höfðu lokið fyrri rannsókn.

Mælikvarði á verkun á slembiraðaða afturköllunartímabilinu var breyting frá upphafi til loka slembiraðaða afturköllunartímabilsins á ESS og versnun á klínísku heildarástandi samkvæmt mati með PGIc. Upphaf skömmtunar og skammtabreytingar voru svipaðar og í rannsókn 3.

Hjá sjúklingum sem fengu meðferð með solríamfetóli héldust framfarirnar en sjúklingum sem fengu lyfleysu versnaði (LS munur var að meðaltali -3,7 á ESS, p<0,0001) meðan á slembiraðaða

afturköllunartímabilinu stóð eftir a.m.k. 6 mánaða opna meðferð. Færri sjúklingar sem fengu meðferð með solríamfetóli tilkynntu um versnun á PG1c (prósentuhlutfallsmunur var -36,2%, $p < 0,0001$). Þessar niðurstöður sýna fram á langtímaviðhald verkunar við áframhaldandi meðferð með solríamfetóli og viðsnúning á ávinningi meðferðar þegar meðferð er hætt.

Hjá sjúklingum sem voru á grunnmeðferð við kæfisvefni í upphafi rannsóknarinnar breyttist notkun á grunnmeðferð við kæfisvefni ekki meðan á langtímarannsókninni stóð.

Börn

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á Sunosi hjá einum eða fleiri undirhópum barna á aldrinum 6 til 18 ára til einkenameðferðar á óhóflegri dagsyfju af völdum drómasýki (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2 Lyfjahvörf

Frásög

Aðgengi solríamfetóls eftir inntöku er u.þ.b. 95% með hámarksþéttni í plasma sem kemur fram við miðgildi T_{max} sem nemur 2 klst. (á bilinu 1,25 til 3 klst.) á fastandi maga.

Inntaka solríamfetóls með fituríkri máltíð leiddi til lágmarksbreytinga á C_{max} og AUC; hinsvegar kom fram um það bil 1 klst. seinkun á T_{max} . Niðurstöðurnar sýna að taka má solríamfetól án tillits til matar.

Dreifing

Dreifingarrúmmál solríamfetóls er u.þ.b. 198,7 l, sem gefur til kynna umfangsmikla dreifingu í vefi utan æðakerfisins. Próteinbinding í plasma var á bilinu 13,3% til 19,4% á þéttibili solríamfetóls sem nam 0,059 til 10,1 $\mu\text{g/ml}$ í mannplasma. Meðaltal þéttihlutfalls á milli blóðs og plasma (blood-to-plasma concentration ratio) var bilinu 1,16 til 1,29 sem bendir til lítills háttar bindingar solríamfetóls við blóðfrumur.

Umbrot

Umbrot solríamfetóls er lítið hjá mönnum.

Milliverkanir

Að undanskilinni veikri hömlun á CYP2D6 (IC_{50} er 360 μM), er solríamfetól ekki hvarfefni eða hemill á nein af helstu CYP ensímum og örvar ekki CYP1A2, 2B6, 3A4 eða UGT1A1 ensím við meðferðarþéttni. Solríamfetól virðist ekki vera hvarfefni eða hemill á himnuflutningspróteinin P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OAT1 eða OAT3. Solríamfetól skilst að stærstum hluta út óbreytt í þvagi og er lágsækni hvarfefni fyrir mörg katjónísk flutningsprótein fyrir virk efni í nýrum, án sterkrar sækni í einstök flutningsprótein sem prófuð voru (OCT2, MATE1, OCTN1 og OCTN2). Solríamfetól er ekki hemill á flutningspróteinin OCT1, MATE2-K, OCTN1 eða OCTN2 í nýrum en er veikur hemill á OCT2 (IC_{50} er 146 μM) og MATE1 (IC_{50} er 211 μM). Samanlagt sýna þessar niðurstöður að ólíklegt sé að klínískt mikilvægar lyfjamilliverkanir eigi sér stað hjá sjúklingum sem taka solríamfetól.

Brotthvarf

Meðalhelmingunartími brotthvarfs solríamfetóls er 7,1 klst. og heildarúthreinsunin er um það bil 19,5 l/klst. Úthreinsun solríamfetóls um nýru er um það bil 18,2 l/klst.

Í rannsókn á massavægi hjá mönnum endurheimtist u.þ.b. 95% af skammtinum í þvagi sem óbreytt solríamfetól og 1% eða minna af skammtinum endurheimtist sem óvirka minniháttar umbrotsefnið N-asetýlsolríamfetól. Úthreinsun um nýru var stærsti hluti heildarúthreinsunarinnar og var u.þ.b. 3-falt meiri en kreatínínúthreinsunin, sem gefur til kynna að virk pípluseyting móðurlyfsins sé líklega helsta brotthvarfsleiðin.

Línulegt/ólínulegt samband

Solríamfetól sýnir fram á línuleg lyfjahlöf á klínískra skammtabilinu. Jafnvægi er náð á 3 dögum og gert er ráð fyrir að gjöf 150 mg einu sinni á dag leiði til lágmarksuppsöfnunar solríamfetóls (1,06-föld sú útsetning sem fæst eftir stakan skammt).

Sérstakir sjúklingahópar

Skert nýrnastarfsemi

Samanborið við þátttakendur með eðlilega nýrnastarfsemi (eGFR \geq 90 ml/mín./1,73 m²) var AUC solríamfetóls u.þ.b. 1,5-, 2,3- og 4,4-falt hærra og t_{1/2} lengdist u.þ.b. 1,2-, 1,9- og 3,9-falt hjá sjúklingum með væga (eGFR 60-89 ml/mín./1,73 m²), miðlungsmikla (eGFR 30-59 ml/mín./1,73 m²) eða verulega (eGFR <30 ml/mín./1,73 m²) skerðingu á nýrnastarfsemi, í sömu röð. Almennur urðu meðalgildi C_{max} og miðgildi T_{max} ekki fyrir áhrifum af skertri nýrnastarfsemi.

Samanborið við þátttakendur með eðlilega nýrnastarfsemi (eGFR \geq 90 ml/mín./1,73 m²) var AUC solríamfetóls u.þ.b. 6,2-falt hærra hjá sjúklingum með nýrnasjúkdóm á lokastigi sem ekki voru í blóðskilun og og 4,6-falt hærra hjá sjúklingum með nýrnasjúkdóm á lokastigi sem voru í blóðskilun og t_{1/2} lengdist a.m.k. 13-falt. Ekki er mælt með notkun solríamfetóls handa sjúklingum með nýrnasjúkdóm á lokastigi. Hjá sjúklingum með nýrnasjúkdóm á lokastigi fjarlægði blóðskilun að meðaltali 21% solríamfetóls.

Aldur, kyn, kynþáttur

Þýðisgreining á lyfjahlöfum benti til þess að innri skýribreytur fyrir aldur, kyn og kynþátt hafi ekki klínískt mikilvæg áhrif á lyfjahlöf solríamfetóls.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum á erfðafni og frjósemi karla og kvenna.

Rannsóknir á eiturverkunum eftir endurtekna skammta með daglegri gjöf með inntöku voru gerðar hjá músum (tímalengd 3 mánuðir, mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (NOAEL) 17 mg/kg/dag), rottum (tímalengd 6 mánuðir með 3 mánaða afturbatátímabili, NOAEL ekki staðfest, LOAEL 29 mg/kg/dag) og hundum (tímalengd 12 mánuðir með 3 mánaða afturbatátímabili, NOAEL ekki staðfest, lægstu mörk um merkjanleg, skaðleg áhrif (LOAEL) 8 mg/kg/dag). Öryggisþættir byggðir á AUC fyrir solríamfetól samkvæmt þessum rannsóknum (byggt á samanburði við klínískt AUC við ráðlagðan hámarksskammt handa mönnum sem nemur 150 mg/dag) voru < 1 fyrir mýs (byggt á NOAEL) og < 2 fyrir rottur og hunda (byggt á LOAEL), einkum vegna yfirdrifinna lyfjafræðilegra áhrifa solríamfetóls á virkni miðtaugakerfisins.

Langtímarannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum hafa verið gerðar á músum sem fengu meðferð með skömmtum sem námu 20, 65 og 200 mg/kg/dag af solríamfetóli til inntöku í allt að 104 vikur og hjá rottum sem fengu meðferð með skömmtum sem námu 35, 80 og 200 mg/kg/dag af solríamfetóli til inntöku í allt að 101 viku. Solríamfetól jók ekki tíðni æxlismyndunar í þessum ævilöngu prófunum á krabbameinsvaldandi áhrifum. Öryggismörk byggð á AUC við ráðlagðan hámarksdagskammt hjá mönnum (ráðlagður hámarksdagskammtur 150 mg/dag) voru u.þ.b. 7,8 hjá músum og u.þ.b. 20,7 hjá rottum. Í ljósi neikvæðra eiturverkana á erfðafni og þess að tíðni æxlismyndunar var ekki aukin í rannsóknunum tveimur á krabbameinsvaldandi áhrifum, má draga þá ályktun að solríamfetól valdi ekki hættu á krabbameini hjá mönnum. Lifunarhlutfall hjá músum sem fengu solríamfetól (karldýr) lækkaði samanborið við samanburðarlyfin, að hámarki við skammt sem nam 65 mg/kg/dag (öryggismörk byggð á AUC við ráðlagðan hámarksdagskammt hjá mönnum voru u.þ.b. 2,9), en ekki hjá rottum sem fengu solríamfetól.

Þroski fósturvísis/fósturs

Hugsanleg áhrif á þroska fósturvísis og fósturs voru rannsökuð hjá unगाfullum rottum og kanínum. Eiturverkanir á fósturvísi og fóstur (fjölgun fangláta eftir hreiðrun hjá rottum, aukin tíðni fráviks í beinagrind sem fólu í sér ranga samstillingu bringubeinsliða (sternebrae malalignment) hjá rottum og kanínum, snúna afturfætur og bogin bein hjá rottum og minnkaða fósturþyngd hjá báðum tegundum) og umhverfuset (situs inversus) hjá rottum kom eingöngu í ljós þegar um var að ræða eiturverkanir á móður (minnkuð líkamsþyngd). Ekki er hægt að ákvarða hvort eiturverkanir á fósturvísi voru afleiðing eiturverkana á móður eða bein áhrif solríamfetóls. Í rannsókn á dreifingu lyfs hjá þunguðum rottum fannst 14C-solríamfetól í fósturhimnu (u.þ.b. tvöfalt meiri þéttni en í blóði), fylgju og í öllu fóstrinu (nánast sambærileg þéttni og í blóði) og því er ekki hægt að útiloka bein eituráhrif á fóstrið. Hjá rottum eru útsetningarmörkin við NOAEL hvað varðar áhrif á móður og þroska lægri en útsetning hjá mönnum (0,6-0,7 á grundvelli AUC) við ráðlagðan hámarksskammt fyrir menn, en hjá kanínum eru útsetningarmörkin við NOAEL hvað varðar áhrif á móður og þroska < 6 (á grundvelli mg/m² líkamsyfirborðs).

Þroski fyrir og eftir got

Útsetning (AUC) hjá rottum sem var 0,6-0,7 sinnum meiri en útsetning hjá mönnum (AUC) við ráðlagðan hámarksskammt fyrir menn, á meðgöngu og við mjólkurgjöf, olli eiturverkunum hjá móður og aukaverkunum á vöxt og þroska hjá afkvæminu. Við útsetningu (AUC) sem nam 8- til 12-faldri útsetningu hjá mönnum (AUC) við ráðlagðan hámarksskammt fyrir menn komu engin langtímaáhrif á nám og minni í ljós, en stuðlar fyrir mökun og þungun hjá afkvæmum voru lækkaðir.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Töflukjarni

Hýdroxýprópýlsellulósi
Magnesíumsterat

Filmuhúð

Pólý(vínýlalkóhól)
Makrógól
Talkúm
Títantvíoxíð (E171)
Gult járnnoxíð (E172)

6.2 Ósamrýmanleiki

Á ekki við.

6.3 Geymsluþol

5 ár.
Glös eftir fyrstu opnun: 120 dagar.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Þynnur: Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Glös: Notið innan 4 mánaða eftir fyrstu opnun. Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

6.5 Gerð íláts og innihald

7 x 1 filmuhúðaðar töflur í götuðum skammtaeiningaþynnum úr PVC/PCTFE/áli.

PVC/PCTFE/álþynna.

Pakkningar innihalda 28 eða 56 filmuhúðaðar töflur.

Glas úr háþéttnipólýetýleni (HDPE) með pólýprópýlen (PP) barnaöryggisloki með innfelldu kísilhlaupsþurrkefni. Hvert glas inniheldur 30 eða 100 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun

Engin sérstök fyrirmæli um förgun.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Atnahs Pharma Netherlands B. V.
Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmörk

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/19/1408/001
EU/1/19/1408/002
EU/1/19/1408/003
EU/1/19/1408/004
EU/1/19/1408/005
EU/1/19/1408/006
EU/1/19/1408/007
EU/1/19/1408/008
EU/1/19/1408/009
EU/1/19/1408/010

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 16. janúar 2020

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

MM/YYYY

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu <http://www.ema.europa.eu>.

VIÐAUKI II

- A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMPYKKT**
- B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN**
- C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS**
- D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS**

A. FRAMLEIÐENDUR SEM ERU ÁBYRGIR FYRIR LOKASAMÞYKKT

Heiti og heimilisfang framleiðenda sem eru ábyrgir fyrir lokasamþykkt

Cilatus Manufacturing Services Limited
Pembroke House
28-32 Pembroke Street Upper
Dublin 2
Co. Dublin
D02 EK84
Írland

B. FORSENDUR FYRIR, EÐA TAKMARKANIR Á, AFGREIÐSLU OG NOTKUN

Ávísun lyfsins er háð sérstökum takmörkunum (sjá viðauka I: Samantekt á eiginleikum lyfs, kafla 4.2).

C. AÐRAR FORSENDUR OG SKILYRÐI MARKAÐSLEYFIS

- **Samantektir um öryggi lyfsins (PSUR)**

Skilyrði um hvernig leggja skal fram samantektir um öryggi lyfsins koma fram í lista yfir viðmiðunardagsetningar Evrópusambandsins (EURD lista) sem gerð er krafa um í grein 107c(7) í tilskipun 2001/83/EB og öllum síðari uppfærslum sem birtar eru í evrópsku lyfjavefgáttinni.

Markaðsleyfishafi skal leggja fram fyrstu samantektina um öryggi lyfsins innan 6 mánaða frá útgáfu markaðsleyfis.

D. FORSENDUR EÐA TAKMARKANIR ER VARÐA ÖRYGGI OG VERKUN VIÐ NOTKUN LYFSINS

- **Áætlun um áhættustjórnun**

Markaðsleyfishafi skal sinna lyfjagátaraðgerðum sem krafist er, sem og öðrum ráðstöfunum eins og fram kemur í áætlun um áhættustjórnun í kafla 1.8.2 í markaðsleyfinu og öllum uppfærslum á áætlun um áhættustjórnun sem ákveðnar verða.

Leggja skal fram uppfærða áætlun um áhættustjórnun:

- Að beiðni Lyfjastofnunar Evrópu.
- Þegar áhættustjórnunarkerfinu er breytt, sérstaklega ef það gerist í kjölfar þess að nýjar upplýsingar berast sem geta leitt til mikilvægra breytinga á hlutfalli ávinnings/áhættu eða vegna þess að mikilvægur áfangi (tengdur lyfjagát eða lágmörkun áhættu) næst.

VIÐAUKI III
ÁLETRANIR OG FYLGISEDILL

A. ÁLETRANIR

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - PAKKNING MEÐ 7, 28 og 56 TÖFLUM 75 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur
solríamfetól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð sem jafngildir 75 mg af solríamfetóli.

3. HJÁLPAEFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðaðar töflur
28 filmuhúðaðar töflur
56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs Pharma Netherlands B. V.
Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/19/1408/001
EU/1/19/1408/002
EU/1/19/1408/003

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sunosi 75 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR - 75 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 75 mg töflur
solríamfetól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - PAKKNING MEÐ 7, 28 og 56 TÖFLUM 150 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 150 mg filmuhúðaðar töflur
solríamfetól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð sem jafngildir 150 mg af solríamfetóli.

3. HJÁLPAEFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

7 x 1 filmuhúðaðar töflur
28 filmuhúðaðar töflur
56 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs Pharma Netherlands B. V.
Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMÉR

EU/1/19/1408/006
EU/1/19/1408/007
EU/1/19/1408/008

13. LOTUNÚMÉR

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sunosi 150 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR - 150 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 150 mg töflur
solríamfetól

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - PAKKNING MEÐ 30 og 100 TÖFLUM 75 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur
solríamfetól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð sem jafngildir 75 mg af solríamfetóli.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmuhúðaðar töflur
100 filmuhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Notið innan 120 daga eftir að glasið var fyrst opnað.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs Pharma Netherlands B. V.
Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/19/1408/004
EU/1/19/1408/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sunosi 75 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLÖS - 75 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 75 mg filmhúðaðar töflur
solríamfetól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð sem jafngildir 75 mg af solríamfetóli.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur
100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku

6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Notið innan 120 daga eftir að glasið var fyrst opnað.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/19/1408/004

EU/1/19/1408/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA - PAKKNING MEÐ 30 og 100 TÖFLUM 150 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 150 mg filmhúðaðar töflur
solríamfetól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð sem jafngildir 150 mg af solríamfetóli.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 filmhúðaðar töflur
100 filmhúðaðar töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Notið innan 120 daga eftir að glasið var fyrst opnað.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs Pharma Netherlands B. V.
Copenhagen Towers
Ørestads Boulevard 108, 5.tv
DK-2300 København S
Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/19/1408/009
EU/1/19/1408/010

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Sunosi 150 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC
SN
NN

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM

GLÖS - 150 mg STYRKLEIKI

1. HEITI LYFS

Sunosi 150 mg filmhúðaðar töflur
solríamfetól

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð sem jafngildir 150 mg af solríamfetóli.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur
100 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.
Til inntöku

**6. SÉRSTÖK VARNADARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN
HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP
Notið innan 120 daga eftir að glasið var fyrst opnað.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Atnahs

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/19/1408/009

EU/1/19/1408/010

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur
Sunosi 150 mg filmuhúðaðar töflur
solríamfetól

▼ Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Sunosi og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Sunosi
3. Hvernig nota á Sunosi
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Sunosi
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Sunosi og við hverju það er notað

Sunosi inniheldur virka efnið solríamfetól. Solríamfetól eykur magn náttúrulegu efnanna dópamíns og noradrenalíns í heilanum. Sunosi hjálpar þér að halda þér vakandi og finna fyrir minni syfju.

Það er notað

- hjá fullorðnum með drómasýki, sem er ástand sem veldur því að þú finnur skyndilega og óvænt fyrir mikilli syfju hvenær sem er. Sumir sjúklingar með drómasýki fá einnig einkenni máttleysiskasta (þegar vöðvar verða máttlausir sem viðbragð við tilfinningum eins og reiði, ótta, hlátri eða óvæntum uppákomum, sem stundum leiðir til falls).
- til að auka vökuvitund og draga úr óhóflegri dagsyfju hjá fullorðnum sjúklingum með kæfisvefn þegar ekki hefur tekist að draga úr óhóflegri dagsyfju á fullnægjandi hátt með grunnmedferð við kæfisvefni, svo sem svefnöndunartæki (continuous positive airway pressure, CPAP).

2. Áður en byrjað er að nota Sunosi

Ekki má nota Sunosi ef þú:

- ert með ofnæmi fyrir solríamfetóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)
- fékkst hjartaáfall á síðastliðnu ári
- ert með alvarlegan hjartasjúkdóm, eins og brjóstverk sem þú fórst nýlega að finna fyrir eða brjóstverk sem varir lengur eða er alvarlegri en venjulega, háan blóðþrýsting sem ekki er almennilega meðhöndlaður með lyfjum, alvarlega hjartsláttaróreglu eða önnur alvarleg hjartavandamál.

- notar tegund lyfs sem kallast „mónóamín oxídasahemill“ (MAOI) við þunglyndi eða Parkisonsveiki, eða hefur notað mónóamín oxídasahemil á síðastliðnum 14 dögum.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Sunosi er notað ef þú ert með eða hefur verið með:

- geðræn vandamál, þ.m.t. geðrof (breytta raunveruleikaskynjun) og öfgakenndar breytingar á skapi (geðhvarfasýki)
- hjartavandamál, hjartaáfall eða heilablóðfall
- háan blóðþrýsting
- áfengissýki, hefur misnotað lyf eða ert háð/ur lyfjum
- augnjúkdóm sem kallast þrönghornsláka.

Láttu læknum eða lyfjafræðing vita ef eitthvað af ofantöldu á við um þig áður en meðferð er hafin. Það er vegna þess að Sunosi getur gert sum þessara vandamála verri. Læknirinn mun vilja fylgjast með því hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

Sunosi kemur ekki í stað grunnmeðferðar við kæfisvefni eins og svefnöndunartækis. Þú átt að halda slíkri meðferð áfram samhliða Sunosi.

Börn og unglingar

Sunosi er ekki ætlað börnum eða unglungum yngri en 18 ára. Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun hjá þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Sunosi

Látið læknum eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Þú mátt ekki nota Sunosi:

- ef þú notar lyf sem kallast „mónóamín oxídasahemill“ (MAOI) við þunglyndi eða Parkisonsveiki eða hefur notað mónóamín oxídasahemil á síðastliðnum 14 dögum vegna þess að notkun mónóamín oxídasahemla samhliða Sunosi getur hækkað blóðþrýstinginn.

Leitaðu ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi ef þú notar lyf sem geta aukið blóðþrýstinginn eða hjartsláttartíðnina, eða ef þú tekur dópamínvirk lyf (t.d. pramipexól, levódópa, metýlfenídat) sem eru notuð til meðferðar við Parkisonsveiki, þunglyndi, fótaóeirð og ofvirkni með athyglisbresti (ADHD).

Meðganga og brjóstgjöf

Við meðgöngu, brjóstgjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum áður en lyfið er notað.

Sunosi er hvorki ætlað til notkunar á meðgöngu né handa konum á barneignaraldri sem ekki nota getnaðarvarnir.

Ef þú ert með barn á brjósti máttu ekki nota Sunosi. Þú og læknirinn þurfið að veða og meta kosti brjóstgjafar fyrir þig og barnið og ávinning meðferðar fyrir þig og ákveða á grundvelli matsins hvort forðast eigi brjóstgjöf eða forðast eða hætta skuli meðferð með Sunosi.

Akstur og notkun véla

Hugsanlegt er að þig sundli eða að þú eigir erfiðara með að einbeita þér. Gættu sérstakrar varúðar við akstur og notkun véla.

Leitaðu ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi ef þú ert ekki viss um hvernig áhrif undirliggjandi ástand þitt eða lyfið hefur á þig þegar þú framkvæmir athafnir sem krefjast athygli, svo sem akstur og meðhöndlun véla:

- í upphafi meðferðar

- ef skammtinum er breytt.

3. Hvernig nota á Sunosi

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Hversu mikið á að nota af Sunosi

Læknirinn lætur þig vita hvaða skammt af Sunosi þú átt að taka.

- Þegar um er að ræða drómasýki er meðferðin venjulega hafin með 75 mg skammti einu sinni á dag, um morguninn þegar þú vaknar. Sumir sjúklingar gætu þurft 150 mg upphafsskammt. Læknirinn lætur þig vita ef þetta á við um þig. Læknirinn gæti ávísað þér minni skammti sem nemur 37,5 mg. Þú getur fengið þennan skammt með því að taka helminginn af einni 75 mg töflu. Töfluna á að brjóta með því að nota deiliskoruna.
- Þegar um er að ræða kæfisvefn er meðferðin venjulega hafin með 37,5 mg skammti einu sinni á dag, um morguninn þegar þú vaknar. Þú getur fengið þennan skammt með því að taka helminginn af einni 75 mg töflu. Töfluna á að brjóta með því að nota deiliskoruna.
- Eftir að minnsta kosti 3 daga meðferð gæti læknirinn aukið dagskammtinn í skammtinn sem hentar þér best.

Ráðlagður hámarksdagskammtur af Sunosi er 150 mg á dag.

Aldraðir (eldri en 65 ára)

Taktu venjulega dagskammtinn nema þú sért með nýrnavandamál (sjá hér að neðan „Sjúklingar með nýrnavandamál“).

Sjúklingar með nýrnavandamál

Ef þú ert með nýrnavandamál gæti læknirinn þurft að breyta skammtinum.

Notkun Sunosi

- Sunosi er til inntöku.
- Taktu Sunosi inn á morgnana þegar þú vaknar.
- Þú getur tekið Sunosi með mat eða á milli máltíða.

Hversu lengi á að taka Sunosi

Þú skalt halda áfram að taka Sunosi eins lengi og læknirinn hefur gefið þér fyrirmæli um.

Ef notaður er stærri skammtur af Sunosi en mælt er fyrir um

Eftirfarandi einkenni komu fram þegar sjúklingur fékk 900 mg af Sunosi (6-faldan hámarksdagskammt): stjórnlausar hreyfingar (síðkomin hreyfitruflun) og óróleiki og erfiðleikar við að halda kyrru fyrir (hvíldaróþol). Þessi einkenni gengu til baka þegar meðferð með Sunosi var hætt.

Hafðu tafarlaust samband við lækinn eða næstu bráðamóttöku til að fá ráðleggingar. Taktu þennan fylgiseðil og þær töflur sem eftir eru með þér.

Ef gleymist að taka Sunosi

Ef þú gleymir að taka lyfið á venjulegum tíma, getur þú enn tekið það ef meira en 9 klst. eru þar til þú ferð að sofa. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Sunosi

Ræddu við lækinn áður en þú hættir að taka Sunosi.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

- Höfuðverkur

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

- Kvíði, erfiðleikar með svefn, þirringur, sundl, taugaspena, óhófleg svitamyndun
- Hraður eða óreglulegur hjartsláttur, einnig kallað hjartsláttarónot, óþægindi fyrir brjósti
- Hár blóðþrýstingur
- Ógleði, niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, uppköst
- Hósti, samanbitnar tennur eða tannagnístur, munnþurrkur
- Lystarleysi.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

- Óróleikatilfinning, eirðarleysi, einbeitingarskortur, hristingur (skjálfti)
- Aukning á hjartsláttartíðni sem er mun meiri en venjulega
- Mæði
- Brjóstverkur
- Þorsti
- Þyngdartap.

Einnig hefur verið tilkynnt um útbrot, kláða og ofsakláða.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint **samkvæmt fyrirkomulagi** sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá [Appendix V](#). Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Sunosi

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og glasinu/þynnunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Þynnur: Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Glös: Notið innan 4 mánaða eftir opnun. Geymið ílátið vel lokað til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Sunosi inniheldur

Virka innihaldsefnið er solríamfetól.

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð, sem jafngildir 75 mg af solríamfetóli.

Sunosi 150 mg filmuhúðaðar töflur

Hver tafla inniheldur solríamfetól hýdróklóríð, sem jafngildir 150 mg af solríamfetóli.

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: Hýdroxýprópýl sellulósi, magnesíumsterat

Filmuhúð: pólývínýlalkóhól, makrógól, talkúm, títantvíoxíð (E171), gult járnóxíð (E172).

Lýsing á útliti Sunosi og pakkningastærðir

Filmuhúðuð tafla

Sunosi 75 mg filmuhúðaðar töflur

Gul eða dökkgul/appelsínugul ílöng tafla með ígreypu „75“ á annarri hliðinni og deiliskoru á hinni hliðinni. Töflunni má skipta í jafna skammta.

Sunosi 150 mg filmuhúðaðar töflur

Gul ílöng tafla með ígreypu „150“ á annarri hliðinni.

Sunosi er fánlegt í þynnupakkningum með 7 x 1 filmuhúðuðum töflum í götuðum skammtaeyningaþynnum úr PVC/PCTFE/áli, 28 og 56 filmuhúðuðum töflum og í glösum með 30 og 100 filmuhúðuðum töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Atnahs Pharma Netherlands B. V.

Copenhagen Towers

Ørestads Boulevard 108, 5.tv

DK-2300 København S

Danmörk

Framleiðandi

Cilatus Manufacturing Services Limited

Pembroke House

28-32 Pembroke Street Upper

Dublin 2

Co. Dublin

D02 EK84

Írland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í MM/YYYY.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu <https://www.ema.europa.eu/>