

Numero EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/06/070/001	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Per uso orale	Flacone + siringa	10 ml	1 Flacone + 2 siringhe	N/A
EU/2/06/070/002	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Per uso orale	Flacone + siringa	32 ml	1 Flacone + 2 siringhe	N/A
EU/2/06/070/003	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Sospensione orale	Cani	Per uso orale	Flacone + siringa	100 ml	1 Flacone + 2 siringhe	N/A
EU/2/06/070/004	Meloxidyl	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani e gatti	Iniezione sottocutanea e endovenosa	Flaconcino vetro tipo I	10 ml	1 Flaconcino	N/A
EU/2/06/070/005	Meloxidyl	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Via sottocutanea, intramuscolare o endovenosa	Flacone (vetro)	50 ml	1 Flacone	Carne e visceri: 15 giorni (bovini) 5 giorni (cavalli, suini) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/06/070/006	Meloxidyl	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Via sottocutanea, intramuscolare o endovenosa	Flacone in scatola di cartone	100 ml	1 Flacone	Carne e visceri: 15 giorni (bovini) 5 giorni (cavalli, suini) Latte: 5 giorni (bovini)
EU/2/06/070/007	Meloxidyl	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e cavalli	Via sottocutanea, intramuscolare o endovenosa	Flacone in scatola di cartone	250 ml	1 Flacone	Carne e visceri: 15 giorni (bovini) 5 giorni (cavalli, suini) Latte: 5 giorni (bovini)

Numero EU	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/06/070/008	Meloxidyl	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti	Per uso orale	Flacone in polietilene ad alta densità + siringa dosatrice	15 ml	1 Flacone + 1 siringa	N/A
EU/2/06/070/010	Meloxidyl	0,5 mg/ml	Sospensione orale	Gatti	Per uso orale	Flacone in vetro + siringa dosatrice	5 ml	1 Flacone + 1 siringa	N/A