

| Numero EU       | Nome di fantasia     | Dosaggio | Forma farmaceutica                                     | Specie di destinazione | Via di somministrazione | Confezionamento   | Contenuto                                 | Confezione   | Tempo di attesa |
|-----------------|----------------------|----------|--|------------------------|-------------------------|---|---|--|-----------------|
| EU/2/14/173/001 | Versican Plus Pi/L4R | --1      | Liofilizzato e sospensione per sospensione iniettabile | Cani                   | Uso sottocutaneo        | Liofilizzato: flacone (vetro)<br>Sospensione: flacone (vetro) | Liofilizzato: 1 dose + sospensione : 1 ml | Liofilizzato: 25 flaconi + sospensione: 25 flaconi | Non pertinente  |
| EU/2/14/173/002 | Versican Plus Pi/L4R | --1      | Liofilizzato e sospensione per sospensione iniettabile | Cani                   | Uso sottocutaneo        | Liofilizzato: flacone (vetro)<br>Sospensione: flacone (vetro) | Liofilizzato: 1 dose + sospensione : 1 ml | Liofilizzato: 50 flaconi + sospensione: 50 flaconi | Non pertinente  |

--1 Liofilizzato (vivo attenuato)  
Virus della parainfluenza canina, tipo 2, ceppo CPiV-2-Bio 15  $10^{3,1} - 10^{5,1}$  TCID<sub>50</sub>\*

Sospensione (inattivata)

*Leptospira interrogans* sierogruppo Icterohaemorrhagiae  
sierovariante Icterohaemorrhagiae, ceppo MSLB 1089

ALR\*\* titolo  $\geq 1:51$

*Leptospira interrogans* sierogruppo Canicola  
sierovariante Canicola, ceppo MSLB 1090

ALR\*\* titolo  $\geq 1:51$

*Leptospira kirschneri* sierogruppo Grippotyphosa  
sierovariante Grippotyphosa, ceppo MSLB 1091

ALR\*\* titolo  $\geq 1:40$

*Leptospira interrogans* sierogruppo Australis  
sierovariante Bratislava, ceppo MSLB 1088

ALR\*\* titolo  $\geq 1:51$   
 $\geq 2,0$  UI\*\*\*

Virus della rabbia, ceppo SAD Vnukovo-32

\* Dose infettante il 50% delle colture di tessuto.

\*\* Reazione di microagglutinazione-litica dell'anticorpo.

\*\*\* Unità Internazionali.