

**I PRIEDAS**  
**PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA**

## **1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS**

Thalidomide Lipomed 100 mg dengtos tabletės

## **2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS**

Kiekvienoje dengtoje tabletėje yra 100 mg talidomido.

Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas

Laktozė monohidratas (100 mg vienoje dengtoje tabletėje), sacharozė (81 mg vienoje dengtoje tabletėje).

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

## **3. FARMACINĖ FORMA**

Dengta tabletė.

Baltos, apvalios, išgaubtos cukrumi dengtos tabletės, kurių skersmuo – maždaug 10,2 mm, o storis – maždaug 5,5 mm.

## **4. KLINIKINĖ INFORMACIJA**

### **4.1 Terapinės indikacijos**

Thalidomide Lipomed derinyje su melfalanu ir prednizonu yra skirtas negydyta daugine mieloma sergančių pacientų, kurie yra 65 metų ir vyresni arba kurių negalima gydyti didelėmis chemoterapinių vaistų dozėmis, pirmaeiliam gydymui.

Thalidomide Lipomed skiriamas ir išduodamas pagal Thalidomide Lipomed neštumo prevencijos programą (žr. 4.4 skyrių).

### **4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas**

Gydyti reikia pradėti ir gydymo eigą stebėti, prižiūrint gydytojams, turintiems gydymo imunomoduliaciniais ar chemoterapiniais preparatais patirties bei visiškai suprantantiems gydymo talidomidu riziką bei žinantiems stebėjimo reikalavimus (žr. 4.4 skyrių).

#### Dozavimas

Rekomenduojama talidomido dozė yra 200 mg per parą, vartojama per burną.

Kiekvienoje Thalidomide Lipomed dengtoje tabletėje yra 100 mg talidomido, o kituose rinkoje esančiuose vaistiniuose preparatuose su talidomidu paprastai būna 50 mg talidomido. Į tai būtina atsižvelgti, ir turi būti pateikti atitinkami nurodymai pacientui.

Galima taikyti ne daugiau kaip 12 gydymo ciklų, kurių kiekvienas trunka 6 savaites (42 dienas).

**1 lentelė. Pradinės dozės, vartojant talidomidą kartu su melfalanu ir prednizonu**

Amžius (metai)	ANS* (/μl)		Trombocitų skaičius (/μl)	Talidomidas <sup>a,b</sup>	Melfalanas <sup>c,d,e</sup>	Prednizonas <sup>f</sup>
≤ 75	> 1 500	IR	≥ 100 000	200 mg per parą	0,25 mg/kg per parą	2 mg/kg per parą
≤ 75	< 1 500, bet ≥ 1 000	ARBA	< 100 000, bet ≥ 50 000	200 mg per parą	0,125 mg/kg per parą	2 mg/kg per parą
> 75	> 1 500	IR	≥ 100 000	100 mg per parą	0,20 mg/kg per parą	2 mg/kg per parą
> 75	< 1 500, bet ≥ 1 000	ARBA	< 100 000, bet ≥ 50 000	100 mg per parą	0,10 mg/kg per parą	2 mg/kg per parą

\* ANS – absoliutus neutrofilų skaičius.

<sup>a</sup> Talidomidą buvo vartojamas kartą per parą prieš miegą 1-42-ąją kiekvieno 42 dienų trukmės gydymo ciklo dienomis.

<sup>b</sup> Žinoma, kad talidomidą sukelia mieguistumą, ir jo vartojimas prieš miegą paprastai pagerina toleravimą.

<sup>c</sup> Melfalanas buvo vartojamas kartą per parą 1-4-ąją kiekvieno 42 dienų trukmės gydymo ciklo dienomis.

<sup>d</sup> Melfalano vartojimas: dozę sumažinti 50 %, jei yra vidutinio sunkumo (kreatinino klirensas: ≥ 30, bet < 50 ml/min.) arba sunkus (kreatinino klirensas: < 30 ml/min.) inkstų nepakankamumas.

<sup>e</sup> Didžiausia melfalano paros dozė: 24 mg (≤ 75 metų asmenims) arba 20 mg (> 75 metų asmenims).

<sup>f</sup> Prednizonas buvo vartojamas kartą per parą 1-4-ąją kiekvieno 42 dienų trukmės gydymo ciklo dienomis.

Reikia stebėti, ar pacientams neatsiranda tromboembolinių reiškinių, periferinės neuropatijos, sunkių odos reakcijų, bradikardijos, sinkopės, somnolencijos neutropenijos ir trombocitopenijos (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius). Priklausomai nuo NVI–BTK (Nacionalinio vėžio instituto bendrųjų toksiškumo kriterijų) laipsnio, gali reikėti dozės vartojimą atidėti, ją mažinti arba nutraukti vaistinio preparato vartojimą.

Jei praleidus dozę praėjo mažiau nei 12 val., pacientas gali ją suvartoti. Jei praleidus dozę įprastu laiku praėjo daugiau nei 12 val., pacientas turi jos nevartoti. Kita dozė geriama įprastu laiku kitą dieną.

*Tromboemboliniai reiškiniai*

Tromboembolijos profilaktiką būtina taikyti bent 5 pirmuosius gydymo mėnesius, ypač tiems pacientams, kuriems yra papildomų trombozės rizikos veiksnių. Rekomenduojami vaistiniai preparatai profilaktikai yra mažos molekulinės masės heparinai ar varfarinas. Sprendimą dėl antitrombozinių profilaktikos priemonių vartojimo galima priimti tik tiksliai įvertinus individualius paciento rizikos veiksnius (žr. 4.4, 4.5 ir 4.8 skyrius).

Jei atsiranda bet kokių tromboembolinių reiškinių, gydymą šiuo vaistiniu preparatu būtina nutraukti ir pradėti įprastinį gydymą antikoaguliantais. Kai gydant antikoaguliantais paciento būklė stabilizuojama ir suvaldomos bet kokios tromboembolinių reiškinių komplikacijos, gydymą galima atnaujinti pradine talidomido doze, įvertinus naudos ir rizikos santykį. Vartojant talidomido, gydymą antikoaguliantais reikia tęsti.

*Neutropenija*

Reikia nuolat stebėti baltųjų kraujo ląstelių kiekį ir diferenciaciją, vadovaujantis onkologijos rekomendacijomis, ypač pacientams, kurie gali būti labiau linkę į neutropeniją. Priklausomai nuo NVI-BTK laipsnio, gali reikėti dozės vartojimą atidėti, ją mažinti arba nutraukti vaistinio preparato vartojimą.

*Trombocitopenija*

Reikia nuolat stebėti trombocitų kiekį, vadovaujantis onkologijos rekomendacijomis. Priklausomai nuo NVI-BTK laipsnio, gali reikėti dozės vartojimą atidėti, ją mažinti arba nutraukti vaistinio preparato vartojimą.

*Periferinė neuropatija*

Dozės korekcija dėl periferinės neuropatijos nurodyta 2 lentelėje.

## 2 lentelė. Rekomenduojamas dozės koregavimas pasireiškus su talidomido vartojimu susijusiai neuropatijai pirmaeilio dauginės mielomos gydymo metu

Neuropatijos sunkumas	Dozės ir gydymo režimo korekcija
1-ojo laipsnio (parestezija, silpnumas ir (arba) refleksų išnykimas) be funkcijos praradimo	Tęsti paciento stebėjimą atliekant klinikinį tyrimą. Jei simptomai pasunkėja, svarstyti dozės mažinimas. Tačiau, jei simptomai pagerėja, dozės mažinti nereikia.
2-ojo laipsnio (trukdanti ne kasdienę veiklą, bet funkciją)	Sumažinti dozę arba pertraukti gydymą ir stebėti pacientą, atliekant klinikinius ir neurologinius tyrimus. Jei neuropatija nepalengvėja arba sunkėja, nutraukti gydymą. Jei neuropatija palengvėja iki 1-ojo laipsnio arba daugiau, gydymą galima atnaujinti, jei naudos ir rizikos santykis yra palankus.
3-ojo laipsnio (trukdanti kasdienę veiklą)	Nutraukti gydymą.
4-ojo laipsnio (neįgalumą sukelianti neuropatija)	Nutraukti gydymą.

Thalidomide Lipomed tiekiamas tik 100 mg dengtų tablečių forma. Todėl Thalidomide Lipomed neįmanoma skirti tiems pacientams, kuriems reikia mažesnės, nei visos 100 mg dozės. Jeigu pacientui reikalinga kitokia vaisto dozė, reikėtų vartoti kitus talidomido preparatus, kurie suteikia tokią galimybę.

### *Alerginės reakcijos ir sunkios odos reakcijos*

Pasireiškus 2-3-ojo laipsnio odos išbėrimui, reikia apsvarstyti galimybę laikinai arba visiškai nutraukti talidomido vartojimą. Talidomido vartojimą reikia nutraukti pasireiškus angioneurozinei edemai, anafilaksinei reakcijai, 4-ojo laipsnio išbėrimui, eksfoliaciniam ar pūsliniam išbėrimui arba įtarus Stevens–Johnson'o sindromą (SJS), toksinę epidermio nekrolizę arba reakciją į vaistą su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (angl. *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS*); šioms reakcijoms išnykus, vėl pradėti vartoti nebegalima.

### *Senyvi pacientai*

≤ 75 metų senyviems žmonėms specifiskai dozės koreguoti nereikia. Rekomenduojama pradinė talidomido dozė > 75 metų pacientams yra 100 mg per parą. Pradinę melfalano dozę > 75 metų senyviems žmonėms reikia sumažinti, atsižvelgiant į pradinius kaulų čiulpų resursus ir inkstų funkciją. Rekomenduojama pradinė melfalano dozė yra nuo 0,1 iki 0,2 mg/kg kūno svorio per parą, atsižvelgiant į kaulų čiulpų resursus, dar 50 % dozę reikia sumažinti esant vidutinio sunkumo (kreatinino klirensas: ≥ 30, bet < 50 ml/min.) arba sunkiam (kreatinino klirensas: < 30 ml/min.) inkstų nepakankamumui. Didžiausia melfalano paros dozė > 75 metų pacientams yra 20 mg (žr. 1 lentelę).

### *Pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi*

Oficialiai talidomido poveikis pacientams, kurių inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi, netirtas. Specifinių dozavimo rekomendacijų tokiems žmonėms nėra. Reikia atidžiai stebėti, ar pacientams, kuriems yra sunkus organo veiklos sutrikimas, neatsiranda nepageidaujamų reakcijų.

### *Vaikų populiacija*

Thalidomide Lipomed nėra skirtas vaikų populiacijai dauginės mielomos indikacijai.

### Vartojimo metodas

Thalidomide Lipomed reikia gerti kartą per parą, prieš einant miegoti, kad būtų mažesnis somnolencinis poveikis. Dengtų tablečių negalima smulkinti. Jei talidomido miltelių pateko ant odos, odą reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu su muilu. Jei talidomido miltelių pateko ant gleivinių, jas reikia gerai nuplauti tekančiu vandeniu (žr. 6.6 skyrių).

### 4.3 Kontraindikacijos

- Padidėjęs jautrumas talidomidui arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.
- Nėščios moterys (žr. 4.6 skyrių).
- Vaisingos moterys, kol neįgyvendintos visos nėštumo prevencijos programos sąlygos (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).
- Vyro paciento nesugebėjimas ar nesutikimas naudotis reikiamomis kontraceptinėmis priemonėmis (žr. 4.4 skyrių).

### 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

#### Teratogeninis poveikis

Talidomidas yra stiprus teratogenas žmogui, labai dažnai sukeliantis sunkius ir gyvybei pavojingus apsigimimus. Talidomido jokia būdu negalima vartoti nėščioms arba galinčioms pastoti moterims, išskyrus tada, kai įgyvendintos visos nėštumo prevencijos programos sąlygos. Nėštumo prevencijos programos sąlygos turi būti įgyvendintos visoms šiuo vaistiniu preparatu gydomoms pacientėms ir pacientams.

#### Nevaisingų moterų kriterijai

Pacientė moteris arba paciento vyro partnerė laikoma vaisinga, išskyrus atvejus, kai jai tinka bent vienas iš toliau išvardytų kriterijų.

- Amžius  $\geq 50$  metų ir  $\geq 1$  metus trunkanti natūrali amenorėja (amenorėja, pasireiškusį po vėžio gydymo arba žindymo laikotarpiu, galimybės pastoti nepašalina).
- Gydytojo ginekologo patvirtintas priešlaikinis kiaušidžių nepakankamumas.
- Anksčiau atlikta abipusė salpingooforektomija arba histerektomija.
- XY genotipas, Turner'io sindromas, gimdos agenezė.

#### Patarimai

Vaisingos moters talidomidu gydyti negalima, nebent jai tinka visos toliau išvardytos būklės:

- Ji supranta galimą teratogeninio poveikio riziką vaisiui.
- Ji supranta būtinybę nepertraukiamai naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą bent 4 savaites prieš pradėdant gydymą, gydymo metu ir paskui bent 4 savaites.
- Net jei vaisingai moteriai yra amenorėja, ji turi laikytis visų patarimų dėl veiksmingos kontracepcijos.
- Ji turi sugebėti taikyti veiksmingas kontracepcijos priemones.
- Ji yra informuota ir supranta galimas nėštumo pasekmes ir būtinybę skubiai kreiptis į savo gydytoją, jei yra nėštumo rizika.
- Ji supranta būtinybę pradėti gydymą, kai tik po neigiamo nėštumo testo jai bus skirtas talidomidas.
- Ji supranta, kad tai yra būtina ir sutinka atlikti nėštumo testą kas 4 savaites, išskyrus atvejus, kai patvirtinta kiaušintakių sterilizacija.
- Ji patvirtina, kad supranta su talidomido vartojimu susijusį pavojų ir atsargumo priemonių būtinumą.

Kadangi talidomido randama spermoje, visi šio preparato vartojantys vyrai kaip atsargumo priemonės turi laikytis toliau išvardytų reikalavimų.

- Jis supranta galimą teratogeninio poveikio riziką, jei turi seksualinių santykių su nėščia arba vaisinga moterimi.
- Jis supranta būtinybę naudoti prezervatyvą, jei turi seksualinių santykių su nėščia arba vaisinga moterimi, nenaudojančia veiksmingų kontraceptinių priemonių (net jei vyrui atlikta vazektomija) gydymo metu, laikinai nutraukus gydymą ir bent 7 dienas baigus gydymą.

- Jis supranta, kad partnerei pastojus jam vartojant talidomidą ar 7 dienas po to, kai talidomidas baigtas vartoti, jis turi nedelsdamas informuoti gydantį gydytoją. Rekomenduojama partnerę nukreipti pas patirties turintį teratologijos specialistą, kad jis moterį iširtų ir patartų.

Vaistą skiriantis gydytojas turi užtikrinti, kad:

- pacientas laikysis nėštumo prevencijos programos sąlygų, įskaitant patvirtinimą, kad viską tinkamai suprato;
- pacientas patvirtins, kad suprato pirmiau minėtas sąlygas.

### Kontracepcija

Vaisingos moterys turi naudoti vieną veiksmingą kontracepcijos metodą bent 4 savaites prieš pradėdamas gydymą, gydymo metu ir bent 4 savaites po gydymo talidomidu, net laikinai nutraukus gydymą, išskyrus atvejus, kai pacientė visiškai ir nuolat susilaiko nuo lytinių santykių, tai patvirtindama kas mėnesį. Jei veiksminga kontracepcija nenustatyta, pacientą būtina pasiūsti pas tinkamai apmokytą sveikatos priežiūros specialistą, kad jis patartų dėl kontracepcijos metodo ir kad pacientas galėtų pradėti juo naudotis.

Veiksmingų kontracepcijos metodų pavyzdžiai gali būti šie:

- implantas;
- levonorgestrelį atpalaiduojanti vartojimo į gimdos ertmę sistema (VGES);
- medroksiprogesterono acetato depo injekcija;
- kiaušintakių sterilizacija;
- lytiniai santykiai tik su vyru, kuriam atlikta vazektomija, kuri turi būti patvirtinta dviem neigiamais sėklos tyrimais;
- ovuliaciją slopinančios kontraceptinės tabletės, kuriose yra tik progesterono (pvz., dezogestrelis).

Dėl venų tromboembolijos rizikos padidėjimo daugine mieloma (DM) sergančioms pacientėms sudėtinių geriamųjų kontraceptinių tablečių vartoti nerekomenduojama (žr. 4.5 skyrių). Jei moteris jau vartoja sudėtinių geriamųjų kontraceptikų, ji turi juos keisti vienu iš pirmiau minėtų veiksmingų kontracepcijos metodų. Venų tromboembolijos rizika išlieka dar 4-6 savaites po sudėtinių geriamųjų kontraceptikų vartojimo nutraukimo.

### Nėštumo testai

Nėštumo testus, kurių minimalus jautrumas yra 25 mTV/ml, vaisingoms moterims būtina atlikti gydytojui prižiūrint taip, kaip nurodyta toliau. Šis reikalavimas taikomas ir toms vaisingoms moterims, kurios nuolat visiškai susilaiko nuo lytinių santykių.

#### Prieš pradėdant gydymą

Medikui prižiūrint, nėštumo testą reikia atlikti apsilankymo, kurio metu išrašomas talidomidas, pas gydytoją metu arba likus 3 dienoms iki apsilankymo pas vaistinio preparato išrašantį gydytoją, jeigu pacientė naudojo veiksmingą kontracepcijos metodą ne mažiau kaip 4 paskutines savaites. Tyrimo duomenys turi patvirtinti, kad gydymą talidomidu pradėdanti pacientė nėra nėščia.

#### Stebėjimas ir gydymo nutraukimas

Medikui prižiūrint, nėštumo testą reikia kartotinais atlikti kas 4 savaites, įskaitant 4 savaites po gydymo nutraukimo, išskyrus atvejus, kai patvirtinta kiaušintakių sterilizacija. Šiuos nėštumo testus reikia atlikti iki apsilankymo, kurio metu gydytojas išrašo vaistinio preparato, dieną arba likus 3 dienoms iki šio apsilankymo.

### Vyrai

Kadangi talidomido randama spermoje, visi pacientai vyrai kaip atsargumo priemonė turi naudotis prezervatyvais gydymo metu, laikinai nutraukus gydymą ir bent 7 dienas baigus gydymą, jei jų partnerė yra nėščia arba vaisinga moteris ir nenaudoja veiksmingų kontracepcijos priemonių.

Pacientai vyrai negali būti sėklos ar spermos donorais gydymo talidomidu metu (įskaitant laikiną gydymo nutraukimą) ir bent 7 dienas baigus gydymą.

### Papildomos atsargumo priemonės

Pacientus būtina informuoti, kad šio vaistinio preparato kitam asmeniui jokiū būdu neduotų, o baigus gydymą, visas nesuvertotas dengtas tabletes grąžintų savo vaistininkui.

Gydymo talidomidu metu (įskaitant laikiną gydymo nutraukimą) ir bent 7 dienas baigus gydymą pacientui negalima būti kraujo donoru.

Ruošdami lizdines plokšteles arba dengtas tabletes, sveikatos priežiūros specialistai ir globėjai turi mūvėti vienkartinės pirštines. Moterims, kurios yra nėščios arba įtaria, kad galbūt yra nėščios, lizdinių plokštelių arba dengtų tablečių ruošti negalima (žr. 6.6 skyrių).

### Mokomoji medžiaga, receptų išrašymo ir vaistinio preparato išdavimo apribojimai

Siekdamas padėti išvengti talidomido poveikio vaisiui, prieš pradėdant skirti gydymą registruotojas pateiks mokomąją medžiagą sveikatos priežiūros specialistams, kuri papildomai įspės apie teratogeninį talidomido poveikį, pateiks patarimų dėl kontracepcijos ir informacijos apie būtinybę atlikti nėštumo tyrimus. Vaistinį preparatą skiriantis gydytojas turi informuoti pacientą apie tikėtiną teratogeninio poveikio riziką ir griežtas nėštumo prevencijos priemones, kaip nurodyta nėštumo prevencijos programoje, ir pateikti jiems atitinkamą paciento mokomąją brošiūrą, paciento kortelę ir (arba) tam lygiavertę priemonę, suderintą su kiekviena nacionaline kompetentinga institucija. Bendradarbiaujant su kiekviena nacionaline kompetentinga institucija buvo įgyvendinta kontroliuojamos prieigos sistema, į kurią įeina paciento kortelės ir (arba) lygiavertės receptų išrašymo ir (arba) vaistinio preparato išdavimo kontrolės priemonės naudojimas ir su indikacija susijusios informacijos rinkimas, siekiant stebėti vaistinio preparato vartojimą ne pagal indikacijas šalies teritorijoje. Būtų idealu, jeigu tą pačią dieną būtų atliktas nėštumo testas, išrašytas receptas ir išduotas vaistinis preparatas. Talidomido vaisingoms moterims galima išduoti per 7 dienas nuo jo išrašymo datos ir turint neigiamą nėštumo tyrimo, atlikto medicinos specialisto priežiūroje, rezultatą. Vaisingoms moterims talidomido receptą galima išrašyti daugiausiai 4 gydymo savaitėms, laikantis patvirtintoms indikacijoms taikomo dozavimo režimo (žr. 4.2 skyrių), visiems kitiems pacientams talidomido galima išrašyti daugiausiai 12 savaičių.

### Amenorėja

Talidomido vartojimas gali būti susijęs su menstruacinio ciklo sutrikimais, įskaitant amenorėją. Talidomido vartojimo metu pasireiškus amenorėjai turi būti daroma prielaida dėl pacientės nėštumo, kol nebus kliniškai patvirtinta, kad pacientė nėra nėščia. Aiškus mechanizmas, kaip talidomidas gali sukelti amenorėją, nenustatytas. Minėti pašaliniai reiškiniai pasireiškė per 6 mėnesius nuo gydymo talidomidu pradžios jaunoms (ikimenopauzinio amžiaus) moterims (amžiaus mediana 36 metai), esant ne daugybinės mielomos indikacijoms, ir pranyko nutraukus talidomido vartojimą. Vertinant su hormonų pokyčiais susijusius klinikinius atvejus nustatyta, kad amenorėja susijusi su sumažėjusia estradiolio koncentracija ir padidėjusia FSH/LH koncentracija. Tyrimo metu antikūnų prieš kiaušides tyrimas buvo neigiamas, prolaktino koncentracija buvo normali.

### Širdies ir kraujagyslių sutrikimai

#### *Miokardo infarktas*

Talidomido vartojantiems pacientams, ypač kuriems yra žinomų rizikos veiksnių, nustatyta miokardo infarkto (MI) atvejų. Pacientus, kuriems yra žinomų MI rizikos veiksnių, tarp jų anksčiau pasireiškusi trombozė, reikia atidžiai stebėti ir imtis veiksnių mėginant sumažinti visus valdomuosius rizikos veiksnius (pvz., rūkymą, padidėjusį kraujospūdį ir hiperlipidemiją).

### *Venų ir arterijų tromboembolijos reiškiniai*

Talidomidu gydomiems pacientams padidėja venų tromboembolijos (pvz., giliųjų venų trombozės, plaučių embolijos) ir arterijų tromboembolijos (pvz., miokardo infarkto ir cerebrovaskulinių reiškinių) rizika (žr. 4.8 skyrių). Ši rizika yra didžiausia per pirmuosius 5 gydymo mėnesius. Trombozės profilaktikos ir antikoagulantų dozavimo rekomendacijos pateiktos 4.2 skyriuje.

Anksčiau buvę tromboemboliniai reiškiniai arba kartu vartojami eritrocitų gamybą skatinantys vaistiniai preparatai ar kitokie vaistiniai preparatai, pvz., pakaitinė hormonų terapija, taip pat gali didinti tromboembolijos riziką šiems pacientams, todėl šių vaistų reikia skirti atsargiai daugine mieloma sergantiems pacientams, vartojantiems talidomido kartu su prednizonu ir melfalanu. Jei hemoglobino koncentracija yra didesnė nei 12 g/dl, eritrocitų gamybą skatinančių preparatų vartojimą būtina nutraukti. Reikia imtis veiksmų mėginant sumažinti visus valdomuosius rizikos veiksnius (pvz., rūkymą, padidėjusį kraujospūdį ir hiperlipidemiją).

Pacientams ir gydytojams patariama stebėti, ar neatsiranda tromboembolijos požymių ir simptomų. Pacientams reikia nurodyti kreiptis į gydytoją, jei pasireiškia tokie simptomai kaip dusulys, krūtinės skausmas, rankų ar kojų patinimas.

### Skyd liaukės sutrikimai

Gauta pranešimų apie hipotirozės atvejus. Prieš pradėdant gydymą, rekomenduojamas optimalus gretutinių ligų, darančių įtaką skyd liaukės funkcijai, suvaldymas. Rekomenduojama gydymo pradžioje ir vėliau stebėti skyd liaukės funkciją.

### Periferinė neuropatija

Periferinė neuropatija yra labai dažna, galinti būti sunki nepageidaujama reakcija į gydymą talidomidu. Ji gali sukelti nepraėinančią pažaidą (žr. 4.8 skyrių). Trečios fazės tyrimo metu vidutinis laikas iki pirmųjų neuropatijos reiškinių atsiradimo buvo 42,3 savaitės.

Jeigu pacientui pasireiškė periferinė neuropatija, reikia laikytis dozės ir gydymo režimo koregavimo nurodymų, pateiktų 4.2 skyriuje.

Rekomenduojama atidžiai stebėti, ar neatsiranda neuropatijos simptomų: parestezijos, dizestezijos, diskomforto, koordinacijos sutrikimo ar silpnumo.

Prieš pradėdant gydyti talidomidu, rekomenduojama atlikti klinikinius ir neurologinius tyrimus, o gydymo metu reguliariai įprastu būdu pacientą stebėti.

Vaistinių preparatų, siejamų su neuropatija, talidomido vartojantiems pacientams reikia skirti atsargiai (žr. 4.5 skyrių).

Talidomidas gali pasunkinti jau esančią neuropatiją, todėl jo negalima vartoti pacientams, kuriems yra klinikinių periferinės neuropatijos simptomų arba požymių, nebent klinikinė nauda būtų didesnė už riziką.

### Sinkopė, bradikardija ir atrioventrikulinė blokada

Reikia stebėti, ar nepasireiškia sinkopė, bradikardija ir atrioventrikulinė blokada; kadangi tokiu atveju gali reikėti mažinti dozę arba nutraukti vaistinio preparato vartojimą.

### Plaučių hipertenzija

Talidomidu gydomiems pacientams nustatyti plaučių hipertenzijos atvejai, kai kurie iš jų baigėsi mirtimi. Prieš pradėdant gydymą talidomidu ir gydymo metu reikia įvertinti, ar pacientams nėra gretutinės širdies ir plaučių ligos požymių bei simptomų.



## Kraujo sutrikimai

### *Neutropenija*

3-iojo ar 4-ojo laipsnio neutropenija kaip nepageidaujama reakcija dažniau nustatyta daugine mieloma sergantiems pacientams, gydytiems melfalano, prednizono ir talidomido (MPT) deriniu nei melfalano ir prednizono (MP) deriniu: atitinkamai 42,7 % ir 29,5 % (tyrimas IFM 99-06). Talidomidu gydant po to, kai jis pateko į rinką, nustatytos tokios nepageidaujamos reakcijos, kaip febrilinė neutropenija ir pancitopenija. Pacientus reikia stebėti, taip pat gali reikėti dozės vartojimą atidėti, ją mažinti arba nutraukti vaistinio preparato vartojimą (žr. 4.2 skyrių).

### *Trombocitopenija*

Trombocitopenija, įskaitant 3-iojo ar 4-ojo laipsnio nepageidaujamas reakcijas, nustatyta daugine mieloma sergantiems pacientams, gydytiems MPT deriniu. Pacientus reikia stebėti, taip pat gali reikėti dozės vartojimą atidėti, ją mažinti arba nutraukti vaistinio preparato vartojimą (žr. 4.2 skyrių). Pacientams ir gydytojams patariama stebėti, ar neatsiranda kraujavimo požymių ir simptomų, įskaitant taškines kraujosruvas, kraujavimą iš nosies bei kraujavimą iš virškinimo trakto, ypač kartu vartojant vaistinių preparatų, galinčių sukelti kraujavimą (žr. 4.5 ir 4.8 skyrius).

## Kepenų sutrikimai

Nustatyti kepenų sutrikimai, daugiausiai nenormalūs kepenų tyrimų rezultatai. Specifinių hepatoceliulinių ir cholestazinių sutrikimų nenustatyta, kai kuriais atvejais sutrikimai buvo mišrūs. Didžioji dalis reakcijų pasireiškė per pirmuosius 2 gydymo mėnesius ir nutraukus gydymą talidomidu praėjo savaime, negydant. Reikia stebėti pacientų kepenų funkciją, ypač jei jau yra kepenų sutrikimas arba vienu metu vartojama vaistinių preparatų, kurie gali skatinti kepenų funkcijos sutrikimą (žr. 4.8 skyrių).

## Alerginės reakcijos ir sunkios odos reakcijos

Vartojant talidomidą, nustatyti alerginių reakcijų, įskaitant angioneurozinę edemą, anafilaksinę reakciją, bei sunkių odos reakcijų, įskaitant Stivenso-Džonsono (*Stevens-Johnson*) sindromą (SJS), toksinę epidermio nekrolizę (TEN) ir reakciją į vaistą su eozinofilija ir sisteminiiais simptomais (angl. *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS*), atvejais. Vaistinių preparatą skiriantys asmenys turi informuoti pacientus apie šių reakcijų požymius ir simptomus ir nurodyti pacientams nedelsiant kreiptis į gydytoją, jeigu atsirado šių simptomų. Pasireiškus 2-3-iojo laipsnio odos išbėrimui, reikia apsvarstyti galimybę laikinai arba visiškai nutraukti talidomido vartojimą. Talidomido vartojimą reikia nutraukti pasireiškus angioneurozinei edemai, anafilaksinei reakcijai, 4-ojo laipsnio išbėrimui, ekfoliaciniam ar pūsliniam išbėrimui arba įtarus SJS, TEN arba *DRESS*; šioms reakcijoms išnykus, vėl pradėti vartoti nebegalima. (žr. 4.2 ir 4.8 skyrius).

## Mieguistumas

Talidomidas labai dažnai sukelia mieguistumą. Pacientus reikia įspėti, kad vengtų situacijų, kai mieguistumas gali kelti pavojų, ir kad prieš vartodami kitokių mieguistumą sukeliančių vaistinių preparatų pasitartų su gydytoju. Ligonį reikia stebėti, nes gali tekti mažinti dozę.

Pacientus reikia informuoti apie galimą protinės ir (arba) fizinės gebos, reikalingos sudėtingoms užduotims atlikti, sutrikimą (žr. 4.7 skyrių).

## Naviko irimo sindromas

Naviko irimo sindromo rizika yra tiems pacientams, kuriems prieš gydymą navikas yra labai proliferavęs. Šiuos pacientus būtina stebėti ypač atidžiai ir imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

## Infekcijos

Reikia stebėti, ar pacientams nepasireiškia sunkių infekcijų, įskaitant sepsį ir sepsinį šoką.

Talidomidu gydomiems pacientams nustatyti viruso reaktyvacijos atvejai, įskaitant sunkius juostinės pūslelinės arba hepatito B viruso (HBV) reaktyvacijos atvejus.

Kai kuriais juostinės pūslelinės reaktyvacijos atvejais išsivystė diseminuota juostinė pūslelinė, dėl kurios reikėjo laikinai sustabdyti gydymą talidomidu ir taikyti tinkamą gydymą antivirusiniais preparatais.

Kai kuriais atvejais dėl HBV reaktyvacijos išsivystė ūminis kepenų nepakankamumas, dėl kurio reikėjo nutraukti talidomido vartojimą. Prieš pradėdant gydymą talidomidu, reikia nustatyti, ar nėra hepatito B viruso infekcijos. Pacientams, kuriems tyrimais nustatyta HBV infekcija, rekomenduojama pasitarti su gydytoju, turinčiu hepatito B gydymo patirties.

Viso gydymo metu reikia atidžiai stebėti, ar pacientams kurie anksčiau buvo infekuoti nepasireiškia viruso reaktyvacijos, įskaitant aktyvios HBV infekcijos, požymių ir simptomų.

### Progresuojanti daugiažidinė leukoencefalopatija (PDL)

Vartojant talidomidą, gauta pranešimų apie progresuojančios daugiažidinės leukoencefalopatijos atvejus, įskaitant mirtinus atvejus. Apie PDL buvo pranešta praėjus nuo kelių mėnesių iki kelerių metų nuo gydymo talidomidu pradžios. Paprastai apie tokius atvejus buvo pranešama, kai pacientai tuo pat metu vartojo deksametazoną arba pacientai prieš tai buvo gydyti kitais imuninę sistemą slopinančiais chemoterapiniais vaistiniais preparatais. Gydytojai turi reguliariai tikrinti pacientų sveikatos būklę ir apsvarstyti PDL galimybę atlikdami diferencinę diagnostiką pacientams, kuriems pasireiškia nauji arba sunkėjantys neurologiniai simptomai, taip pat kognityviniai arba su elgesiu susiję požymiai arba simptomai. Pacientams taip pat reikia patarti informuoti savo partnerį (-ę) arba juos slaugančius asmenis apie jiems taikomą gydymą, nes šie žmonės gali pastebėti simptomus, kurių pats pacientas gali nepastebėti.

Vertinant PDL galimybę, reikia atlikti neurologinį vertinimą, galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimą ir cerebrospinalinio skysčio analizę dėl *John Cunningham* viruso (JCV) DNR polimerazės grandininės reakcijos (PGR) būdu arba atliekant galvos smegenų biopsiją su tyrimu dėl JCV. Gavus neigiamus analizės dėl JCV PGR būdu rezultatus, PDL galimybės negalima atmesti. Nepavykus nustatyti kitos diagnozės, galima pagrįsti tolesnį paciento būklės stebėjimą ir atlikti papildomus tyrimus.

Įtarus PDL, nebegalima toliau vartoti vaistinio preparato, kol nebus atmesta PDL galimybė. Patvirtinus PDL, būtina visiškai nutraukti gydymą talidomidu.

### Ūminė mieloidinė leukemija (ŪML) ir mielodisplaziniai sindromai (MDS)

Vieno klinikinio tyrimo, kuriame dalyvavo negydyta DM sergantys pacientai, vartojantys melfalano, prednizono ir talidomido derinį (MPT), nustatytas statistiškai reikšmingas ŪML ir MDS padažnėjimas. Ši rizika laikui bėgant didėjo; po dvejų metų šių ligų dažnis sudarė apie 2 %, po trejų metų – apie 4 %. Padidėjęs antrųjų pirminių navikų (APN) dažnis taip pat nustatytas lenalidomidą vartojantiems pacientams, kuriems buvo naujai diagnozuota dauginė mieloma. Iš invazinių APN MDS/ŪML atvejai nustatyti pacientams, vartojantiems lenalidomido derinį su melfalanu arba netrukus po didelės melfalano dozės pavartojimo ir autologinės kamieninių ląstelių transplantacijos.

Prieš pradėdant gydymą talidomido deriniu su melfalanu bei prednizonu, reikia atsižvelgti į gydymo talidomidu naudą ir ŪML bei MDS riziką. Gydytojai turi atidžiai įvertinti pacientus prieš gydymą ir gydymo metu naudodami standartinę atrankinę vėžio patikrą ir skirti reikiamą gydymą.

### Pacientams, kurių inkstų arba kepenų funkcija sutrikusi

Tyrimai, kuriuose dalyvavo sveiki tiriamieji ir daugine mieloma sergantys pacientai, rodo, kad inkstų arba kepenų funkcija talidomidui reikšmingos įtakos neturi (žr. 5.2 skyrių). Tačiau oficialių tyrimų, kuriuose dalyvautų pacientai, kurių inkstų ar kepenų funkcija sutrikusi, neatlikta, todėl reikia atidžiai stebėti, ar pacientams, kuriems yra sunkus inkstų arba kepenų funkcijos sutrikimas, nepasireiškia nepageidaujamų reiškinių.

### Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas

#### *Laktozė*

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra laktozės monohidrato. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – galaktozės netoleravimas, visiškas laktazės trūkumas arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

#### *Sacharozė*

Šio vaistinio preparato sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius.

## **4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika**

Talidomidas yra silpnas citochromo P450 izofermentų substratas, todėl kliniškai svarbi sąveika su vaistiniais preparatais, kurie yra šios fermentų sistemos inhibitoriai ir (arba) induktoriai, nėra tikėtina. Talidomido nefermentinė hidrolizė, esanti pagrindinis šalinimo mechanizmas, rodo, kad su talidomidu susijusios sąveikos tarp vaistų tikimybė yra maža.

### Kitų vaistinių preparatų slopinamojo poveikio sustiprėjimas

Talidomidas turi slopinamųjų savybių, todėl gali didinti slopinimą, sukeltą trankviliantų, migdomųjų preparatų, antipsichozinių vaistinių preparatų, H<sub>1</sub> histamininių receptorių blokatorių, opioidų darinių, barbitūratų ir alkoholio. Talidomidu kartu su vaistiniais preparatais, sukeliančiais mieguistumą, reikia gydyti atsargiai.

### Bradikardija

Kadangi talidomidas gali sukelti bradikardiją, atsargiai juo reikia gydyti kartu su vaistiniais preparatais, sukeliančiais tokį pat farmakodinaminį poveikį, pvz., veikliosiomis medžiagomis, sukeliančiomis polimorfinę paroksizminę skilvelinę tachikardiją, beta adrenoblokatoriais arba anticholinesteraziais preparatais.

### Vaistiniai preparatai, sukiantys periferinę neuropatiją

Vaistiniais preparatais, kurių vartojimas siejamas su periferine neuropatija (pvz., vinkristinu ir bortezomibu), talidomido vartojančius pacientus reikia gydyti atsargiai.

### Hormoniniai kontraceptiniai preparatai

Talidomidas nesąveikauja su hormoniniais kontraceptiniais preparatais. Noretindono ir etinilestradiolio farmakokinetika buvo tirta 10 sveikų moterų, išgėrusių vienkartinę 1 mg noretindono ir 0,75 mg etinilestradiolio dozę. Nusistovėjus pusiausvyrinei koncentracijai, rezultatai buvo panašūs kartu vartojant 200 mg talidomido per parą arba jo nevartojant. Vis dėlto sudėtinių hormoninių kontraceptinių preparatų kartu vartoti nerekomenduojama, nes gali padidėti venų tromboembolinės ligos rizika.

## Varfarinas

Sveikiems savanoriams, 4 paras vartojusiems kartotines talidomido dozes po 200 mg kartą per parą, poveikis tarptautiniam normalizuotam santykiui (TNS) nepasireiškė. Vis dėlto kadangi vėžiu sergantiems pacientams trombozės rizika yra didesnė ir kadangi dėl kortikosteroidų poveikio gali pagreitėti varfarino metabolizmas, gydymo talidomido ir prednizono deriniu metu bei pirmas savaites po gydymo patariama atidžiai sekti TNS.

## Digoksinas

Talidomido ir digoksino sąveikos nenustatyta. 18 sveikų savanorių vyrų, vartojančių kartotines 200 mg talidomido dozes, organizme akivaizdaus poveikio vienkartinės dozės digoksino farmakokinetikai nebuvo. Be to, vienkartinė 0,5 mg digoksino dozė neturėjo akivaizdaus poveikio talidomido farmakokinetikai. Ar poveikis daugine mieloma sergantiems pacientams bus kitoks, nežinoma.

## **4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis**

### Vaisingos moterys / vyrų ir moterų kontracepcija

Vaisingos moterys privalo naudoti vieną veiksmingą kontracepcijos metodą bent 4 savaites prieš pradėdant gydymą, gydymo metu, įskaitant laikiną gydymo nutraukimą, ir bent 4 savaites po gydymo talidomidu (žr. 4.4 skyrių). Jei talidomido vartojanti moteris pastoja, gydymą būtina tuojau pat nutraukti ir pacientę nukreipti pas patyrusį teratologijos specialistą, kad jis pacientę iširtų ir patartų.

Kadangi talidomido randama spermoje, visi pacientai vyrai kaip atsargumo priemone turi naudotis prezervatyvu gydymo metu, laikinai nutraukus gydymą ir bent 7 dienas baigus gydymą, jei turi lytinių santykių su nėščia arba su vaisinga moterimi, kuri nenaudoja veiksmingų kontracepcijos priemonių. Tai taikoma net ir tuo atveju, jei vyrui buvo atlikta vazektomija.

Jei talidomido vartojančio paciento partnerė pastoja, rekomenduojama ją nukreipti pas patirties turintį teratologijos specialistą, kad jis moterį iširtų ir patartų.

### Nėštumas

Talidomido negalima vartoti nėštumo metu ir vaisingoms moterims, kol neįgyvendintos visos nėštumo prevencijos programos sąlygos (žr. 4.3 skyrių).

Žmogui talidomidas yra stiprus teratogenas, labai dažnai (maždaug 30 %) sukeliantis sunkius ir gyvybei pavojingus apsigimimus: viršutinių ir (arba) apatinių galūnių ektromeliją (ameliją, fokomeliją, hemimeliją), mikrotiją su išorinės klausos landos anomalija (nematoma arba jos nėra), vidurinės ir vidinės ausies pažeidimus (rečiau), akių pažeidimus (anoftalmiją, mikroftalmiją), įgimtą širdies ligą, inkstų anomalijas. Buvo aprašyta ir kitokių rečiau pasitaikančių apsigimimų.

### Žindymas

Nežinoma, ar talidomidas išsiskiria į motinos pieną. Tyrimai su gyvūnais rodo, kad talidomidas išsiskiria į motinos pieną. Gydymo talidomidu metu žindymą reikia nutraukti.

### Vaisingumas

Tyrimų su triušiais duomenimis, poveikio patinų ir patelių vaisingumui vaistinis preparatas nedaro, nors patinams pasireiškė sėklidžių degeneracija.

#### 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Thalidomide Lipomed, vartojamas rekomenduojamomis dozėmis, gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus veikia silpnai ar vidutiniškai.

Talidomidas gali sukelti nuovargį (labai dažnas poveikis), galvos svaigimą (labai dažnas), mieguistumą (labai dažnas) ir neryškų matymą (dažnas) (žr. 4.8 skyrių). Talidomidu gydomus pacientus reikia perspėti, kad pajutę nuovargį, svaigimą, mieguistumą ar pradėjęs neryškiai matyti, nevairuotų, nevaldytų mechanizmų ir nedirbtų kitokio pavojingo darbo.

#### 4.8 Nepageidaujamas poveikis

##### Saugumo duomenų santrauka

Daugumai talidomido vartojančių pacientų gali atsirasti nepageidaujamų reakcijų. Dažniausiai pastebėtos nepageidaujamos reakcijos, susijusios su talidomido derinio su melfalanu ir prednizonu vartojimu, yra šios: neutropenija, leukopenija, vidurių užkietėjimas, mieguistumas, parestezija, periferinė neuropatija, anemija, limfopenija, trombocitopenija, galvos svaigimas, dizestezija, tremoras ir periferinė edema.

Be pirmiau išvardytų nepageidaujamų reakcijų, talidomido vartojant kartu su deksametazonu kitų klinikinių tyrimų metu, labai dažna nepageidaujama reakcija buvo nuovargis, dažnos nepageidaujamos reakcijos buvo praeinantis išemijos priepuolis, sinkopė, galvos sukimasis, hipotenzija, nuotaikos pokytis, nerimas, neryškus matymas, pykinimas ir dispepsija, nedažnos nepageidaujamos reakcijos buvo cerebrovaskulinis priepuolis, divertikulo perforacija, peritonitas, ortostatinė hipotenzija ir bronchitas.

Kliniškai svarbiausios nepageidaujamos reakcijos, susijusios su talidomido derinio su melfalanu ir prednizonu arba deksametazonu vartojimu, yra giliųjų venų trombozė ir plaučių embolija, periferinė neuropatija, sunkios odos reakcijos, įskaitant *Stevens–Johnson* sindromą, toksinę epidermio nekrolizę ir reakciją į vaistą su eozinofilija ir sisteminiais simptomais, sinkopė, bradikardija ir galvos svaigimas (žr. 4.2, 4.4 ir 4.5 skyrius).

##### Lentelėje pateikiamos nepageidaujamos reakcijos

3 lentelėje išvardytos tik tos pagrindinio tyrimo metu ir vaistui esant rinkoje nustatytos nepageidaujamos reakcijos, kurių priežastinis ryšys su gydymu šiuo vaistiniu preparatu yra pagrįstas. Jų dažnis yra paremtas duomenimis, gautais pagrindinio lyginamojo klinikinio tyrimo, kurio metu tirtas talidomido derinio su melfalanu ir prednizonu poveikis pacientams, sergantiems anksčiau negydyta daugine mieloma, metu.

Dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas ( $\geq 1/10$ ); dažnas (nuo  $\geq 1/100$  iki  $< 1/10$ ); nedažnas (nuo  $\geq 1/1\ 000$  iki  $< 1/100$ ); retas (nuo  $\geq 1/10\ 000$  iki  $< 1/1\ 000$ ); labai retas ( $< 1/10\ 000$ ) ir dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamas poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

#### **3 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos į vaistą (NRV) registruotos pagrindinio klinikinio tyrimo metu, vartojant talidomido derinį su melfalanu ir prednizonu, bei pasireiškusias vaistui esant rinkoje**

Organų sistemos klasė	Dažnis	Nepageidaujama reakcija
Infekcijos ir infestacijos	Dažnas	Pneumonija
	Dažnis nežinomas	Sunkios infekcijos (pvz., mirtinas sepsis, įskaitant sepsinį šoką) <sup>a</sup> , virusinės infekcijos, įskaitant juostinę pūslelinę ir hepatito B viruso reaktyvacijos atvejus <sup>a</sup>

Organų sistemos klasė	Dažnis	Nepageidaujama reakcija
<b>Gerybiniai, piktybiniai ir nepatikslinti navikai (tarp jų cistos ir polipai)</b>	Dažnas	Ūminė mieloidinė leukemija <sup>b,c</sup>
	Nedažnas	Mielodisplazinis sindromas <sup>b,c</sup>
	Dažnis nežinomas	Naviko irimo sindromas <sup>a</sup>
<b>Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai</b>	Labai dažnas	Neutropenija, leukopenija, anemija, limfopenija, trombocitopenija
	Dažnas	Febrilinė neutropenija <sup>a</sup> , pancitopenija <sup>a</sup>
<b>Imuninės sistemos sutrikimai</b>	Dažnis nežinomas	Alerginės reakcijos (padidėjęs jautrumas, angioneurozinė edema, anafilaksinė reakcija, dilgėlinė) <sup>a</sup>
<b>Endokrininiai sutrikimai</b>	Dažnis nežinomas	Hipotirozė <sup>a</sup>
<b>Psichikos sutrikimai</b>	Dažnas	Sumišimas, depresija
<b>Nervų sistemos sutrikimai</b>	Labai dažnas	Periferinė neuropatija <sup>b</sup> , tremoras, galvos svaigimas, parestezija, dizestezija, mieguistumas
	Dažnas	Traukuliai <sup>a</sup> , sutrikusi koordinacija
	Dažnis nežinomas	Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas (UGES) <sup>a,b</sup> , Parkinsono ligos simptomų pasunkėjimas <sup>a</sup>
<b>Ausų ir labirintų sutrikimai</b>	Dažnas	Sutrikusi klausa arba kurtumas <sup>a</sup>
<b>Širdies sutrikimai</b>	Dažnas	Širdies nepakankamumas, bradikardija
	Nedažnas	Miokardo infarktas <sup>a</sup> , prieširdžių virpėjimas <sup>a</sup> , atrioventrikulinė blokada <sup>a</sup>
<b>Kraujagyslių sutrikimai</b>	Dažnas	Giliųjų venų trombozė <sup>b</sup>
<b>Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai</b>	Dažnas	Plaučių embolija <sup>b</sup> , intersticinė plaučių liga, bronchopneumopatija, dusulys
	Dažnis nežinomas	Plaučių hipertenzija <sup>a</sup>
<b>Virškinimo trakto sutrikimai</b>	Labai dažnas	Vidurių užkietėjimas
	Dažnas	Vėmimas, burnos džiūvimas
	Nedažnas	Žarnų nepraeinamumas <sup>a</sup>
	Dažnis nežinomas	Virškinimo trakto perforacija <sup>a</sup> , pankreatitas <sup>a</sup> , kraujavimas iš virškinimo trakto <sup>a</sup>
<b>Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai</b>	Dažnis nežinomas	Kepenų sutrikimai <sup>a</sup>
<b>Odos ir poodinio audinio sutrikimai</b>	Dažnas	Toksinis odos išbėrimas, išbėrimas, odos sausmė
	Dažnis nežinomas	Stevens-Johnson'o sindromas <sup>a,b</sup> , toksinė epidermio nekrolizė <sup>a,b</sup> , reakcija į vaistą su eozinofilija ir sisteminiais simptomais <sup>a,b</sup> , leukocitoklastinis vaskulitas <sup>a</sup>
<b>Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai</b>	Dažnas	Inkstų nepakankamumas <sup>a</sup>
<b>Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai</b>	Dažnis nežinomas	Seksualinės funkcijos sutrikimas <sup>a</sup> , menstruacijų sutrikimai, įskaitant amenorėją <sup>a</sup>
<b>Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai</b>	Labai dažni	Periferinė edema
	Dažnas	Karščiavimas, bendrasis negalavimas, silpnumas

<sup>a</sup> Nustatytos vaistiniams preparatui esant rinkoje.

<sup>b</sup> Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimą žr. 4.8 skyriuje.

<sup>c</sup> Apie ūminę mieloidinę leukemiją ir mielodisplazinį sindromą pranešta viename klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo anksčiau negydyta daugine mieloma sergantys pacientai, vartojantys kartu melfalaną, prednizoną ir talidomidą (MPT).

## Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas

### *Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai*

Nepageidaujamos kraujo reakcijos pateikiamos, lyginant su pasireiškusiomis lyginamąjį preparatą vartojusiems tiriamiesiems, nes lyginamasis preparatas darė reikšmingą poveikį kraujui (4 lentelė).

### **4 lentelė. Kraujo sutrikimų, pasireiškusių tyrimo IFM 99-06 metu gydant melfalano ir prednizono (MP) deriniu arba melfalano, prednizono ir talidomido (MPT) deriniu, palyginimas (žr. 5.1 skyrių)**

	n (pacientų %)	
	MP (n = 193)	MPT (n = 124)
	3 ir 4 laipsnio*	
<b>Neutropenija</b>	57 (29,5)	53 (42,7)
<b>Leukopenija</b>	32 (16,6)	32 (25,8)
<b>Anemija</b>	28 (14,5)	17 (13,7)
<b>Limfopenija</b>	14 (7,3)	15 (12,1)
<b>Trombocitopenija</b>	19 (9,8)	14 (11,3)

\* PSO kriterijai

Kitos nepageidaujamos reakcijos, nustatytos talidomidui esant rinkoje, tačiau nepasireiškusios pagrindinio tyrimo metu, buvo febrilinė neutropenija ir pancitopenija.

### *Teratogeninis poveikis*

Vaisiaus mirties gimdoje arba sunkių apsigimimų, visų pirma fokomelijos, rizika yra labai didelė. Talidomido negalima vartoti visu nėštumo laikotarpiu (žr. 4.4 ir 4.6 skyrius).

### *Venų ir arterijų tromboembolijos reiškiniai*

Nustatyta, kad pacientams, gydomiems talidomidu, padidėja venų tromboembolijos (pvz., giliųjų venų trombozės ir plaučių embolijos) bei arterijų tromboembolijos (pvz., miokardo infarkto ir cerebrovaskulinių reiškinų) rizika (žr. 4.4 skyrių).

### *Periferinė neuropatija*

Gydymo talidomidu metu periferinė neuropatija yra labai dažna, galinti būti sunki nepageidaujama reakcija. Ji gali sukelti nepraeančią pažaidą (žr. 4.4 skyrių). Paprastai periferinė neuropatija pasireiškia vaistinio preparato nuolat vartojant kelis mėnesius, tačiau jos atvejų buvo ir po palyginti trumpalaikio vartojimo. Didėjant bendrai suvartotai dozei ir ilgėjant gydymo trukmei, neuropatijos sukeliama sutrikimų, dėl kurių prireikia visiškai ar laikinai nutraukti gydymą arba mažinti dozę, atsiranda dažniau. Simptomų gali atsirasti ir praėjus šiek tiek laiko po gydymo talidomidu nutraukimo, ir jie gali po truputį išnykti arba ne.

### *Užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas (UGES) (angl. Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)) / užpakalinės grįžtamosios leukoencefalopatijos sindromas (UGLS) (angl. Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS))*

Nustatyti UGES / UGLS atvejai. Be kitų, pasireiškė šie požymiai ir simptomai: regos sutrikimas, galvos skausmas, traukulių priepuoliai ir pakitusi psichinė būklė, su susijusia hipertenzija arba be jos. UGES / UGLS diagnozę reikia patvirtinti atliekant smegenų vizualizaciją. Daugumai nustatytų atvejų buvo būdingi pripažinti UGES / UGLS rizikos veiksniai, įskaitant hipertenziją, inkstų sutrikimą ir tuo pat metu vartojamas dideles kortikosteroidų dozes ir (arba) taikomą chemoterapiją.

### *Ūminė mieloidinė leukemija (ŪML) ir mielodisplaziniai sindromai (MDS)*

Vieno klinikinio tyrimo metu, kuriame dalyvavo daugine mieloma sergantys pacientai, vartojantys melfalano, prednizono ir talidomido derinį, nustatyti ŪML ir MDS atvejai (žr. 4.4 skyrių).

### *Alerginės reakcijos ir sunkios odos reakcijos*

Gydant talidomidu pranešta apie alerginių reakcijų, įskaitant angioneurozinę edemą, anafilaksinę reakciją bei sunkių odos reakcijų, įskaitant Stivenso–Džonsono (*Stevens–Johnson*) sindromą (SDS), toksinę epidermio nekrolizę (TEN) ir reakciją į vaistą su eozinofilija ir sisteminiais simptomais (angl. *drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms*, DRESS), atvejus. Jei įtariama angioneurozinė edema, anafilaksinė reakcija, SDS, TEN arba DRESS, gydymo talidomidu atnaujinti negalima (žr. 4.2 ir 4.4 skyrių).

### Senyvi pacientai

Nepageidaujamų reakcijų pobūdis > 75 metų pacientams, vartojantiems 100 mg talidomido kartą per parą, buvo panašus į nepageidaujamų reakcijų pobūdį ≤ 75 metų pacientams, vartojantiems 200 mg talidomido kartą per parą (žr. 3 lentelę). Tačiau > 75 metų pacientams sunkių nepageidaujamų reakcijų pasireiškimo dažnio rizika gali būti didesnė.

### Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi [V priede](#) nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

## **4.9 Perdozavimas**

Literatūroje buvo paskelbta apie aštuoniolika perdozavimo atvejų, kai buvo pavartotos didesnės nei 14,4 gramų dozės. Trylika iš šių atvejų pacientai vartojo tik talidomidą; suvartotas kiekis buvo 350–4 000 mg. Šiems pacientams nepasireiškė jokių simptomų arba pasireiškė mieguistumo, dirglumo, prastos savijautos ir (arba) galvos skausmo simptomai. Vienam 2 metų vaikui, suvartojusiam 700 mg dozę, be mieguistumo ir dirglumo, pasireiškė nenormalus padų refleksas. Mirties atvejų nebuvo, visi vaistinio preparato perdozavę pacientai pasveiko be pasekmių. Specifinio talidomido priešnuodžio nėra. Reikia sekti vaistinio preparato perdozavusio ligoonio gyvybinius požymius ir tinkamomis palaikomosiomis priemonėmis palaikyti kraujospūdį bei kvėpavimą.

## **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

### **5.1. Farmakodinaminės savybės**

Farmakoterapinė grupė – imunosupresantai, kiti imunosupresantai, ATC kodas - L04AX02.

Talidomidas turi chiralinį centrą ir klinikinėje praktikoje vartojamas (+)-(R)- ir (-)-(S)-talidomido racemato pavidalu. Talidomido veikimo ribos nėra visiškai iširtos.

### Veikimo mechanizmas

Talidomidas turi imunomoduliuojamąjį poveikį, mažina uždegimą ir gali sukelti antineoplazminį poveikį. *In vitro* tyrimų ir klinikinių tyrimų duomenimis, minėtas talidomido poveikis gali priklausyti nuo per didelės naviko nekrozės faktoriaus alfa (TNF- $\alpha$ ) gamybos slopinimo bei pasirinktų ląstelės paviršiaus adheziją veikiančių molekulių, dalyvaujančių leukocitų migracijoje ir antiangiogeniniame aktyvume, moduliacijos silpninimo. Be to, talidomidas yra barbitūratams nepriklausantis centrinio poveikio sedaciją sukeliantis migdomasis vaistinis preparatas. Antibakterinio poveikio jis neturi.




## Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

III fazės atsitiktinių imčių, atvirojo, lygiagrečių grupių, daugiacentrio IFM 99-06 tyrimo rezultatai parodė, kad naujai diagnozuota daugine mieloma sergantiems pacientams, vartojant talidomido derinį su melfalanu ir prednizonu 12 ciklų po 6 savaites, išgyvenamumas yra ilgesnis. Šiame tyrime dalyvavo 65-75 metų pacientai, 41 % (183/447) jų buvo 70 metų arba vyresni. Talidomido dozės mediana buvo 217 mg, > 40 % pacientų buvo taikyti 9 gydymo ciklai. Melfalano ir prednizono paros dozė buvo atitinkamai 0,25 mg/kg kūno svorio ir 2 mg/kg kūno svorio. Ją tiriamieji vartojo 1-4 kiekvieno 6 savaitių gydymo ciklo dienomis.

Be analizės pagal protokolą, buvo pateikti IFM 99-06 tyrime dalyvavusių pacientų tolesnio 15 mėn. stebėjimo duomenys. Bendro išgyvenamumo (BI) mediana MPT ir MP grupėse buvo atitinkamai 51,6 9(± 4,5) ir 33,2 (± 3,2) mėnesio (97,5 % PI: 0,42-0,84). Šis 18 mėnesių skirtumas buvo statistiškai reikšmingas: mirties rizikos sumažėjimo rizikos santykis MPT grupėje buvo 0,59, 97,5 % PI – 0,42 0,84, p reikšmė – < 0,001 (žr. 1 pav.).

### **1 paveikslas. Bendras išgyvenamumas, atsižvelgiant į taikytą gydymą**



## Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti referencinio vaistinio preparato, kurio sudėtyje yra talidomido, tyrimų su visais vaikų populiacijos pogrupiais duomenis dauginei mielomai (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje).

### **5.2. Farmakokinetinės savybės**

#### Absorbcija

Išgerto talidomido absorbcija yra lėta. Didžiausia koncentracija plazmoje atsiranda praėjus 1-5 val. po pavartojimo. Tuo pačiu metu valgomas maistas lėtina absorbciją, bet nekeičia bendro absorbuojamo vaistinio preparato kiekio.

## Pasiskirstymas

Prie kraujo plazmos baltymų (+)-(R) ir (-)-(S) enantiomerų prisijungia atitinkamai 55 % ir 65 %. Talidomido randama vyrų spermoje, jo koncentracija būna panaši į koncentraciją kraujo plazmoje (žr. 4.4 skyrių). Amžiaus, lyties, inkstų funkcijos ir kraujo cheminės sudėties kintamieji talidomido pasiskirstymui reikšmingos įtakos neturėjo.

## Biotransformacija

Beveik visas talidomidas metabolizuojamas vykstant nefermentinei hidrolizei. Plazmoje nepakitęs talidomidas sudaro 80 % kraujotakos komponentų. Šlapime nepakitęs talidomidas sudarė nedidelę dalį (< 3 % dozės). Be talidomido, hidrolizės produktų N-(o-karboksibenzoil) glutarimido ir ftaloilzoglutamino, susidariusių nefermentiniais procesais, taip pat buvo plazmoje ir dideliais kiekiais šlapime. Oksidacinis metabolizmas bendro talidomido metabolizmo reikšmingai neveikia. Citochromo P450 katalizuojamas talidomido metabolizmas kepenyse yra minimalus. Yra tyrimų *in vitro* duomenų, rodančių, kad prednizonas gali sukelti fermentų indukciją, dėl kurios gali sumažėti kartu vartojamų vaistinių preparatų ekspozicija. Šių duomenų reikšmė *in vivo* nežinoma.

## Eliminacija

Išgėrus vieną 50-400 mg dozę, talidomido pusinės eliminacijos laikas kraujo plazmoje buvo 5,5-7,3 val. Išgėrus vieną 400 mg radioaktyviuoju izotopu žymėto talidomido dozę, bendras vidutinis pašalinimas iki 8-tos dienos sudarė 93,6 % vartotos dozės. Didžioji dalis radioaktyvios dozės buvo pašalinta per 48 valandas po dozės vartojimo. Daugiausiai buvo pašalinta su šlapimu (> 90 %); pašalinimas su išmatomis buvo mažas.

Tarp kūno svorio ir nustatyto talidomido klirensa yra tiesinis ryšys; daugine mieloma sergantiems pacientams, kurių kūno svoris buvo 47-133 kg, talidomido klirensas buvo nuo maždaug 6-12 l/h; tai rodo 0,621 l/h talidomido klirensa didėjimą, kūno svoriui padidėjus 10 kg.

## Tiesinis / netiesinis pobūdis

Bendra sisteminė ekspozicija (AUC) yra proporcinga dozei, vartojant vienkartinės dozes. Farmakokinetikos priklausomumo nuo laiko nepastebėta.

## Kepenų ir inkstų funkcijos sutrikimas

Talidomido metabolizmas veikiant kepenų citochromų P450 sistemai yra minimalus, ir nepakitęs talidomidas nėra pašalinamas per inkstus. Inkstų funkcijos (kreatinino klirensas) ir kepenų funkcijos (kraujo sudėtis) rodikliai rodo minimalų inkstų ir kepenų funkcijos poveikį talidomido farmakokinetikai. Iš esmės talidomido metabolizmo kepenų arba inkstų disfunkcija veikti neturėtų. Pacientų, sergančių paskutinės stadijos inkstų liga, duomenys inkstų funkcijos poveikio talidomido farmakokinetikai nerodo.

## **5.3 Iki klinikinių saugumo tyrimų duomenys**

Šunų patinams po vienerių vaistinio preparato vartojimo metų nustatyti laikini tulžies kamščiai kanalėliuose, kai ekspozicija 1,9 karto viršijo ekspoziciją žmogaus organizme.

Tyrimų metu pelėms ir žiurkėms sumažėjo trombocitų kiekis. Atrodo, kad šis pokytis priklausė nuo talidomido poveikio ir atsirado tada, kai ekspozicija buvo 2,4 karto didesnė už atsirandančią žmogaus organizme. Šis sumažėjimas klinikinių požymių nesukėlė.

Vienerių metų tyrimų metu, kalėms, kurių organizme vaistinio preparato ekspozicija buvo 1,8 karto arba atitinkamai daugiau negu 3,6 karto didesnė už ekspoziciją žmogaus organizme, nustatytas pieno liaukų padidėjimas ir (arba) pamėlynavimas bei rujos pailgėjimas. Šių rezultatų reikšmė žmogui nežinoma.

Talidomido poveikis skydliaukės funkcijai buvo nustatinėtas tyrimais su žiurkėmis ir šunimis. Šunims jokio poveikio nepastebėta, bet žiurkėms atsirado akivaizdus nuo dozės priklausomas bendro ir laisvojo T4 kiekio sumažėjimas, kuris buvo pastovesnis patelėms.

Mutageninio ar genotoksinio poveikio, atliekant standartinius talidomido genotoksiškumo tyrimus, nenustatyta. Pelėms, žiurkių patinams ir patelėms, kurių organizme ekspozicija buvo atitinkamai maždaug 15, 13 ir 39 kartus didesnė už apskaičiuotą klinikinį rekomenduojamos pradinės dozės AUC, kancerogeninio poveikio nepastebėta.

Tyrimai su gyvūnais parodė, kad atskirų gyvūnų rūšių jautrumas teratogeniniam talidomido poveikiui skiriasi. Įrodyta, kad žmonėms talidomidas yra teratogenas.

Tyrimų su triušiais duomenimis, poveikio patinų ir patelių vaisingumui vaistinis preparatas nedaro, nors patinams pasireiškė sėklidžių degeneracija.

Toksinio poveikio perinataliniu ir postnataliniu laikotarpiu tyrimo metu triušių patelėms, ne didesnės kaip 500 mg/kg kūno svorio talidomido paros dozės sukėlė abortus, padažnino negyvo vaisiaus atsivedimą ir sumažino jauniklių gyvybingumą žindymo laikotarpiu. Jaunikiams, kurių motinos buvo gydomos talidomidu, dažniau įvykdavo abortas, sumažėdavo jų kūno svorio prieaugis, pakisdavo išmokimo procesas ir atmintis, sumažėdavo vaisingumas ir pastojimo indeksas.

## **6. FARMACINĖ INFORMACIJA**

### **6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas**

#### Tabletės branduolys

Laktozė monohidratas  
Kopovidonas (E 1208)  
Talkas (E 553b)  
Magnio stearatas (E 470b)  
Mikrokristalinė celiuliozė (E 460(i))

#### Tabletės dangalas

Sunkusis kaolinas (E 559)  
Sacharozė  
Gumiarabikas (E 414)  
Kalcio karbonatas (E 170)  
Talkas (E 553b)  
Titano dioksidas (E 171)

### **6.2 Nesuderinamumas**

Duomenys nebūtini.

### **6.3 Tinkamumo laikas**

5 metai

### **6.4 Specialios laikymo sąlygos**

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

## **6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys**

PVC ir aliuminio lizdinė plokštelė, kurioje yra 10 dengtų tablečių.

Pakuotės dydis: 30 dengtų tablečių (trys lizdinės plokštelės).

## **6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti**

Dengtų tablečių negalima smulkinti. Jei talidomido miltelių pateko ant odos, reikia nedelsiant gerai nuplauti odą vandeniu su muilu. Jei talidomido miltelių pateko ant gleivinių, juos reikia gerai nuplauti vandeniu.

Ruošdami lizdines plokšteles arba dengtas tabletes, sveikatos priežiūros specialistai ir globėjai turi mūvėti vienkartinės pirštines. Po to pirštines reikia nusiimti atsargiai, kad vaistinio preparato nepatektų ant odos, įdėti į hermetiškai uždaromą plastikinį polietileninį maišelį ir pašalinti laikantis vietinių reikalavimų. Tada reikia gerai nusiplauti rankas vandeniu su muilu. Moterims, kurios yra nėščios arba įtaria, kad galbūt yra nėščios, lizdinių plokštelių arba dengtų tablečių ruošti negalima (žr. 4.4 skyrių).

Gydymą baigus, visas nesuvartotas dengtas tabletes būtina grąžinti vaistininkui.

## **7. REGISTRUOTOJAS**

Lipomed GmbH  
Hegenheimer Strasse 2  
79576 Weil am Rhein  
Vokietija

## **8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)**

EU/1/22/1676/001

## **9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA**

Registravimo data 2022 m. rugsėjo 19 d.

## **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje <http://www.ema.europa.eu/>.

## **II PRIEDAS**

- A. GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ**
- B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**
- C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI**
- D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI**

## **A. GAMINTOJAS (-AI), ATSAKINGAS (-I) UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ**

Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai)

Lipomed GmbH  
Hegenheimer Strasse 2  
79576 Weil am Rhein  
Vokietija

## **B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo ([preparato charakteristikų santraukos] 4.2 skyrių).

## **C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI**

- **Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai (PASP)**

Šio vaistinio preparato PASP pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąrašė (*EURD* sąrašė), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje.

## **D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI**

- **Rizikos valdymo planas (RVP)**

Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose.

Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas:

- pareikalavus Europos vaistų agentūrai;
- kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos mažinimo) etapą.

- **Papildomos rizikos mažinimo priemonės**

1. Registruotojas turi suderinti kontroliuojamos prieigos programos elementus su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje prekiaujama Thalidomide Lipomed, ir nacionaliniu lygiu įgyvendinti tokią programą, kuri užtikrintų, kad:
  - prieš vaistinio preparato išrašymą (ir išdavimą, jei taikoma ir suderinus su nacionaline kompetentinga institucija) visi sveikatos priežiūros specialistai, kurie galės išrašyti (ar išduoti) Thalidomide Lipomed, gautų mokomosios informacijos sveikatos priežiūros specialistams rinkinį, kuriame yra:
    - mokomoji brošiūra sveikatos priežiūros specialistams;
    - mokomosios brošiūros pacientams;
    - paciento kortelė;
    - informuotumo apie riziką formos;
    - informacija, kur rasti naujausią preparato charakteristikų santrauką (PCS).
2. Kiekvienoje valstybėje narėje registruotojas turi įgyvendinti nėštumo prevencijos programą (NPP). NPP elementai kiekvienoje valstybėje narėje turi būti suderinti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis ir įgyvendinti, prieš vaistiniam preparatui patenkant į rinką.

3. Registruotojas turi suderinti komosios informacijos sveikatos priežiūros specialistams rinkinio turinį su kiekvienos valstybės narės nacionaline kompetentinga institucija, prieš vaistiniam preparatui patenkant į rinką, ir užtikrinti, kad medžiagoje būtų pagrindiniai elementai, aprašyti toliau.
4. Registruotojas turi suderinti kontroliuojamos prieigos programos įgyvendinimą kiekvienoje valstybėje narėje.
5. Prieš patvirtinant nacionalinei kompetentingai institucijai ir prieš vaistiniam preparatui patenkant į valstybių, kuriose referencinis vaistas nepatvirtintas ir juo neprekiuojama, rinką, registruotojas turi užtikrinti, kad mokomoji medžiaga būtų pateikta nacionalinėms pacientų organizacijoms ir jų peržiūrėta arba, jeigu tokios organizacijos nėra ar ji negali dalyvauti, – tam tikroms pacientų grupėms. Geriausia, kad tokie pacientai nebūtų susipažinę su talidomido istorija. Pacientų atliktos patikros rezultatai bus pateikti kompetentingai nacionalinei institucijai, o galutinė medžiaga bus patvirtinta nacionaliniu lygiu.
6. Be to, prieš vaistiniam preparatui patenkant į rinką, registruotojas turi su kiekviena valstybe nare suderinti toliau išvardytus punktus:
  - tinkamiausias strategijas, skirtas stebėti vartojimui ne pagal indikaciją šalies teritorijoje;
  - išsamių duomenų rinkimą, siekiant nustatyti tikslinės populiacijos demografinius duomenis, vaisingų moterų skaičių ir indikaciją, kad būtų galima stebėti vartojimą ne pagal indikaciją (*off-label use*) šalies teritorijoje.
7. Registruotojas turi informuoti EMA ir atitinkamus valstybių pacientus bei nukentėjusiųjų atstovus apie siūlomą patekimo į rinką datą, prieš vaistiniam preparatui patenkant į rinką kiekvienoje valstybėje narėje.

### **Pagrindiniai elementai, kuriuos reikia įtraukti**

#### **Mokomosios informacijos sveikatos priežiūros specialistams rinkinys**

Mokomosios informacijos sveikatos priežiūros specialistams rinkinyje bus toliau nurodyti elementai.

#### **Mokomoji brošiūra sveikatos priežiūros specialistams**

- Talidomido istorija ir aprašymas
- Maksimali paskirto gydymo trukmė:
  - 4 savaitių gydymas vaisingoms moterims
  - 12 savaitių gydymas vyrams ir nevaisingoms moterims
- Teratogeniškumas ir būtinybė vengti poveikio vaisiui
- Rekomendacijos sveikatos priežiūros specialistams ir prižiūrintiesiems asmenims, kaip ruošti Thalidomide Lipomed lizdinę plokštelę arba dengtą tabletes
- Sveikatos priežiūros specialistų, kurie ketina išrašyti arba išduoti Thalidomide Lipomed, įsipareigojimai
  - Išsamiai informuoti ir konsultuoti pacientus
  - Užtikrinti, kad pacientai gebėtų laikytis saugaus Thalidomide Lipomed vartojimo reikalavimų
  - Pateikti pacientams atitinkamą mokomąją brošiūrą pacientams, paciento kortelę ir (arba) atitinkamą priemonę
- Saugumo patarimai, svarbūs visiems pacientams
  - Rekomendacijos, kaip išvengti gydymo klaidų (galimo supainiojimo su referenciniu vaistiniu preparatu)
  - Išeminės širdies ligos (įskaitant miokardo infarktą) aprašymas ir gydymas
  - Vietiniai šalies specifiniai susitarimai dėl talidomido išrašymo ir išdavimo
  - Pasibaigus gydymui, visas nesuvartotas dengtas tabletes reikia grąžinti vaistininkui
  - Gydymo Thalidomide Lipomed metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) ir bent 7 dienas po gydymo nutraukimo pacientas negali būti kraujo donoru
- NPP apibrėžimas ir pacientų suskirstymas pagal lytį ir vaisingumą
  - NPP įgyvendinimo algoritmas

- Vaisingos moters apibrėžimas ir veiksmai, kurių vaistinį preparatą išrašantis gydytojas turi imtis, jei abejoja
- Saugumo patarimai vaisingoms moterims
  - Būtinybė vengti poveikio vaisiui
  - NPP aprašymas
  - Būtinybė naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą (net jei moteriai yra amenoreja) ir veiksmingos kontracepcijos apibrėžimas
  - Jei yra būtinybė pakeisti kontracepcijos metodą arba kontracepcijos nebenaudoti, moteris turi pranešti:
    - Kontracepcijos metodą skiriančiam gydytojui, kad ji vartoja talidomidą
    - Talidomidą skiriančiam gydytojui, kad nustojo naudoti kontracepciją arba pakeitė kontracepcijos metodą.
  - Nėštumo nustatymo testų režimas
    - Patarimas dėl tinkamų testų
    - Prieš pradėdant gydymą
    - Gydomo metu, remiantis kontracepcijos metodu
    - Pasibaigus gydymui
  - Būtinybė nutraukti Thalidomide Lipomed vartojimą tuoj pat, kai tik įtariamas nėštumas
  - Būtinybė pranešti gydančiam gydytojui tuoj pat, kai tik įtariamas nėštumas
- Saugumo patarimai vyrams
  - Būtinybė vengti poveikio vaisiui
  - Būtinybė naudoti prezervatyvą, jei lytinių santykių partnerė yra nėščia arba vaisinga moteris, nenaudojanti veiksmingo kontracepcijos metodo (net jei vyrui buvo atlikta vazektomija)
    - Gydomo Thalidomide Lipomed metu
    - Bent 7 dienas po paskutinės dozės
  - Gydomo metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) ir bent 7 dienas po gydymo Thalidomide Lipomed nutraukimo pacientas negali būti sėklos arba spermos donoru
  - Jeigu jo partnerė pastoja, kol jis vartoja Thalidomide Lipomed arba praėjus nedaug laiko nuo Thalidomide Lipomed vartojimo nutraukimo, jis turi nedelsiant informuoti gydantį gydytoją
- Reikalavimai nėštumo atveju
  - Nurodymas nutraukti Thalidomide Lipomed vartojimą tuoj pat, kai tik įtariamas nėštumas, jei pacientė yra moteris
  - Būtinybė nusiųsti pacientę pas gydytoją, kuris specializuojasi arba dirba teratologijos ir diagnozavimo srityje, įvertinimui ir konsultacijai
  - Vietiniai kontaktiniai duomenys nedelsiamam pranešimui apie įtariamą nėštumą
- Vietiniai kontaktiniai duomenys pranešimui apie nepageidaujamas reakcijas

### **Mokomosios brošiūros pacientams**

Mokomosios brošiūros pacientams turi būti 3 tipų:

- Brošiūra vaisingoms moterims ir jų partneriams
- Brošiūra nevaisingoms moterims
- Brošiūra vyrams pacientams

Visose mokomosiose brošiūrose pacientams turi būti toliau išvardyti elementai.

- Talidomidą yra teratogeniškas
- Talidomidą gali sukelti išeminę širdies ligą (įskaitant miokardo infarktą)
- Paciento kortelės aprašymas ir jos svarba
- Thalidomide Lipomedvartojimo rekomendacijos pacientams, globėjams ir šeimos nariams
- Nacionaliniai ar kiti taikomi specifiniai susitarimai dėl išduodamo Thalidomide Lipomedišrašymo
- Pacientas negali duoti Thalidomide Lipomed kitam asmeniui



- Pacientui negalima būti kraujo donoru gydymo metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) ir bent 7 dienas po gydymo Thalidomide Lipomed nutraukimo
- Pacientas turi pranešti gydytojui apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius
- Pasibaigus gydymui, visas nesuvaldytas dengtas tabletes reikia grąžinti vaistininkui

Toliau nurodyta informacija taip pat turi būti pateikiama atitinkamoje brošiūroje.

#### Brošiūra vaisingoms moterims

- Būtinybė vengti poveikio vaisiui
- NPP apibrėžimas
- Veiksmingos kontracepcijos būtinybė ir veiksmingos kontracepcijos apibrėžimas
- Jei yra būtinybė pakeisti kontracepcijos metodą arba kontracepcijos nebenaudoti, moteris turi pranešti:
  - Kontracepcijos metodą skiriančiam gydytojui, kad ji vartoja talidomidą
  - Talidomidą skiriančiam gydytojui, kad nustojo naudoti kontracepciją arba pakeitė kontracepcijos metodą.
- Nėštumo nustatymo tyrimų režimas
  - Prieš pradėdant gydymą
  - Gydymo metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) mažiausiai kas 4 savaites, nebent jai yra patvirtinta kiaušintakių sterilizacija
  - Pasibaigus gydymui
- Būtinybė nedelsiant nutraukti Thalidomide Lipomed vartojimą, jei įtariama, kad moteris pastojo
- Būtinybė nedelsiant kreiptis gydytoją, jei įtariama, kad moteris pastojo

#### Brošiūra vyrams pacientams

- Būtinybė vengti poveikio vaisiui
- Būtinybė naudoti prezervatyvą, jei lytinių santykių partnerė yra nėščia arba vaisinga moteris, nenaudojanti veiksmingo kontracepcijos metodo (net jei vyrui buvo atlikta vazektomija)
  - Gydymo Thalidomide Lipomed metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus)
  - Bent 7 dienas po paskutinės dozės
- Jeigu partnerė pastojo, jis turi nedelsdamas informuoti gydantį gydytoją
- Gydymo metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) ir bent 7 dienas po gydymo Thalidomide Lipomed nutraukimo pacientui negalima būti sėklos arba spermos donoru

#### Paciento kortelė arba atitinkama priemonė

Paciento kortelėje turi būti šie elementai:

- patvirtinimas, kad pacientas buvo tinkamai pakonsultuotas
- vaisingumo būklės patvirtinimas
- žymimasis langelis (ar panašus žymėjimas), kuriame gydytojas pažymi patvirtinimą, jog pacientė naudoja veiksmingą kontracepciją (jei vaisinga moteris)
- nėštumo testų datos ir rezultatai

#### Informuotumo apie riziką formos

Informuotumo apie riziką formos turi būti 3 tipų:

- Vaisingoms moterims
- Nevaisingoms moterims
- Pacientams vyrams

Visose informuotumo apie riziką formose turi būti šie elementai:

- įspėjimas apie teratogeninį poveikį
- prieš pradėdant gydymą pacientai yra atitinkamai pakonsultuojami
- paciento patvirtinimas, kad suprato informaciją apie talidomido riziką ir NPP priemones
- konsultavimo data
- paciento duomenys, parašas ir data

- išrašančio gydytojo vardas ir pavardė, parašas ir data
- šio dokumento tikslas yra kaip nurodyta NPP: „Informuotumo apie riziką formos tikslas yra apsaugoti pacientus ir bet kokią galimą vaisių, užtikrinant, kad pacientai būtų visapusiškai informuoti ir suprastų teratogeninio poveikio ir kitų nepageidaujamų reakcijų riziką, susijusią su talidomido vartojimu. Tai nėra sutartis ir niekas neatleidžia nuo atsakomybės dėl saugaus vaistinio preparato vartojimo ir poveikio vaisiui prevencijos“

Informuotumo apie riziką formose vaisingoms moterims papildomai turi būti nurodyta:

- patvirtinimas, kad gydytojas informavo:

- kad būtina vengti poveikio vaisiui;
- kad jei moteris nėščia ar planuoja pastoti, jai negalima vartoti talidomido;
- kad ji supranta, jog turi vengti vartoti talidomidą nėštumo metu ir turi nepertraukiamai naudoti veiksmingus kontracepcijos metodus bent 4 savaites iki gydymo pradžios, visą gydymo laikotarpį ir bent 4 savaites po gydymo pabaigos;
- kad jeigu jai prireiks keisti arba nustoti naudoti kontracepcijos metodą, ji turi informuoti:
  - kontracepcijos metodą jai skiriantį gydytoją apie tai, kad ji vartoja Thalidomide Lipomed;
  - Thalidomide Lipomed jai skiriantį gydytoją apie tai, kad ji nustojo naudoti arba pakeitė kontracepcijos metodą;
- apie būtinybę atlikti nėštumo testus prieš gydymą, mažiausiai kas 4 savaites gydymo metu ir po gydymo;
- apie būtinybę nutraukti Thalidomide Lipomed vartojimą iš karto tik atsiradus įtarimui dėl nėštumo;
- apie būtinybę pranešti gydančiam gydytojui iš karto tik atsiradus įtarimui dėl nėštumo;
- kad neduotų savo vaistinio preparato kitiems žmonėms;
- kad gydymo metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) ir bent 7 dienas po gydymo Thalidomide Lipomed nutraukimo nebūtų kraujo donoru;
- kad pasibaigus gydymui, nesuvertotas dengtas tabletes grąžintų vaistininkui;

Informuotumo apie riziką formose nevaisingoms moterims papildomai turi būti nurodyta:

- patvirtinimas, kad gydytojas informavo:

- kad neduotų savo vaistinio preparato kitiems žmonėms;
- kad gydymo metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) ir bent 7 dienas po gydymo Thalidomide Lipomed nutraukimo nebūtų kraujo donoru;
- kad pasibaigus gydymui, nesuvertotas dengtas tabletes grąžintų vaistininkui.

Informuotumo apie riziką formose pacientams vyrams papildomai turi būti nurodyta:

- patvirtinimas, kad gydytojas informavo:

- kad būtina vengti poveikio vaisiui;
- kad talidomido patenka į vyrų spermą ir reikia naudoti prezervatyvus, jei partnerė yra nėščia arba vaisinga moteris ir nenaudoja veiksmingo kontracepcijos metodo (net jei vyrui atlikta vazektomija);
- kad jei jo partnerė pastoja, jis turi nedelsiant pranešti savo gydančiam gydytojui ir visada naudoti prezervatyvą;
- kad neduotų savo vaistinio preparato kitiems žmonėms;
- kad gydymo metu (įskaitant laikinus gydymo nutraukimus) ir bent 7 dienas po gydymo Thalidomide Lipomed nutraukimo pacientas negali būti kraujo arba sėklos donoru;
- kad pasibaigus gydymui, nesuvertotas dengtas tabletes grąžintų vaistininkui.

**III PRIEDAS**  
**ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS**

## **A. ŽENKLINIMAS**

## **INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS**

### **IŠORINĖ DĖŽUTĖ**

#### **1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS**

Thalidomide Lipomed 100 mg dengtos tabletės  
talidomidas

#### **2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI)**

Kiekvienoje dengtoje tabletėje yra 100 mg talidomido.

#### **3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS**

Vaisto sudėtyje yra laktozės monohidrato ir sacharozės; daugiau informacijos pateikta pakuotės lapelyje.

#### **4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE**

30 dengtų tablečių

#### **5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)**

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

Vartoti per burną.

#### **6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINIŲ PREPARATŲ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE**

Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

#### **7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)**

Vartokite, tik kaip nurodė gydytojas.

ĮSPĖJIMAS: talidomidas sukelia apsigimimus ir vaisiaus mirtį. Negalima vartoti nėštumo arba žindymo metu.

Turitei vykdyti nėštumo prevencijos programą.

#### **8. TINKAMUMO LAIKAS**

EXP

**9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

**10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)**

Nesuvartotą vaistą reikia grąžinti vaistininkui.

**11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Lipomed GmbH  
Hegenheimer Strasse 2  
79576 Weil am Rhein  
Vokietija

**12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)**

EU/1/22/1676/001

**13. SERIJOS NUMERIS**

Lot

**14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA**

**15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA**

**16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU**

Thalidomide Lipomed 100 mg

**17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS**

2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi.

**18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS**

PC  
SN  
NN

**MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ  
JUOSTELIŲ**

**LIZDINĖ PLOKŠTELĖ**

**1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS**

Thalidomide Lipomed 100 mg tabletės  
talidomidas

**2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS**

Lipomed

**3. TINKAMUMO LAIKAS**

EXP

**4. SERIJOS NUMERIS**

Lot

**5. KITA**

## **B. PAKUOTĖS LAPELIS**



## Pakuotės lapelis: informacija pacientui

### Thalidomide Lipomed 100 mg dengtos tabletės talidomidas

#### **ĮSPĖJIMAS**

**Talidomidas sukelia apsigimimus ir vaisiaus mirtį. Nevartokite talidomido, jeigu esate arba galite tapti nėščia. Turite laikytis gydytojo pateiktų nurodymų dėl kontracepcijos.**

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.
- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

#### **Apie ką rašoma šiame lapelyje?**

1. Kas yra Thalidomide Lipomed ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Thalidomide Lipomed
3. Kaip vartoti Thalidomide Lipomed
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Thalidomide Lipomed
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

#### **1. Kas yra Thalidomide Lipomed ir kam jis vartojamas**

##### **Kas yra Thalidomide Lipomed**

Thalidomide Lipomed sudėtyje yra veikliosios medžiagos, vadinamos talidomidu. Jis priklauso vaistų, veikiančių imuninės sistemos veiklą, grupei.

##### **Kam Thalidomide Lipomed vartojamas**

Thalidomide Lipomed vartojamas kartu su kitais dviem vaistais, vadinamais „melfalanu“ ir „prednizonu“, suaugusiesiems, sergantiems tam tikros rūšies vėžiu, vadinamu daugine mieloma, gydyti. Vaistas vartojamas žmonėms, kuriems liga neseniai diagnozuota, kuriems dar nėra skirtas kitas vaistas dauginei mielomai gydyti ir kurie yra 65 metų ir vyresni arba kurie yra jaunesni nei 65 metų ir kurių negalima gydyti didele chemoterapinių vaistinių preparatų doze, kurią organizmui gali būti labai sunku pakelti.

##### **Kas yra dauginė mieloma**

Dauginė mieloma yra tam tikros rūšies vėžys, kuris veikia tam tikros rūšies baltąsias kraujo ląsteles, vadinamas plazmos ląstelėmis. Šios ląstelės kaupiasi kaulų čiulpuose ir nekontroliuojamai dalijasi. Tai gali pažeisti kaulus ir inkstus. Paprastai dauginės mielomos negalima išgydyti. Tačiau gali labai sumažėti arba kuriam laikui išnykti ligos požymiai ir simptomai. Tai vadinama „remisija“.

##### **Kaip Thalidomide Lipomed veikia**

Thalidomide Lipomed veikia padėdamas organizmo imuninei sistemai ir tiesiogiai veikia vėžį. Vaistas veikia įvairiais būdais:

- stabdo vėžinių ląstelių susidarymą;
- stabdo kraujagyslių augimą auglyje;
- skatina dalį imuninės sistemos kovoti su vėžinėmis ląstelėmis.

## 2. Kas žinotina prieš vartojant Thalidomide Lipomed

Gydytojas Jums pateiks specialius nurodymus, ypač dėl talidomido poveikio vaisiui (nurodyta Thalidomide Lipomed nėštumo prevencijos programoje).

Gydytojas Jums duos mokomąją brošiūrą pacientams. Atidžiai ją perskaitykite ir vykdykite pateiktus nurodymus.

Jei nevisiškai supratote šiuos nurodymus, prieš pradėdami vartoti talidomidą paprašykite gydytojo, kad paaiškintų dar kartą. Daugiau informacijos pateikta skyriuose: „Išpėjimai ir atsargumo priemonės“ ir „Nėštumas ir žindymo laikotarpis“.

### Thalidomide Lipomed vartoti negalima

- jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, **nes Thalidomide Lipomed sukelia vaisiaus apsigimimus arba mirtį;**
- jeigu galite pastoti, nebent jei galite laikytis visų būtinų kontracepcijos priemonių vartojimo rekomendacijų, kad išvengtumėte nėštumo (žr. 2 skyriuje „Išpėjimai ir atsargumo priemonės“ bei „Nėštumas ir žindymo laikotarpis“);
- jeigu galite pastoti, Jūsų gydytojas kiekvieną kartą išrašydamas receptą registruos, kad buvo imtasi būtinų priemonių ir pateiks Jums šį patvirtinimą;
- jeigu yra alergija talidomidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje „Pakuotės turinys ir kita informacija“).

Jeigu Jums tinka bent viena iš minėtų būklių, Thalidomide Lipomed vartoti negalima. Jei nesate tikri, prieš pradėdami vartoti Thalidomide Lipomed pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

### Išpėjimai ir atsargumo priemonės

Jeigu yra kuri nors iš toliau išvardytų būklių, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

### Moterims, vartojančioms Thalidomide Lipomed

Prieš pradėdama gydymą, turite paklausti savo gydytojo, ar galite pastoti, net jeigu galvojate, kad tai nėra tikėtina. Net jei dėl vėžio gydymo nėra menstruacinio kraujavimo, Jūs galite pastoti.

Jeigu pastoti galite:

- Jūsų gydytojas turės patikrinti, ar atlikote nėštumo testą:
  - prieš gydymą;
  - kas 4 savaites gydymo metu;
  - po 4 savaitių pabaigus gydymą.
- naudoti vieną veiksmingą kontracepcijos metodą:
  - bent 4 savaites prieš pradėdant gydymą;
  - gydymo metu;
  - bent 4 savaites pabaigus gydymą.

Gydytojas patars, kokį kontracepcijos metodą naudoti.

Jeigu galite pastoti, Jūsų gydytojas kiekvieną kartą išrašydamas receptą įrašys, kad buvo imtasi būtinų pirmiau nurodytų priemonių.

### Vyrams, vartojantiems Thalidomide Lipomed

Thalidomide patenka į spermą, todėl nesaugių lytinių santykių turėti negalima, tai taikoma net ir tuo atveju, jei buvo atlikta vazektomija.

- Reikia vengti nėštumo ir vaisto poveikio nėštumo metu. Visada naudokite prezervatyvą:
  - gydymo metu;
  - bent 7 dienas pabaigus gydymą.
- Jums negalima būti spermos donoru:
  - gydymo metu;
  - bent 7 dienas pabaigus gydymą.

## Visiems pacientams

Prieš pradėdami vartoti Thalidomide Lipomed kreipkitės į gydytoją, jeigu Jums tinka bent vienas iš toliau pateiktų teiginių:

- nesuprantate gydytojo patarimo dėl kontracepcijos arba manote, kad nesugebėsite šio patarimo laikytis;
- Jums yra buvęs širdies priepuolis, praityje yra buvęs kraujo krešulys arba rūkote, yra aukštas kraujospūdis arba didelis cholesterolio kiekis. Gydomo Thalidomide Lipomed metu yra padidėjęs kraujo krešulių susidarymo venose ir arterijose pavojus (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“);
- anksčiau arba dabar pasireiškė neuropatija, t. y., pažeistų nervų sukeltas dilgčiojimas, sutrikusi koordinacija arba plaštakų ar pėdų skausmas (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“);
- anksčiau arba dabar pasireiškė sulėtėjęs širdies plakimas (tai gali būti bradikardijos simptomai);
- Jums yra padidėjęs kraujospūdis plaučių arterijose (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“);
- Jums pasireiškė baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimas (neutropenija), lydimas karščiavimo ir infekcijos;
- Jums pasireiškė trombocitų kiekio sumažėjimas; būsite labiau linkę kraujuoti, atsiras kraujosruvų;
- Jums buvo arba yra pažeistos kepenys (kepenų sutrikimas), įskaitant nenormalius kepenų tyrimų rezultatus;
- dabar arba anksčiau Jums pasireiškė sunkių odos reakcijų, vadinamų Stivenso-Džonsono (*Stevens-Johnson*) sindromu, toksine epidermio nekrolize arba *DRESS* sindromu (kuris dar vadinamas *DRESS* arba padidėjusio jautrumo vaistui sindromu). (Simptomai aprašyti 4 skyriuje „Galimas šalutinis poveikis“);
- vartojant Thalidomide Lipomed buvo pasireiškusi alerginė reakcija, pvz., išbėrimas, niežulys, patinimas, svaigulys ar pasunkėjęs kvėpavimas;
- buvo pasireiškęs mieguistumas;
- buvo pasireiškęs karščiavimas, šaltkrėtis ir stiprus drebulys, kurie gali komplikuotis sumažėjusiu kraujospūdžiu ir sumišimu (tai gali būti sunkių infekcijų simptomai);
- sergate arba kada nors sirgote virusine infekcija, ypač juostine pūsleline, hepatito B infekcija arba ŽIV. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją. Gydytas Thalidomide Lipomed gali sukelti pakartotinį viruso suaktyvėjimą virusą nešiojantiems pacientams, dėl to gali atsinaujinti infekcija. Gydytojas turi patikrinti, ar esate sirgę hepatito B infekcija;
- turite inkstų ar kepenų sutrikimų (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“).

Jūsų skydliaukės funkcija gali būti patikrinta prieš vartojant talidomido ir stebima gydymo metu.

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba slaugytoją, jeigu kuriuo nors metu gydymo laikotarpiu arba užbaigus gydymą pradėtumėte neryškiai matyti, prarastumėte regėjimą arba Jums pradėtų dvejetainis akyse, būtų sunku kalbėti, pasireikštų rankų ar kojų silpnumas, pasikeistų eisena arba sutriktų pusiausvyra, pasireikštų nuolatinis tirpulis, sumažėtų jautrumas arba kuri nors kūno dalis pasidarytų visiškai nejautri, prarastumėte atmintį arba pasireikštų sumišimo būseną. Visi šie reiškiniai gali būti sunkaus galvos smegenų sutrikimo, kuris gali būti mirtinas, vadinamo progresuojančia daugiažidinė leukoencefalopatija (PDL), simptomai. Jeigu jautėte šiuos simptomus dar prieš pradėdami gydymą Thalidomide Lipomed, pasakykite gydytojui, jeigu jie kaip nors pasikeistų.

Gydytojas gali patikrinti, ar visame Jūsų kūne, įskaitant kaulų čiulpus, yra didelis naviko kiekis. Tai gali sukelti būklę, kai navikai suyra ir organizme atsiranda neįprastai didelis cheminių medžiagų kiekis; tai gali sukelti inkstų nepakankamumą (ši būklė vadinama naviko irimo sindromu) (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“).

Gydytojas turi įvertinti, ar gydymo Thalidomide Lipomed metu Jums nepasireiškia kitos piktybinės kraujo ligos (vadinamos ūmine mieloidine leukemija ir mielodisplaziniais sindromais) (taip pat žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“).

Gydymo Thalidomide Lipomed metu ir paskui bent 7 dienas Jums negalima būti kraujo donoru.

Jeigu nesate tikri, ar kuris nors iš pirmiau pateiktų punktų Jums tinka, prieš pradėdami vartoti Thalidomide Lipomed pasitarkite su gydytoju.

### **Vaikams ir paaugliams**

Thalidomide Lipomed nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams iki 18 metų.

### **Kiti vaistai ir Thalidomide Lipomed**

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Šiems vaistams priskiriami ir vaistai, įsigyti be recepto, įskaitant vaistažolių preparatus.

Būtinai pasakykite gydytojui, jeigu vartojate bent vieną ir toliau nurodytų vaistų:

- vaistus, kurie sukelia mieguistumą, nes talidomidas gali sustiprinti jų poveikį. Tai gali būti migdomieji vaistai (pvz., anksiolitiniai arba migdomieji preparatai, vaistai nuo psichozės, H1 antihistamininiai preparatai, opiatų dariniai ir barbitūratai);
- vaistus, kurie lėtina širdies plakimą (skatina bradikardiją, pvz., anticholinesteraziniai preparatai ir beta adrenoblokatoriai);
- vaistus, kurie vartojami širdies sutrikimams ir komplikacijoms gydyti (pvz., digoksinas) arba kraujui skystinti (pvz., varfarinas);
- vaistus, kurie susiję su neuropatija, pvz., taip pat yra skirti vėžiui gydyti;
- vaistus, kurie vartojami kontracepcijai.

### **Thalidomide Lipomed vartojimas su maistu, gėrimais ir alkoholiu**

Vartodami Thalidomide Lipomed negerkite alkoholio, nes alkoholis gali sukelti mieguistumą, o Thalidomide Lipomed šį mieguistumą gali padidinti.

### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

#### Nėštumas

Talidomidas sukelia sunkius apsigimimus arba vaisiaus mirtį.

- Net viena nėščios moters išgerta dengta tabletė gali sukelti sunkių kūdikio apsigimimų.
- Šiems apsigimimams priklauso neišsivystę rankos ar kojos, deformuotos plaštakos ar pėdos, akių, ausų bei vidaus organų defektai.

Jeigu esate nėščia, Thalidomide Lipomed vartoti negalima. Be to, vartojant Thalidomide Lipomed negalima pastoti.

Jei galite pastoti, privalote naudoti vieną veiksmingą kontracepcijos metodą (žr. 2 skyrių „Kas žinotina prieš vartojant Thalidomide Lipomed“).

### **Privalote nutraukti gydymą ir iš karto informuoti gydytoją, jeigu:**

- Jums nebuvo arba manote, kad nebuvo mėnesinių, jų metu neįprastai kraujavote arba įtariate, kad esate nėščia;
  - Turėjote heteroseksualinių santykių, nenaudodama veiksmingo kontracepcijos metodo.
- Jeigu talidomido vartojimo metu pastojote, turite gydymą nutraukti ir nedelsdama informuoti gydytoją.

Thalidomide Lipomed vartojantiems vyrams, turintiems partnerę, galinčią pastoti, informacijos pateikta 2 skyriaus poskyryje „Kas žinotina prieš vartojant Thalidomide Lipomed“. Jeigu partnerė pastoja, kai Jūs vartojate talidomido, turite nedelsdami informuoti gydytoją.

#### Žindymo laikotarpis

Vartodama Thalidomide Lipomed, nežindykite, nes nežinoma, ar talidomidas išsiskiria į motinos pieną.

### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Jeigu atsiranda šalutinis poveikis, pvz., galvos svaigimas, nuovargis, mieguistumas ar daiktų matymas lyg per miglą, vairuoti ir valdyti mechanizmus ar stakles negalima.

### **Thalidomide Lipomed dengtų tablečių sudėtyje yra laktozės ir sacharozės**

Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

## **3. Kaip vartoti Thalidomide Lipomed**

Visada vartokite Thalidomide Lipomed tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### **Kiek vartoti**

Rekomenduojama paros dozė yra 200 mg (2 x 100 mg dengtos tabletės) 75 metų ir jaunesniems suaugusiesiems arba 100 mg (1 x 100 mg dengta tabletė) vyresniems nei 75 metų suaugusiesiems. Tačiau Jums tinkamą dozę parinks gydytojas ir stebės gydymo eigą, o prireikus keis dozę. Gydytojas pasakys Jums, kaip ir kiek laiko reikės vartoti Thalidomide Lipomed (žr. 2 skyriuje „Kas žinotina prieš vartojant Thalidomide Lipomed“).

Thalidomide Lipomed vartojamas kasdien gydymo ciklais (kiekvienas ciklas trunka 6 savaites), kartu su melfalanu ir prednizonu, kurie vartojami nuo 1 iki 4 kiekvieno 6 savaičių gydymo ciklo dienos.

### **Kaip vartoti**

- Dengtų tablečių negalima laužyti ar kramtyti. Jei perlaužtos Thalidomide Lipomed dengtos tabletės miltelių pateko ant odos, nedelsdami gerai nuplaukite odą vandeniu su muilu.
- Ruošdami lizdines plokšteles arba dengtas tabletes, sveikatos priežiūros specialistai, globėjai ir šeimos nariai turi mūvėti vienkartinės pirštines. Po to pirštines reikia nusiimti atsargiai, kad vaisto nepatektų ant odos, įdėti į hermetiškai uždaromą plastikinį polietileninį maišelį ir pašalinti laikantis vietinių reikalavimų. Tada reikia gerai nusiplauti rankas vandeniu su muilu. Moterims, kurios yra nėščios arba įtaria, kad galbūt yra nėščios, lizdinių plokštelių arba dengtų tablečių ruošti negalima.
- Vaistą vartokite per burną.
- Nurykite visą dengtą tabletę užgerdami pilna stikline vandens.
- Dengtų tablečių negalima smulkinti ar kramtyti.
- Visą dengtų tablečių paros dozę gerkite iš karto, prieš eidami miegoti. Taip vartojant, bus mažesnė tikimybė jaustis mieguistam kitu paros metu.

### **Ką daryti pavartojus per didelę Thalidomide Lipomed dozę?**

Pavartoję per didelę Thalidomide Lipomed dozę, tuoj pat pasakykite gydytojui arba vykite į ligoninę. Jei įmanoma, pasiimkite vaisto pakuotę ir šį pakuotės lapelį.

### **Pamiršus pavartoti Thalidomide Lipomed**

Jei pamiršote laiku išgerti Thalidomide Lipomed, ir

- praėjo mažiau kaip 12 valandų, išgerkite dengtas tabletes nedelsdami;
- praėjo daugiau kaip 12 valandų, pamirštų dengtų tablečių nebeverkite. Kitas dengtas tabletes gerkite įprastu laiku kitą dieną.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

## **4. Galimas šalutinis poveikis**

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Vartojant šį preparatą, galimas šalutinis poveikis nurodytas toliau.

**Jeigu pastebėjote bet kurį toliau nurodytą sunkų šalutinį poveikį, nedelsdami nutraukite Thalidomide Lipomed vartojimą ir kreipkitės į gydytoją, nes Jums gali reikėti skubios medicininės pagalbos.**

- Labai intensyvios ir sunkios odos reakcijos. Nepageidaujama odos reakcija gali pasireikšti kaip išbėrimas su pūslėmis arba be jų. Gali pasireikšti odos dirginimas, žaizdos arba patinimas burnoje, gerklėje, akyse, nosyje ir aplink lyties organus, edema ir karščiavimas bei į gripo panašūs simptomai. Šie simptomai gali būti retų ir sunkių odos reakcijų – Stivenso-Džonsono (Stevens-Johnson'o) sindromo, toksinės epidermio nekrolizės arba *DRESS* sindromo – požymiai.
- Alerginės reakcijos, pvz., lokalizuotas arba generalizuotas niežintis išbėrimas, angioneurozinė edema ir anafilaksinė reakcija (sunkių tipų alerginė reakcija, kuri gali pasireikšti kaip dilgėlinė, išbėrimas, akių, burnos arba veido patinimas, pasunkėjęs kvėpavimas arba niežėjimas).

**Jeigu pasireiškė bet kuris toliau nurodytas sunkus šalutinis poveikis, nedelsdami informuokite savo gydytoją:**

- **Rankų ir kojų nutirpimas, dilgčiojimas, koordinacijos sutrikimas arba skausmas**  
Tai gali nutikti dėl nervų pažaidos (vadinamos periferine neuropatija), kuri yra labai dažnas šalutinis poveikis. Jis gali tapti labai sunkus, skausmingas ir sukeliantis neįgalumą. Jeigu minėtų simptomų atsiranda, būtina tuoj pat kreiptis į gydytoją, kuris gali liepti sumažinti dozę arba nutraukti vaisto vartojimą. Šis šalutinis poveikis paprastai pasireiškia vaisto vartojant kelis mėnesius, bet gali atsirasti ir greičiau. Kartais jis gali pasireikšti ir nutraukus gydymą. Jis gali lėtai išnykti arba neišnykti.
- **Staigus krūtinės skausmas arba kvėpavimo pasunkėjimas**  
Taip gali nutikti dėl kraujo krešulių plaučių arterijose (vadinama plaučių embolija) atsiradimo, kuris yra dažnas šalutinis poveikis. Jis galimas gydymo metu arba baigus gydymą.
- **Kojų, ypač apatinės kojų dalies ar blauzdų skausmas ar tinimas**  
Taip gali nutikti dėl kraujo krešulių kojų venose (giliųjų venų trombozė) atsiradimo, kuris yra dažnas šalutinis poveikis. Tai gali pasireikšti gydymo metu arba baigus gydymą.
- **Krūtinės skausmas, plintantis į rankas, kaklą, žandikaulius, nugarą arba pilvą, prakaitavimo ir dusulio pojūtis, pykinimo pojūtis arba vėmimas.**  
Tai gali būti širdies priepuolio arba miokardo infarkto simptomai (kuriuos gali sukelti kraujo krešuliai širdies arterijose).
- **Trumpalaikis regėjimo ar kalbos sutrikimas.**  
Tai gali būti insulto simptomai (kuriuos gali sukelti krešulys smegenų arterijoje).
- **Karščiavimas, šaltkrėtis, skaudama gerklė, kosulys, burnos opos ar kiti infekcijos simptomai.**
- **Kraujavimas ar kraujosruvos nesant sužalojimo.**

**Kitas šalutinis poveikis:**

Svarbu paminėti, kad nedaugeliui pacientų, sergančių daugine mieloma, gali pasireikšti kitų tipų vėžys, ypač piktybinės kraujo ligos, ir gydant Thalidomide Lipomed, ši rizika gali padidėti, todėl skirdamas Jums Thalidomide Lipomed gydytojas turi atidžiai įvertinti gydymo naudą ir riziką.

**Labai dažnas** (gali pasireikšti dažniau kaip 1 iš 10 žmonių)

- Vidurių užkietėjimas.
- Svaigulys.
- Mieguistumas, nuovargis.
- Drebinimas (tremoras).
- Sumažėjęs ar nenormalus jautrumas (dizestezija).
- Kojų ir rankų patinimas.
- Mažas kraujo ląstelių kiekis. Tai gali reikšti, kad tapote ne toks atsparus infekcijai. Gydymo Thalidomide Lipomed metu gydytojas stebės Jūsų kraujo ląstelių kiekį.

**Dažnas** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 10 žmonių)

- Nevirškinimas, šleikštulys (pykinimas), vėmimas, burnos džiūvimas.
- Išbėrimas, odos sausmė.
- Baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimas (neutropenija), lydymas karščiavimo ir infekcijos.
- Raudonųjų ir baltųjų kraujo ląstelių bei trombocitų kiekio sumažėjimas vienu metu (pancitopenija).
- Silpnumas, alpimas ar svyravimas, energijos ar jėgų trūkumas, mažas kraujospūdis.
- Karščiavimas, bendrasis negalavimas.
- Traukuliai.
- Galvos sukimasis, dėl kurio sunku atsistoti ir normaliai vaikščioti.
- Neryškus matymas.
- Infekcinė krūtinės ląstos liga (plaučių uždegimas).
- Retas širdies susitraukimų dažnis, širdies nepakankamumas.
- Depresija, sumišimas, nuotaikos pokyčiai, nerimas.
- Pablogėjusi klausa arba kurtumas.
- Inkstų liga (inkstų nepakankamumas).

**Nedažnas** (gali pasireikšti rečiau kaip 1 iš 100 žmonių)

- Plaučių vamzdelių (bronchų) uždegimas ir patinimas (bronchitas).
- Skrandžio sienelės gleivinės ląstelių uždegimas.
- Storosios (gaubtinės) žarnos prakiurimas, galintis sukelti infekcinę ligą.
- Žarnų nepraeinamumas.
- Kraujospūdzio sumažėjimas stojantis, dėl kurio galima nualpti.
- Nereguliarus širdies ritmas (širdies blokada arba prieširdžių virpėjimas), silpnumo pojūtis arba alpimas.

**Dažnis nežinomas** (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis):

- Skydliaukės nepakankamumas (hipotirozė).
- Seksualinės funkcijos sutrikimas, pvz., impotencija.
- Sunki kraujo infekcija (sepsis), kurią lydi karščiavimas, šaltkrėtis ir stiprus drebulys bei galimas žemas kraujospūdis ir sumišimas (sepsinis šokas).
- Naviko irimo sindromas – metabolizmo komplikacijos, kurios gali pasireikšti vėžio gydymo metu ir kartais net netaikant gydymo. Šias komplikacijas sukelia žūstančių vėžio ląstelių skilimo produktai. Gali pasireikšti šios komplikacijos: kraujo cheminės sudėties pokyčiai, kalio, fosforo, šlapimo rūgšties kiekio padidėjimas ir kalcio kiekio sumažėjimas, sukeliantys inkstų veiklos, širdies plakimo pokyčių, traukulius ir kartais mirtį.
- Kepenų pažeidimas (kepenų sutrikimas), įskaitant nenormalius kepenų tyrimų rezultatus.
- Kraujavimas iš skrandžio ar žarnyno (skrandžio ir žarnyno kraujavimas).
- Parkinsono ligos simptomų (pvz., drebulio, depresijos arba konfūzijos) pasunkėjimas.
- Skausmas viršutinėje pilvo dalyje ir (arba) nugaroje, kuris gali būti sunkus ir kuris išlieka kelias dienas; jį gali lydėti pykinimas, vėmimas, karščiavimas ir padažnėjęs pulsas – šiuos simptomus gali sukelti kasos uždegimas (pankreatitas).
- Padidėjęs kraujospūdis plaučius krauju aprūpinančiose kraujagyslėse, tai gali sukelti dusulį, nuovargį, galvos svaigimą, skausmą krūtinėje, padažnėjusį širdies plakimą arba patinimą kojose ar kirkšnyse (plaučių hipertenziją).
- Virusinės infekcijos, įskaitant juostinę pūslelinę (virusinę ligą, kuri sukelia skausmingą odos išbėrimą su pūslėmis), ir hepatito B infekcijos atsinaujinimas (galintis sukelti odos ir akių pageltimą, tamsiai rudą šlapimo spalvą, dešinės pusės pilvo skausmą, karščiavimą ir pykinimo pojūtį ar šleikštulį).
- Galvos smegenų sutrikimas, pasireiškiantis tokiais simptomais kaip pasikeitęs regėjimas, galvos skausmas, traukulių priepuoliai ir sumišimas, su padidėjusiu kraujospūdžiu arba be jo (užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas – UGES).
- Odos pažeidimas, kurį sukelia smulkiųjų kraujagyslių uždegimas, kartu su sąnarių skausmu ir karščiavimu (leukocitoklastinis vaskulitas).

### **Pranešimas apie šalutinį poveikį**

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi [V priede](#) nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

## **5. Kaip laikyti Thalidomide Lipomed**

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pastebėjus bet kokią pažeidimą ar gedimo požymius, šio vaisto vartoti negalima.

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Baigus gydymą, visas nesuvartotas dengtas tabletes būtina grąžinti vaistininkui arba gydytojui. Šios priemonės padės išvengti netinkamo naudojimo.

## **6. Pakuotės turinys ir kita informacija**

### **Thalidomide Lipomed sudėtis**

- Veiklioji medžiaga yra talidomidas. Kiekvienoje dengtoje tabletėje yra 100 mg talidomido.
- Pagalbinės medžiagos yra laktozė monohidratas (žr. 2 skyrių „Kas žinotina prieš vartojant Thalidomide Lipomed“), kopovidonas (E 1208), talkas (E 553b), magnio stearatas (E 470b), mikrokristalinė celiuliozė (E 460(i)), sunkusis kaolinas (E 559), sacharozė (žr. 2 skyrių „Kas žinotina prieš vartojant Thalidomide Lipomed“), gumiarabikas (E 414), kalcio karbonatas (E 170), titano dioksidas (E 171).

### **Thalidomide Lipomed išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Thalidomide Lipomed 100 mg dengtos tabletės yra baltos cukrumi dengtos tabletės. Dengtos tabletės tiekiamos dėžutėje, kurioje yra 30 dengtų tablečių (3 lizdinės plokštelės, kurių kiekvienoje yra 10 dengtų tablečių).

### **Registruotojas ir gamintojas**

Lipomed GmbH  
Hegenheimer Strasse 2  
79576 Weil am Rhein  
Vokietija

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas**

### **Kiti informacijos šaltiniai**

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje <http://www.ema.europa.eu/>.