

EMA/473109/2019
EMEA/H/C/000236

Ferriprox (*deferipron*)

Ħarsa ġenerali lejn Ferriprox u għalfejn huwa awtorizzat fl-UE

X'inhu Ferriprox u għal xiex jintuża?

Ferriprox huwa 'kelatur tal-ħadid' (sustanza li teħel mal-ħadid) li jintuża fil-kura ta' eċċess ta' ħadid (eċċess ta' ħadid fil-ġisem) f'pazjenti b'talassemija maġguri. Din hija marda ereditarja li fiha l-pazjenti ma jkunux kapaċi jiproduċu biżżejjed emoglobin, il-proteina li tinsab fiċ-ċelloli ħomor tad-demm li ġgħor l-ossiġġu mal-ġisem.

Ferriprox jintuża:

- waħdu, meta kura bil-kelatur tal-ħadid standard ma tkunx tista' tintuża jew ma tkunx taħdem kif suppost;
- f'kombinazzjoni ma' kelatur tal-ħadid ieħor, meta l-kura b'kelatur tal-ħadid waħdu ma taħdimx jew meta l-livelli tal-ħadid jeħtieg li jiġu kkoreġuti malajr jew b'mod intensiv biex jipprevjenu jew jikkuraw kundizzjonijiet ta' theddida għall-ħajja (li prinċipalment jaffettwaw il-qalb).

Ferriprox fih is-sustanza attiva deferipron.

Kif jintuża Ferriprox?

Ferriprox jista' jinkiseb biss b'rċetta ta' tabib u l-kura għandha tinbeda u titkompla minn tabib li jkollu esperjenza fil-kura tat-talassemija. Jiġi bħala pilloli (500 u 1,000 mg) u bħala soluzzjoni orali (100 mg/ml).

Id-doža rakkodata ta' Ferriprox hija 25 mg għal kull kilogramm tal-piż tal-ġisem tliet darbiet kuljum. It-tabib jista' jaġġusta d-doža ta' Ferriprox skont kemm qed jiġi kkontrollati tajjeb il-livelli ta' ħadid tal-pazjent, li għandhom jitkejlu kull xagħrejn sa tliet xħur b'testijiet tad-demm. Id-doža totali għall-jum kollu għandha tkun inqas minn 100 mg għal kull kilogramma tal-piż tal-ġisem. It-tabib jista' jwaqqaf il-kura jekk il-livelli tal-ħadid jitbaxxew iżżejjed.

Għal iktar informazzjoni dwar l-użu ta' Ferriprox, ara l-fuljett ta' tagħrif jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

Official address Domenico Scarlattilaan 6 • 1083 HS Amsterdam • The Netherlands

Address for visits and deliveries Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question Go to www.ema.europa.eu/contact **Telephone** +31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union



Kif jaħdem Ferriprox?

Pazjenti li jbatu mit-talassemija maġġuri jeħtieġu trasfużjonijiet tad-demm frekwenti. Ċelloli ħomor trasfuži jdaħħlu l-ħadid fil-ġisem. Bi trasfużjonijiet ripetuti, il-ħadid jakkumula peress li l-ġisem m'għandux mod naturali kif ineħħi l-eċċess ta' ħadid. Maż-żmien, l-eċċess ta' ħadid jista' jagħmel ħsara lill-organi importanti bħall-qalb u l-fwied. Is-sustanza attiva f'Ferriprox, id-deferipron, hija kelatur tal-ħadid. Din teħel mal-ħadid fil-ġisem biex tifforma kompost li jista' jitneħha mill-ġisem, prinċipalment fl-awrina, u xi ftit ukoll mill-feċi. It-tnejħija tal-ħadid b'dan il-mod tgħin biex tikkoregi t-tagħbija żejda ta' ħadid u tipprevjeni ħsara minn eċċess ta' ħadid.

X'inħuma I-benefiċċji ta' Ferriprox li ħarġu mill-istudji?

Ferriprox ġie studjat f'247 pazjent li jbatu minn talassemija maġġuri, li għandhom aktar minn sitt snin. Il-kejl ewljeni tal-effikāċja kien il-bidla fil-livelli tal-ferritina fid-demm. Il-livelli ta' ferritina fid-demm jindika kemm qed jinħażen ħadid fil-ġisem.

L-istudju ewljeni li kien jinvolvi 71 pazjent qabbel Ferriprox ma' deferossamina, kelatur tal-ħadid ieħor, fuq medda ta' sentejn. Id-deferossamina ngħata b'injezzjoni taħt il-ġilda matul il-lejl. Il-livelli medji ta' ferritina fid-demm kienu simili fiz-żewġ gruppi ta' kura. Madankollu, il-konċentrazzjoni medja ta' ħadid fil-fwied tal-pazjenti kkurati b'Ferriprox dehret tiżdied aktar milli fil-pazjenti kkurati b'deferossamina.

Fi studju ieħor li kien jinvolvi 60 pazjent ikkurati fuq medda ta' 12-il xahar, kombinazzjoni ta' Ferriprox u deferossamina (Ferriprox għal ħamest ijiem flimkien mad-deferossamina għal jumejn kull ġimgħa) tqabbel ma' deferossamina waħdu. Il-livelli ta' ferritina fid-demm tnaqqsu bl-istess mod f'pazjenti li ġew ikkurati bil-kombinazzjoni bħal b'deferossamina waħdu. In-numru ta' pazjenti fl-istudju kien baxx wisq biex juri jekk tali skeda kinitx effettiva daqs deferossamina waħdu.

Barra minn hekk, l-istudji ppubblikati dwar Ferriprox flimkien mad-deferossamina rrappurtaw tnaqqis akbar fil-livelli ta' ferritina fid-demm meta ż-żewġ mediċini ntużaw bħala kombinazzjoni meta mqabel mal-użu taż-żewġ mediċini meħudin waħidhom. Fi studju ppubblikat, Ferriprox flimkien mad-deferossamina wassal ukoll għal tnaqqis akbar fil-ħadid fil-qalb meta mqabel ma' pazjenti li ħadu d-deferossamina waħdu.

X'inħuma r-riskji assoċċjati ma' Ferriprox?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Ferriprox (li deħru f'aktar minn pazjent 1 minn 10) kienu awrina ħamranija/kannella (sinjal li l-ħadid ikun qiegħed jitneħha mill-awrina), nawża (tħossok ma tiflaħx), uġiġi addominali (uġiġi ta' stonku) u remettar. Effetti sekondarji inqas komuni iżda iktar serji huma agranuloċitoži (livelli baxxi ħafna ta' granuloċiti, tip ta' ċelloli bojod tad-demm) u newtropenija (livelli baxxi ta' newtropili, tip ta' ċelloli bojod tad-demm li jiġi iċċekk jidher). Ferriprox ma għandux jintuża f'nies li kellhom newtropenija ripetutament jew agranuloċitoži. Ferriprox m'għandu lanqas ukoll jintuża flimkien ma' mediċini li jistgħu jikkawżaw newtropenija jew agranuloċitoži. Meta jieħu Ferriprox, l-ġħadd ta' newtropili tal-pazjent għandu jiġi cċekk jidher regolarment (kull ġimgħa fl-ewwel sena mbagħad anqas spiss). Jekk il-pazjent jieħu infel-żebbu, il-kura b'Ferriprox għandha tiġi temporanjament imwaqqfa u l-ġħadd ta' newtropili cċekk jidher spiss. Il-pazjenti għandhom jgħidu lit-tabib minnufih jekk ikollhom sintomi ta' infel-żebbu, bħad-den, uġiġi fil-griżmejn u sintomi bħall-influwenza.

Ferriprox m'għandux jintuża f'nisa li jkunu tqal jew qed ireddgħu. Għal-lista shiħha ta' restrizzjonijiet u effetti sekondarji ta' Ferriprox, ara l-fuljett ta' tagħrif.

Għaliex Ferriprox ġie awtorizzat fl-UE?

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddeċidiet li l-benefiċċji ta' Ferriprox huma akbar mir-riskji tiegħu u li jista' jiġi awtorizzat għall-użu fl-UE.

X'miżuri qed jittieħdu biex jiżguraw l-użu sigur u effettiv ta' Ferriprox?

Il-kumpanija li tqiegħed Ferriprox fis-suq għandha tiprovd kard ta' tfakkira għall-pazjenti jew għal-dawk li jindukrawhom dwar l-importanza ta' testijiet regolari għall-ġħadd ta' newtrophili, il-ħtieġa li wieħed joqgħod attent għal-sintomi ta' infekzjoni u għan-nisa biex jevitaw li johorġu tqal waqt il-kura b'Ferriprox.

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u fil-fuljett ta' tagħrif ġew inkluži wkoll ir-rakkomandazzjonijiet u l-prekawzjonijiet li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mill-pazjenti għall-użu sigur u effettiv ta' Ferriprox.

Bħal fil-każ tal-mediċini kollha, id-data dwar l-użu ta' Ferriprox hija ssorveljata kontinwament. L-effetti sekondarji rrappurtati b'Ferriprox huma evalwati bir-reqqa u kull azzjoni meħtieġa hi meħuda biex tiproteġi lill-pazjenti.

Aktar informazzjoni dwar Ferriprox

Ferriprox ingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha fil-25 ta' Awwissu 1999.

Aktar informazzjoni dwar Ferriprox tinstab fis-sit web tal-Αġenzija: ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ferriprox.

Din il-ħarsa ġenerali ġiet aġġornata l-aħħar f'09-2019.