

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT

1. ISEM IL-PRODOTT MEDICINALI

Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
Corbilta 75 mg/18.75 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
Corbilta 125 mg/31.25 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
Corbilta 150 mg/37.5 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
Corbilta 175 mg/43.75 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg pilloli miksija b'rita

2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

50 mg/12.5 mg/200 mg

Kull pillola fiha 50 mg ta' levodopa, 12.5 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola fiha 1.2 mg ta' sucrose

75 mg/18.75 mg/200 mg

Kull pillola fiha 75 mg ta' levodopa, 18.75 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola fiha 1.4 mg ta' sucrose.

100 mg/25 mg/200 mg

Kull pillola fiha 100 mg ta' levodopa, 25 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola fiha 1.6 mg ta' sucrose.

125 mg/31.25 mg/200 mg

Kull pillola fiha 125 mg ta' levodopa, 31.25 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola fiha 1.6 mg ta' sucrose.

150 mg/37.5 mg/200 mg

Kull pillola fiha 150 mg ta' levodopa, 37.5 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

Eċċipjenti b'effett magħruf:

Kull pillola fiha 1.9 mg ta' sucrose u 2.6 mg sodium bhala kostitwent tal-eċċipjenti.

175 mg/43.75 mg/200 mg

Kull pillola fiha 175 mg ta' levodopa, 43.75 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola fiha 1.89 mg ta' sucrose.

200 mg/50 mg/200 mg

Kull pillola fiha 200 mg ta' levodopa, 50 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

Eċċipjent b'effett magħruf:

Kull pillola fiha 2.3 mg ta' sucrose.

Għal-lista shiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAČEWTIKA

Pillola miksija b'rita (pillola)

50 mg/12.5 mg/200 mg

Pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn ahmar fil-kannella jew fil-griz, tondi, bbuzzati, immarkati b'"LCE 50" fuq naħa waħda.

75 mg/18.75 mg/200 mg

Pilloli miskija b'rita, ta' lewn ahmar fil-kannella ċar, ovali, immarkati b'"LCE 75" fuq naħa waħda.

100 mg/25 mg/200 mg

Pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn ahmar fil-kannella jew fil-griz, ovali, immarkati b'"LCE 100" fuq naħa waħda.

125 mg/31.25 mg/200 mg

Pilloli miskija b'rita, ta' lewn ahmar fil-kannella ċar, ovali, immarkati b'"LCE 125" fuq naħa waħda.

150 mg/37.5 mg/200 mg

Pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn ahmar fil-kannella jew fil-griz, b'forma ta' elissi mtawwal, immarkati b'"LCE 150" fuq naħa waħda.

175 mg/43.75 mg/200 mg

Pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn ahmar fil-kannella ċar, ovali, immarkati b'"LCE 175" fuq naħa waħda.

200 mg/50 mg/200 mg

Pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn ahmar fil-kannella skur, ovali, immarkati b'"LCE 200" fuq naħa waħda.

4. TAGħrif KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Corbila huwa indikat għall-kura ta' pazjenti adulti bil-marda ta' Parkinson u b'oxxillazzjonijiet motorji tat-tmiem tad-doża li mhumiex stabilizzati fuq kura b'levodopa/inibitħur ta' dopa decarboxylase (DDC).

4.2 Pożoġi u metodu ta' kif għandu jingħata

Pożoġi

Id-doża ottimali ta' kuljum għandha tiġi stmata permezz ta' titrazzjoni b'kawtela ta' levodopa f'kull pazjent. Id-doża ta' kuljum għandha preferibilment tiġi ottimizzata bl-użu ta' waħda mis-seba' qawwiet ta' pilloli disponibbli (50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 150 mg/37.5 mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg jew 200 mg/50 mg/200 mg levodopa/carbidopa/entacapone).

Il-pazjenti għandhom jiġu mgħallma biex jieħdu biss pillola waħda ta' Corbila kull għotja ta' doża. Pazjenti li qed jirċievu inqas minn 70–100 mg carbidopa kuljum huma aktar probabbli li jkollhom tqallih u rimettar. Filwaqt li l-esperjenza b'doża totali ta' kuljum ta' aktar minn 200 mg carbidopa hija limitata, id-doża massima ta' entacapone rrakkomandata kuljum hija ta' 2 000 mg u għalhekk id-doża massima hija ta' 10 pilloli kuljum għall-qawwiet ta' Corbila ta' 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg u 150 mg/37.5 mg/200 mg. Ghaxar pilloli ta' Corbila 150 mg/37.5 mg/200 mg huma ekwivalenti għal-

375 mg ta' carbidopa kuljum. Skont din id-doža ta' kuljum ta' carbidopa, id-doža massima irrakkomandata kuljum ta' Corbilta 175 mg/43.75 mg/200 mg hija 8 pilloli kuljum u ta' Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg hija 7 pilloli kuljum.

Normalment Corbilta għandu jintuża f'pazjenti li bħalissa qed jiġu kkurati b'doži korrispondenti ta' levodopa/inibitħur ta' DDC u entacapone li jinhelsu b'mod standard.

Kif taqleb pazjenti li qed jieħdu preparazzjonijiet ta' levodopa/inibitħur ta' DDC (carbidopa jew benserazide) u pilloli entacapone għal Corbilta

a. Pazjenti li bħalissa qed jiġu kkurati b'entacapone u b'levodopa/carbidopa li jinhelsu b'mod standard f'doži ugħali għall-qawwiet ta' pilloli Corbilta jistgħu jinqlu direttament għall-pilloli Corbilta korrispondenti. Per eżempju, pazjent li qed jieħu pillola waħda ta' 50 mg/12.5 mg ta' levodopa/carbidopa ma' pillola waħda ta' entacapone 200 mg erba' darbiet kuljum jista' jieħu pillola waħda ta' 50 mg/12.5 mg/200 mg Corbilta erba' darbiet kuljum flok id-doži tas-soltu ta' levodopa/carbidopa u entacapone.

b. Meta tinbeda terapija b'Corbilta għall-pazjenti li bħalissa qed jiġu kkurati b'entacapone u b'levodopa/carbidopa f'doži mhux ugħali għall-pilloli Corbilta (50 mg/12.5 mg/200 mg, jew 75 mg/18.75 mg/200 mg jew 100 mg/25 mg/200 mg jew 125 mg/31.25 mg/200 mg jew 150 mg/37.5 mg/200 mg jew 175 mg/43.75 mg/200 mg jew 200 mg/50 mg/200 mg), l-iddożar ta' Corbilta għandu jiġi titrat b'kawtela għal respons kliniku ottimali. Corbilta għandu jiġi aġġustat biex jikkorrispondi b'mod viċin kemm jista' jkun għad-doža totali ta' kuljum ta' levodopa li tkun qed tintuża f'dak il-ħin.

c. Meta jinbeda Corbilta f'pazjenti li f'dak il-ħin ikunu qed jiġu kkurati b'entacapone u levodopa/benserazide f'preparazzjoni li tinheles b'mod standard, l-iddożar ta' levodopa/benserazide għandu jitwaqqaf il-lejl ta' qabel u Corbilta għandu jinbeda l-ghada filgħodu. Id-doža tal-bidu ta' Corbilta għandha tipprovdi l-istess ammont ta' levodopa jew kemmnejn (5–10%) aktar.

Kif taqleb pazjenti li bħalissa mhux qed jiġu kkurati b'entacapone għal Corbilta

Il-bidu ta' Corbilta jista' jiġi kkunsidrat f'doži korrispondenti għall-kura li tkun għaddejja f'xi pazjenti bil-marda ta' Parkinson u b'oxxillazzjonijiet motorji tat-tmiem tad-doža, li mhux stabbilizzati fuq il-kura li jkunu qed jieħdu ta' levodopa/inibitħur ta' DDC li jinhelsu b'mod standard. Iżda, tibdil dirett minn levodopa/inibitħur ta' DDC għal Corbilta mhux irrakkomandat għal pazjenti li għandhom diskinesja jew għal dawk li d-doža ta' kuljum ta' levodopa hija aktar minn 800 mg. F'dawn il-pazjenti, ta' min jirrikk manda li kura b'entacapone tigi ntrodotta bħala kura separata (pilloli entacapone) u li d-doža ta' levodopa tigi aġġustata jekk hemm bżonn, qabel jinqlu għal Corbilta.

Entacapone issaħħa l-effetti ta' levodopa. Għalhekk, speċjalment f'pazjenti b'diskinesja, għandu mnejn ikun hemm bżonn li d-doža ta' levodopa tigi mnaqqsa b'10–30% fl-ewwel fit itiem sa ġimħaq wara li tinbeda l-kura b'Corbilta. Id-doža ta' kuljum ta' levodopa tista' tigi mnaqqsa billi jiġi mtawwa l-intervalli ta' doža u/jew billi jiġi mnaqqas l-ammont ta' levodopa ta' kull doža, skont il-kondizzjoni klinika tal-pazjent.

Aġġustament fid-doža waqt il-kors ta' kura

Meta jkun hemm bżonn ta' aktar levodopa, għandhom jiġi kķunsidrati żjeda fil-frekwenza ta' doži u/jew l-użu ta' qawwa alternattiva ta' Corbilta, fir-rakkomandazzjonijiet tad-doža.

Meta jkun hemm bżonn ta' inqas levodopa, id-doža totali ta' kuljum ta' Corbilta għandha titnaqqas billi titnaqqas il-frekwenza tal-ġħotja permezz ta' ħin itwal bejn id-doži, jew billi titnaqqas il-qawwa ta' Corbilta f'għotja.

Jekk jintużaw prodotti oħra li fihom levodopa fl-istess ħin ma' pillola Corbilta, ir-rakkomandazzjonijiet ta' doža massima għandhom jiġi segwiti.

Twaqqifta' terapija b'Corbila: Jekk kura b'Corbila (levodopa/carbipoda/entacapone) titwaqqaf u l-pazjent jiġi trasferit għal terapija b'levodopa/inibitur ta' DDC mingħajr entacapone, huwa neċċessarju li d-dożagg ta' kull kura oħra kontra l-marda ta' Parkinson jiġi aġġustat, specjalment levodopa, sabiex jintlaħaq livell ta' kontroll suffiċjenti tas-sintomi tal-marda ta' Parkinson.

Popolazzjoni pedjatrika: Is-sigurtà u l-effiċċiatura ta' Corbila fit-tfal b'età inqas minn 18 il sena ma ġewx determinati s'issa. M'hemm l-ebda *data* disponibbi.

Anzjani: Ma hemm bżonn l-ebda aġġustament fid-doża ta' Corbila ghall-anzjani.

Indeboliment epatiku: Huwa rrakkomandat li Corbila għandu jingħata b'kawtela lill-pazjenti b'ineboliment epatiku hafif għal moderat. Jista' jkun hemm bżonn ta' tnaqqis fid-doża (ara sezzjoni 5.2). Ghall-indeboliment epatiku sever ara sezzjoni 4.3.

Indeboliment renali: Indeboliment renali ma jaffettwax il-farmakokinetika ta' entacapone. Ma ġew irrapprtati l-ebda studji partikolari dwar il-farmakokinetika ta' levodopa u carbipoda f'pazjenti b'insuffiċjenza renali, għalhekk terapija b'Corbila għandha tingħata b'kawtela lill-pazjenti b'insuffiċjenza renali severa inkluż dawk li qed jirċievu terapija b'dijalisi (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta' kif għandu jingħata

Kull pillola għandha tittieħed mill-ħalq mal-ikel jew mingħajr ikel (ara sezzjoni 5.2). Pillola waħda fiha doża ta' kura waħda u l-pillola tista' tingħata biss bhala pillola shiħa.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

- Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-sezzjoni 6.1.
- Indeboliment epatiku sever.
- Glawkom ta' angolu dejjaq.
- Fejokromocitoma.
- Għoti fl-istess hin ta' Corbila ma' inibituri mhux selettivi ta' monoamine oxidase (MAO-A u MAO-B) (eż. phenelzine, tranylcypromine).
- Għoti flimkien ma' inibituri selettivi ta' MAO-A u inibituri selettivi ta' MAO-B (ara sezzjoni 4.5).
- Okkorrenza minn qabel tas-Sindrome Newroletiku Malinn (NMS - *Neuroleptic Malignant Syndrome*) u/jew rabdomijolisi mhux trawmatika.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet ghall-użu

- Corbila mhux irakkomandat ghall-kura ta' reazzjonijiet ekstrapiramidali indotti minn prodotti medicinali.
- Terapija b'Corbila għandha tingħata b'attenzjoni lill-pazjenti b'mard iskemiku tal-qalb, mard kardjovaskulari jew pulmonari sever, ażżma fil-bronki, mard renali jew endokrali, passat ta' mard ta' ulċera peptika jew passat ta' konvulżjonijiet.
- F'pazjenti b'passat ta' infart mijokardijaku li għandhom arritmija atrijali nodali jew ventrikolari residwali; għandu jkollhom il-funzjoni kardijaka sorveljata b'attenzjoni partikolari waqt il-perjodu ta' aġġustamenti tal-bidu fid-doża.
- Il-pazjenti kollha kkurati b'Corbila għandhom jiġu sorveljati b'attenzjoni għal žvilupp ta' bidliet mentali, depressjoni b'tendenzi ta' suwiċidju, u mgħiba antisoċjali serja oħra. Pazjenti b'passat jew bi preżenza ta' psikosi għandhom jiġu kkurati b'kawtela.
- L-ghotja fl-istess waqt ta' antipsikotici bi proprijetajiet li jimblukkaw ir-riċetturi ta' dopamine, partikolarmen antagonisti tar-riċetturi D₂, għandha ssir b'kawtela, u l-pazjent għandu jiġi sorveljat b'attenzjoni għat-telf tal-effett kontra l-marda ta' Parkinson jew irkadar tas-sintomi tal-marda ta' Parkinson.
- Pazjenti bi glawkom ta' angolu wiesa' kronika jistgħu jiġi kkurati b'Corbila b'kawtela, dejjem jekk il-pressjoni intra-okulari tkun ikkontrollata sew u li l-pazjent ikun sorveljat b'kawtela għal bidliet fil-pressjoni intra-okulari.

- Corbila jista' jinduci pressjoni ortostatika baxxa. Ghalhekk Corbila għandu jingħata b'kawtela lill-pazjenti li qed jieħdu prodotti medicinali oħra li jistgħu jikkawżaw pressjoni ortostatika baxxa.
- Entacapone flimkien ma' levodopa kien assocjat ma' ngħas u episodji ta' attakki ta' ngħas f'daqqa f'pazjenti bil-marda ta' Parkinson u għalhekk għandu jkun hemm kawtela waqt is-sewqan jew thaddim ta' magni (ara sezzjoni 4.7).
- Fi studji kliniči, reazzjonijiet dopaminergici avversi, eż. diskinesja, kien aktar komuni f'pazjenti li rċeew entacapone u agonisti ta' dopamine (bħal bromocriptine), selegiline jew amantadine meta mqabbel ma' dawk li rċeew plaquebo ma' din it-taħlit. Jista jkun hemm bżonn li d-doża ta' prodotti medicinali oħrajn kontra l-marda ta' Parkinson tīġi aġġustata meta jkun hemm sostituzzjoni ta' kura b'Corbila għall-pazjent li bħalissa mhux qed jigi kkurat b'entacapone.
- Rabdomijolisi sekondarja għal diskinesja severa jew sindrome newroletti malinn (NMS) kienet osservata b'mod rari f'pazjenti bil-marda ta' Parkinson. Għalhekk, kull tnaqqis f'daqqa fid-doża jew it-twaqqif ta' levodopa għandu jiġi osservat b'attenzjoni, speċjalment f'pazjenti li qed jirċievu wkoll newroletti. NMS, inkluż rabdomijolisi u ipertermja, hija kkarratterizzata minn sintomi motorji (riġidità, mijoklonus, tregħid), tibdil fl-istat mentali (eż., agitazzjoni, konfużjoni, koma), ipertermja, disfunzjoni awtonomika (takikardija, pressjoni tad-demm mhux stabbli) u creatine phosphokinase fis-serum għoli. F'każiġiet individwali, jistgħu jkunu evidenti biss xi wħud minn dawn is-sintomi u/jew sejbiet. Id-dijanjosi bikrija hija importanti għall-immaniġġjar xieraq ta' NMS. Sindrome li jixbah is-sindrome newroletti malinn inkluż riġidità fil-muskoli, temperatura tal-ġisem elevata, bidliet mentali u żjeda tal-creatine phosphokinase fis-serum kien irrapportat mal-waqfien f'daqqa ta' sustanzi kontra l-marda ta' Parkinson. La NMS u lanqas rabdomijolisi ma kien rrapprtati f'assocjazzjoni ma' kura b'entacapone minn provi kkontrollati fejn entacapone twaqqaf f'daqqa. Minn wara l-introduzzjoni ta' entacapone fis-suq, ġew irrapportati każiġiet iżolati ta' NMS, speċjalment wara t-tnaqqis jew it-twaqqif f'daqqa ta' entacapone u ta' prodotti medicinali dopaminergici oħra li kien qed jittieħdu fl-istess hin. Meta kkunsidrat neċċessarju, it-tibdil ta' Corbila ma' levodopa u inibitura ta' DDC mingħajr entacapone jew kura dopaminergika oħra għandu jsir bil-mod u jista' jkun hemm bżonn ta' żjeda fid-doża ta' levodopa.
- Jekk tkun meħtiega anestesija ġenerali, it-terapija b'Corbila tista' titkompla sakemm il-pazjent jithalla jieħu likwid u prodotti medicinali mill-halq. Jekk it-terapija għandha bżonn titwaqqaf temporanjament, Corbila jista' jerġa' jinbeda hekk kif prodotti medicinali orali jistgħu jittieħdu bl-istess doža ta' kuljum bħal qabel.
- Hijra rrakkomanda evalwazzjoni perjodika tal-funzjoni epatika, emopoetika, kardiovaskulari u renali waqt terapija mtawwla b'Corbila.
- Għal pazjenti li taqbadhom dijarea, sabiex tiġi evitata l-possibbiltà ta' tnaqqis drastiku fil-piż, huwa rrakkomondat li l-pazjent jintiżen b'mod regolari. Dijarea għal tul ta' żmien jew persistenti li tidher waqt l-użu ta' entacapone taf tkun sinjal ta' kolite. F'każ li jkun hemm dijarea għal tul ta' żmien jew persistenti, għandha titwaqqaf il-mediċina u għandha tingħata terapija medika xierqa u jsiru l-investigazzjoni meħtieġa.
- Il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati regolarmen għal žvilupp ta' disturbi tal-kontroll tal-impulsi. Il-pazjenti u minn jieħu hsiebhom għandhom ikunu konxji li jista' jkun hemm sintomi ta' mgħiba li twassal għal disturbi tal-kontroll tal-impulsi li jinkludu logħob tal-ażżejjed patologiku, żieda fil-libido, ipersesswalitā, infiġ jew xiri kompulsiv, ikel bl-addoċċ u b'mod kompulsiv f'pazjenti mogħiġja agonisti ta' dopamine u/jew trattamenti dopaminergici oħrajn li fihom levodopa inkluż Corbila. Hu rrakkomondat li ssir reviżjoni tat-trattament jekk jiżviluppaw dawn is-sintomi.
- Sindrome ta' Indeboliment fir-Regolazzjoni ta' Dopamine (DDS - Dopamine Dysregulation Syndrome) huwa disturb ta' dipendenza li jwassal għal użu eċċessiv tal-prodott osservat f'xi pazjenti ttrattati b'carbidopa/ levodopa. Qabel il-bidu tat-trattament, il-pazjenti u l-persuni li jieħdu hsiebhom għandhom jiġu mwissija dwar ir-riskju potenzjali ta' žvilupp ta' DDS (ara wkoll sezzjoni 4.8).
- Għal pazjenti li jesperjenzaw anoreksja progressiva, astenja u tnaqqis fil-piż f'perijodu ta' żmien relattivament qasir, evalwazzjoni medika ġenerali li tħalli l-funzjoni tal-fwied għandha tīġi kkonsidrata.
- Levodopa/carbidopa jista' jikkawża riżultat pożittiv falz meta tintuża stikka li tixxarab

biex tiċċekkja l-ketoni fl-awrina u din ir-reazzjoni ma tinbidilx meta jitgħallla l-kampjun tal-awrina. L-użu ta' metodi ta' glucose oxidase jistgħu jagħtu riżultati negattivi foloz għall-glukosurja.- Corbila fih sucrose, u għalhekk pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza għall-fructose, assorbiment hażin ta' glucose-galactose, jew insuffiċjenza ta' sucrase-isomaltase m'għandhomx jieħdu din il-mediċina.

- Corbila 150 mg/37.5 mg/200 mg fiha 2.6 mg sodium f'kull pillola. Id-doża massima rakkomandata ta' kuljum (10 pilloli) fiha 26 mg sodium, ekwivalenti għal 1.3% tal-ammont massimu rakkomandat mill-WHO ta' 2 g sodium li għandu jittieħed kuljum minn adult.- Corbila 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg, 175 mg/43.75 mg/200 mg u 200 mg/50 mg/200 mg pilloli mikṣija b'rīta fihom anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża massima rakkomandata kuljum, jiġifieri essenzjalment ‘hielsa mis-sodium’.

4.5 Interazzjoni ma' prodotti medicinali oħra u forom oħra ta' interazzjoni

Prodotti medicinali kontra l-marda ta' Parkinson oħra: S'issa ma kienx hemm indikazzjoni ta' interazzjonijiet li ma jippermettux l-użu flimkien ta' prodotti medicinali standard kontra l-marda ta' Parkinson ma' terapija b'Corbila. Entacapone f'doża għolja jista' jaftettwa l-assorbiment ta' carbidopa. Izda, ma kienet osservata l-ebda interazzjoni ma' carbidopa bil-programm ta' kura rrakkomandata (200 mg ta' entacapone sa 10 darbiet kuljum). Interazzjonijiet bejn entacapone u selegiline ġew investigati fi studji b'doži ripetuti f'pazjenti bil-marda ta' Parkinson ikkurati b'levodopa/inhibitur ta' DDC u ma kienet osservata l-ebda interazzjoni. Meta wżat ma' Corbila, id-doża ta' kuljum ta' selegiline m'għandhiex taqbeż 10 mg.

Għandha tintuża kawtela meta s-sustanzi attivi li ġejjin jingħataw fl-istess waqt ma' terapija b'levodopa.

Anti-ipertensivi: Jista' jkun hemm pressjoni posturali baxxa sintomatika meta levodopa jiġi miżjud mal-kura ta' pazjenti li diga qed jingħataw anti-ipertensivi. Jista' jkun hemm bżonn ta' aġġustament fid-doża tas-sustanza anti-ipertensiva.

Antidepressanti: Rarament, reazzjonijiet inkluż pressjoni għolja u diskinesja ġew irrappurtati bl-użu fl-istess hin ta' antidepressanti triċikliċi u levodopa/carbidopa. Interazzjonijiet bejn entacapone u imipramine u bejn entacapone u moclobemide ġew investigati fi studji b'doża waħda f'voluntiera f'sahħħithom. Ma ġew osservati l-ebda interazzjonijiet farmakodinamiċi. Numru sinifikanti ta' pazjenti bil-marda ta' Parkinson ġew ikkurati bit-taħħita ta' levodopa, carbidopa u entacapone ma' bosta sustanzi attivi inkluż inhibituri MAO-A, antidepressanti triċikliċi, inhibituri tat-teħid mill-ġdid ta' noradrenaline bħal desipramine, maprotiline u venlafaxine u prodotti medicinali li huma metabolizzati minn COMT (eż. prodotti li għandhom struttura ta' catechol, paroxetine). Ma ġew osservati l-ebda interazzjonijiet farmakodinamiċi. Izda, għandha tintuża kawtela meta dawn il-prodotti medicinali jintużaw flimkien ma' Corbila (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Sustanzi attivi oħra: Antagonisti tar-riċetturi ta' dopamine (eż. ċertu antipsikotici u anti-emetic), phenytoin u papaverine jistgħu jnaqqsu l-effett terapeutiku ta' levodopa. Pazjenti li qed jieħdu dawn il-prodotti medicinali ma' Corbila għandhom jiġu osservati mill-vičin għat-tar-terapeutiku.

Minħabba l-affinità ta' entacapone għaċ-ċitokromju P450 2C9 *in vitro* (ara sezzjoni 5.2), Corbila jista' potenzjalment jinterferixxi ma' sustanzi attivi bħal S-warfarin li l-metabolizmu tagħhom jiddeppendi minn din l-iso-enzima. Izda, fi studju dwar l-interazzjoni f'voluntiera f'sahħħithom, entacapone ma biddilx il-livelli fil-plażma ta' S-warfarin, filwaqt li l-AUC ta' R-warfarin żidiedet b'medja ta' 18% [CI₉₀ 11–26%]. Il-valuri ta' INR żidiedu b'medja ta' 13% [CI₉₀ 6–19%]. Għalhekk, huwa rrakkomandat kontroll tal-INR meta jinbeda Corbila f'pazjenti li qed jieħdu warfarin.

Forom oħra ta' interazzjonijiet: Peress li levodopa jikkompeti ma' ċertu aċidi amminiċi, l-assorbiment ta' Corbilta jista' jonqos f'ċertu pajjenti li qeqħdin fuq dieta ta' hafna proteini.

Levodopa u entacapone jistgħu jiffurmaw *chelates* mal-ħadid fl-apparat gastro-intestinali. Għalhekk, Corbilta u preparazzjonijiet li fihom il-ħadid għandhom jittieħdu tal-inqas 2–3 sīghat bogħod minn xulxin (ara sezzjoni 4.8).

Data in vitro: Entacapone jehel mas-sit ta' twahħil II tal-albumina umana fejn jeħlu wkoll bosta prodotti mediciċinali oħrajn, inkluż diazepam u ibuprofen. Skont studji *in vitro*, mhux mistenni sostituzzjoni sinifikanti f'konċentrazzjonijiet terapewtiċi tal-prodotti mediciċinali. Għalhekk, s'issa ma kien hemm l-ebda indikazzjoni ta' interazzjonijiet bħal dawn.

4.6 Fertilità, tqala u treddiġ

Tqala

M'hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu tat-taħlita ta' levodopa/carbidopa/entacapone f'nisa tqal. Studji f'animali bis-sustanzi separati wrew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies. Corbilta m'għandux jintuża waqt it-tqala sakemm il-benefiċċċi għall-omm ma jkun ux akbar mir-riskji possibl għall-fetu.

Treddiġ

Levodopa hu eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Hemm evidenza li t-treddiġ jiġi mrażżan waqt kura b'levodopa. Carbidopa u entacapone tneħħew fil-ħalib fl-animali iżda mhux magħruf jekk jitneħħewx fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Is-sigurtà ta' levodopa, carbidopa jew entacapone fit-tarbija mhix magħrufa. In-nisa m'għandhomx ireddgħu waqt kura b'Corbilta.

Fertilità

Fi studji prekliniči b'entacapone, carbidopa jew levodopa waħedhom ma kienu osservati l-ebda reazzjonijiet avversi fuq il-fertilità. Ma sarux studji fuq l-animali dwar il-fertilità bit-taħlita ta' entacapone, levodopa u carbidopa.

4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Corbilta jista' jkollu effett qawwi hafna fuq il-hila biex issuq u thaddem magni. Levodopa, carbidopa u entacapone flimkien jistgħu jikkawżaw sturdament u ortostatiżmu sintomatiku. Għalhekk, għandha tintuża kawtela fis-sewqan u t-thaddim ta' magni.

Pajjenti li qed jiġu kkurati b'Corbilta u jaqbadhom in-nghas u/jew episodji ta' attakki ta' rqad f'daqqa għandhom jiġu avżati biex ma jsuqux jew jagħmlu attivitatiet fejn nuqqas fil-viġilanza tista' tpoġġi lilhom jew lill-oħrajn f'riskju ta' korriġment serju jew mewt (eż. thaddim ta' magni) sakemm dawn l-episodji rikorrenti jgħaddu (ara sezzjoni 4.4).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

a. Sommarju tal-profil ta' sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod frekwenti b'Corbilta huma diskajnejji li jseħħu f'madwar 19% tal-pazjenti; sintomi gastro-intestinali inkluż tqalligh u dijarea li jseħħu f'madwar 15% u 12% tal-pazjenti, rispettivament; uġiġ fil-muskoli, muskolu-skeletriku u tat-tessuti konnettivi li jseħħ f'madwar 12% tal-pazjenti; u bidla li ma tagħmilx ħsara fil-kulur tal-awrina għal lewn kannella fl-ahmar (kromaturja) li sseħħ f'madwar 10% tal-pazjenti. Avvenimenti serji ta' emorragija gastro-intestinali (mhux komuni) u angioedima (rari) kienu identifikati mill-provi kliniči b'Corbilta jew entacapone flimkien ma' levodopa/inhibitit ta' DDC. B'Corbilta jistgħu jseħħu epatite serja l-aktar b'karatteristiċi kolestatiċi, rabdomijolisi u sindrome newrolettiku malinn għalkemm ma kienu identifikati l-ebda każijiet mid-data tal-prova klinika.

b. Lista f'tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin, elenkti f'Tabella 1, ġew akkumulati kemm minn *data* miġbura flimkien ta' ħdax-il prova klinika, double-blind li kienu jikkonsistu minn 3 230 pazjent (1 810 ikkurati b'Corbilta jew entacapone flimkien ma' levodopa/inibitur ta' DDC, u 1 420 ikkurati b'plaċebo flimkien ma' levodopa/inibitur ta' DDC jew cabergoline flimkien ma' levodopa/inibitur ta' DDC), kif ukoll mid-*data* ta' wara t-tqegħid fis-suq wara l-introduzzjoni ta' entacapone fis-suq għall-użu flimkien ta' entacapone u levodopa/inibitur ta' DDC.

Reazzjonijiet avversi huma mqassma taħt il-kategoriji ta' frekwenza, bl-aktar frekwenti l-ewwel, bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni hafna ($\geq 1/10$); komuni ($\geq 1/100$ sa < $1/10$); mhux komuni ($\geq 1/1\,000$ sa < $1/100$); rari ($\geq 1/10\,000$ sa < $1/1\,000$), rari hafna ($< 1/10\,000$), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-*data* disponibbli, peress li ma tista' tigi derivata l-ebda stima valida minn provi kliniči jew minn studji epidemjoloġici).

Tabella 1. Reazzjonijiet avversi

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni:	Anemija
Mhux komuni:	Tromboċitopenija

Disturbi fil-metabolizmu u n-nutrizzjoni

Komuni:	Tnaqqis fil-piż*, tnaqqis fl-apptit*
---------	--------------------------------------

Disturbi psikjatriċi

Komuni:	Depressjoni, alluċinazzjonijiet, stat konfuż*, holm mhux normali*, ansjetà, insomnja
Mhux komuni:	Psikosi, aġitazzjoni*
Mhux magħruf:	Mġiba ta' suwiċidju, sindrome ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni hafna:	Diskajnejha*
Komuni:	Il-marda ta' Parkinson aggravata (eż. bradikajnejha)*, roghda, fenomenu 'on-off', distonja, indeboliment mentali (eż. nuqqas ta' memorja, dimenżja), ngħas, sturdament*, uġiġi ta' ras
Mhux magħruf:	Sindrome newrolettiku malinn*

Disturbi fl-ghajnejn

Komuni:	Tara mċajpar
---------	--------------

Disturbi fil-qalb

Komuni:	Avvenimenti ta' mard iskemiku tal-qalb minbarra infart mijokardijaku (eż. angina pektoris)**, ritmu tal-qalb mhux regolari
Mhux komuni:	Infart mijokardijaku**

Disturbi vaskulari

Komuni:	Pressjoni ortostatika baxxa, pressjoni għolja
Mhux komuni:	Emorragija gastro-intestinali

Disturbi respiratorji, toraċċi u medjastinali

Komuni:	Qtugħ ta' nifs
---------	----------------

Disturbi gastro-intestinali

Komuni hafna:	Dijarea*, tqalligh*
Komuni:	Stitikezza*, rimettar*, dispepsja, uġiġi u skomdu addominali*, ħalq xott*
Mhux komuni:	Kolite*, disfaġja

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Mhux komuni: Test tal-funzjoni tal-fwied mhux normali*
Mhux magħruf: Epatite l-aktar b'fatturi kolestatiċi (ara sezzjoni 4.4)*

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda

Komuni: Raxx*, għaraq eċċessiv
Mhux komuni: Bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, għaraq)*
Rari: Anġjoedima
Mhux magħruf: Urtikarja*

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Komuni ħafna: Uġiġ fil-muskoli, muskolu-skeletriku u tat-tessuti konnettivi*
Komuni: Spażmi fil-muskoli, artralgja
Mhux magħruf: Rabdomijolisi*

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Komuni ħafna: Kromaturja*
Komuni: Infezzjoni fl-apparat tal-awrina
Mhux komuni: Żamma tal-awrina

Disturbi generali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata

Komuni: Uġiġ fis-sider, edima periferali, waqgħat, disturbi fil-mixja, astenja, għejja
Mhux komuni: Telqa ġeneralizzata

*Ir-reazzjonijiet avversi li huma fil-biċċa l-kbira attribwiti għal entacapone jew li huma aktar frekwenti (b'differenza fil-frekwenza ta' mill-anqas 1% fid-data tal-prova klinika) b'entacapone milli b'levodopa/inhibitur ta' DDC waħdu. Ara sezzjoni ċ.

**Ir-rati ta' incidenza ta' infart mijokardijaku u ta' avvenimenti ta' mard iskemiku tal-qalb ieħor (0.43% u 1.54%, rispettivament) huma derivati minn analizi ta' 13-il studju double-blind li kienu jinvolvu 2 082 pazjent b'varjazzjonijiet motorji tal-ahħar tad-doża li kienu qed jirċievu entacapone.

c. Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Ir-reazzjonijiet avversi li huma fil-biċċa l-kbira attribwiti għal entacapone jew li huma aktar frekwenti b'entacapone milli b'levodopa/inhibitur ta' DDC waħdu huma indikati b'asterisk f'Tabu 1, sezzjoni 4.8b. Xi whud minn dawn ir-reazzjonijiet avversi huma konnessi ma' attivitā dopaminergika akbar (eż. diskajnejja, tqalligh u rimettar) u jseħħu l-aktar komuni fil-bidu tal-kura. Tnaqqis fid-doża ta' levodopa tnaqqas is-severità u l-frekwenza ta' dawn ir-reazzjonijiet dopaminergici. Ftit reazzjonijiet avversi huma magħrufa li huma direttament attribwiti għas-sustanza attiva entacapone inkluż dijarea u bidla fil-kulur tal-awrina għal kannella fl-ahmar. F'xi każijiet Entacapone jista' iwassal wkoll għal tibdil fil-kulur ta' eż. ġilda, dwiefer, xagħar u gharaq. Reazzjonijiet avversi ohra immarkati b'asterisk f'Tabu 1, sezzjoni 4.8b huma mmarkati peress li seħħu b'mod aktar frekwenti (b'differenza fil-frekwenza ta' mill-inqas 1%) fid-data tal-prova klinika b'entacapone milli b'levodopa/DDCI waħdu jew minħabba rapporti ta' sigurtà tal-każ indvidwali li waslu wara l-introduzzjoni ta' entacapone fis-suq.

Konvulżjonijiet seħħew b'mod rari b'levodopa/carbidopa; iżda relazzjoni kawżali ma' terapija b'levodopa/carbidopa ma' ġietx stabbilita.

Disturbi tal-kontroll tal-impulsi: Jista' jkun hemm logħob tal-ażżejjad patologiku, żieda fil-libido, ipersesswalità, infiġ jew xiri kompulsiv, ikel bl-addoċċ u b'mod kompulsiv f'pazjenti mogħtija agonisti ta' dopamine u/jew trattamenti dopaminergici oħrajn li fihom levodopa inkluż Corbilta (ara sezzjoni 4.4).

Sindrome ta' Indeboliment fir-Regolazzjoni ta' Dopamine (DDS - Dopamine Dysregulation

Syndrome) huwa disturb ta' dipendenza osservat f'xi pazjenti trattati b'carbidopa/ levodopa. Il-pazjenti affettwati juru modi kompulsivi ta' užu hažin tal-mediċina dopaminerġika aktar mid-dozi suffiċjenti biex jikkontrollaw sintomi motorji, li f'xi kažijiet jistgħu jwasslu għal diskajnejha severa (ara wkoll sezzjoni 4.4).

Entacapone f'assoċjazzjoni ma' levodopa kien assoċjat ma' kažijiet iżolati ta' ngħas eċċesiv matul il-ġurnata u episodji ta' rqad f'daqqa.

Rappurtar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġi rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħha huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżza f'[Appendiċi V](#).

4.9 Doża eċċessiva

Data wara t-tqegħid fis-suq tinkludi kažijiet iżolati ta' doża eċċessiva fejn l-ogħla doži rrappurtati kuljum ta' levodopa u entacapone kienu mill-inqas 10 000 mg u 40 000 mg, rispettivament. Is-sintomi u s-sinjal akut ta' dawn il-kažijiet ta' doża eċċessiva kienu jinkludu agitazzjoni, stat konfuż, koma, bradikardija, takikardija ventrikulari, respirazzjoni Cheyne-Stokes, bidla fil-kulur tal-ġilda, ilsien u konġuntiva, u kromaturja. L-immaniġġjar ta' doża eċċessiva akuta b'terapija ta' Corbilta hija simili għal doża eċċessiva b'levodopa. Madankollu, Pyridoxine mhux effettiv biex jaqleb l-azzjonijiet ta' Corbilta. Ammissjoni fl-isptar hija rrakkomandata u għandhom jintużaw miżuri ġenerali ta' rapport b'hasil gastriku immedjat u b'dozi ripetuti ta' faħam tul iż-żmien. Dan jista' jħaffef l-eliminazzjoni ta' entacapone speċjalment billi jnaqqas l-assorbiment/riassorbiment tiegħu mill-apparat GI. Is-suffiċjenza tas-sistemi respiratorji, cirkulatorji u renali għandha tiġi sorveljata b'attenzjoni u għandhom jintużaw miżuri ta' appoġġ xierqa. Għandha tinbeda sorveljanza b'ECG u l-pazjent għandu jiġi sorveljat b'attenzjoni għal žvilupp potenzjali ta' arritmija. Jekk hemm bżonn, għandha tingħata terapija anti-arritmika xierqa. Għandha tiġikkuns idrata l-possibiltà li l-pazjent ha sustanzi attivi oħra flimkien ma' Corbilta. L-importanza ta' dijalisi fil-kura ta' doża eċċessiva mhix magħrufa.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĞIĊI

5.1 Proprietajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapeutika: mediċini kontra l-marda ta' Parkinson, dopa u derivattivi ta' dopa, Kodiċi ATC: N04BA03

Skont fehim kurrenti, is-sintomi tal-marda ta' Parkinson huma relatati ma' tnaqqis ta' dopamine fil-corpus striatum. Dopamine ma jaqsamx il-barriera ta' bejn id-demm u l-mohħ. Levodopa, il-prekursur ta' dopamine, jaqsam il-barriera ta' bejn id-demm u l-mohħ u jtaffi is-sintomi tal-marda. Minħabba li levodopa jiġi metabolizzat b'mod estensiv fil-periferija, porzjon żgħir biss tad-doża mogħtija tilhaq is-sistema nervuża centrali meta levodopa jingħata mingħajr inibituri tal-enzimi metaboliċi.

Carbidopa u benserazide huma inibituri ta' DDC periferali li jnaqqas il-metabolizmu periferali ta' levodopa għal dopamine, u b'hekk, aktar levodopa jkun disponibbli għall-mohħ. Meta titnaqqas id-decarboxylation ta' levodopa bl-għotja fl-istess hin ta' inibituri ta' DDC, tista' tintużha doża aktar baxxa ta' levodopa u l-inċidenza ta' reazzjonijiet avversi bħal tqallih titnaqqas.

Bl-inibizzjoni ta' decarboxylase minn inibituri ta' DDC, catechol-O-methyltransferase (COMT) isir il-metodu ta' metabolizzazzjoni periferali maġġuri li jikkatalizza il-konversjoni ta' levodopa għal 3-O-methydopa (3-OMD), metabolita ta' levodopa li jista' jkun ta' hsara. Entacapone huwa inibitur riversibbli u speċifiku ta' COMT li jaħdem primarjament fil-periferija, maħsub għall-ghotja flimkien ma' levodopa. Entacapone inaqkas ir-rata tat-tnejħiha ta' levodopa mid-demmin u jwassal għal żjeda fl-erja taħt il-kurva (AUC - area under the curve) fil-profil farmakokinetiku ta' levodopa. Bhala

konsegwenza ir-respons kliniku ta' kull doža ta' levodopa huwa msaħħaħ u mtawwal.

L-evidenza tal-effetti terapewtiċi ta' Corbilta hija bbażata fuq żewġ studji double-blind ta' faži III, fejn 376 pazjent bil-marda ta' Parkinson b'oxxillazzjonijiet motorji tat-tmiem tad-doža irċevew entacapone jew plaċebo ma' kull doža ta' levodopa/inibitħur ta' DDC. Il-perjodu ON ta' kuljum bi u bla entacapone kien irregiestrat fid-djarji ta' kuljum tal-pazjenti. Fl-ewwel studju, entacapone żied il-medja tal-perjodu ON ta' kuljum b'1 h 20 min (CI_{95%} 45 min, 1 h 56 min) mill-linja baži. Dan kien jikkorripondi għal żjeda ta' 8.3% fil-proporzjon tal-perjodu ON ta' kuljum. B'hekk, it-tnaqqis tal-perjodu OFF ta' kuljum kien ta' 24% fil-grupp ta' entacapone u 0% fil-grupp tal-plaċebo. Fit-tieni studju, il-proporzjon medju tal-perjodu ON ta' kuljum żdied b'4.5% (CI_{95%} 0.93%, 7.97%) mill-linja baži. Dan ifisser żjeda medja ta' 35 min fil-perjodu ON ta' kuljum. B'hekk, il-perjodu OFF ta' kuljum naqas b'18% b'entacapone u b'5% bil-plaċebo. Minħabba li l-effetti tal-pilloli ta' Corbilta huma ekwivalenti għal pillola entacapone 200 mg mogħtija fl-istess ħin ma' preparazzjonijiet ta' carbidopa/levodopa li jintreħew b'mod standard li huma disponibbli għal bejh f'doži li jikkorripondu dawn ir-riżultati jistgħu jintużaw ukoll biex jiddeskrivu l-effetti ta' Corbilta.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Karatteristici generali tas-sustanzi attivi

Assorbimento/distribuzzjoni: Hemm varjazzjonijiet inter- u intra-individuali sostanziali fl-assorbiment ta' levodopa, carbidopa u entacapone. Kemm levodopa kif ukoll entacapone huma assorbiti u eliminati b'mod veloci. Carbidopa huwa assorbit u eliminat kemmxejn aktar bil-mod meta mqabel ma' levodopa. Meta jingħata separatament mingħajr iż-żewġ sustanzi attiv l-oħra, il-bijodisponibiltà għal levodopa hija 15–33%, għal carbidopa 40–70% u għal entacapone 35% wara doža orali ta' 200 mg. Ikliet li fihom ħafna acidi amminiċi newtrali kbar jistgħu jtawwlu u jnaqqsu l-assorbiment ta' levodopa. L-ikel ma jaffettwax l-assorbiment ta' entacapone b'mod sinifikanti. Il-volum ta' distribuzzjoni kemm ta' levodopa (Vd 0.36–1.6 l/kg) kif ukoll ta' entacapone (Vd_{ss} 0.27 l/kg) huwa moderatamenteż-żgħir waqt li m'hemm data disponibbli dwar carbidopa.

Levodopa jeħel mal-proteini fil-plażma b'mod minimu biss, ta' madwar 10–30% u carbidopa jeħel b'madwar 36%, filwaqt li entacapone jeħel b'mod estensiv mal-proteini fil-plażma (madwar 98%), primarjament mal-albumina fis-serum. F'konċentrazzjonijiet terapewtiċi, entacapone ma jispostax sustanzi attivi oħra li jeħlu b'mod estensiv (eż. warfarin, salicylic acid, phenylbutazone, jew diazepam), u lanqas jiġi spustat b'mod sinifikanti minn xi wieħed minn dawn is-sustanzi f'konċentrazzjonijiet terapewtiċi jew oħla.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni: Levodopa huwa metabolizzat b'mod estensiv f'bosta metaboliti: l-aktar metodi importanti huma decarboxylation minn dopa decarboxylase (DDC) u O-methylation minn catechol-O-methyltransferase (COMT).

Carbidopa huwa metabolizzat f'żewġ metaboliti principali li jitneħħew fl-awrina bhala glucuronides u sustanzi mhux konjugati. Carbidopa mhux mibdul jikkonstitwixxi 30% tat-tnejħħija totali fl-awrina.

Entacapone jiġi metabolizzat kważi kompletament qabel ma jitneħħha fl-awrina (10 sa 20%) u fil-bili/hmieġ (80 sa 90%). Ir-rotta metabolika principali hija l-glucuronidation ta' entacapone u tal-metabolita attiv tiegħu, cis-isomer, li jikkonstitwixxi madwar 5% tal-kwantità totali fil-plażma.

It-tnejħħija totali ta' levodopa hija fil-firxa ta' 0.55–1.38 l/kg/h u ta' entacapone hija fil-firxa ta' 0.70 l/kg/h. Meta kull wieħed jingħata b'mod separat, il-half-life tal-eliminazzjoni (t_{1/2}) hija 0.6–1.3 sīgħat għal levodopa, 2-3 sīgħat għal carbidopa u 0.4–0.7 sīgħat għal entacapone.

Minħabba half-lives tal-eliminazzjoni qosra, b'għotja ripetuta ma sseħħi l-ebda akkumulazzjoni vera ta' levodopa jew entacapone.

Data minn studji in vitro bl-użu ta' preparazzjonijiet ta' mikrożomi epatici umani tindika li entacapone jinibixxi ċ-ċitokromju P450 2C9 (IC₅₀ ~ 4 μM). Entacapone wera ftit jew l-ebda inibizzjoni tat-tipi l-

ohra ta' isoenzimi P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A u CYP2C19); ara sezzjoni 4.5.

Karatteristici fil-pazjenti

Anzjani: Meta jingħata mingħajr carbidopa u entacapone, l-assorbiment ta' levodopa huwa akbar u l-eliminazzjoni hija aktar bil-mod fl-anzjani meta mqabbla ma' individwi iżgħar. Iżda, wara l-għotja ta' carbidopa flimkien ma' levodopa, l-assorbiment ta' levodopa huwa simili fl-anzjani u fiż-żgħar, iżda l-AUC xorta hija 1.5 darbiet akbar fl-anzjani minħabba tnaqqis fl-attività ta' DDC u tneħħija aktar baxxa maž-żjeda fl-ċet. Ma hemm l-ebda differenzi sinifikanti fl-AUC ta' carbidopa jew entacapone bejn individwi iżgħar (45–64 sena) u dawk anzjani (65–75 sena).

Sess: Il-bijodisponibiltà ta' levodopa hija sinifikatament għola fin-nisa milli fl-irġiel. Fl-istudji farmkokinetiċi b'Corbila il-bijodisponibiltà ta' levodopa hija oħla fin-nisa milli fl-irġiel, primarjament minħabba d-differenza fil-piż tal-ġisem, filwaqt li ma hemm l-ebda differenza bejn is-sessi b'carbidopa u entacapone.

Indeboliment epatiku: Il-metabolizmu ta' entacapone huwa aktar bil-mod f'pazjenti b'indeboliment epatiku ħafif għal moderata (Child-Pugh Klassi A u B) li jwassal għal żjedha fil-konċentrazzjoni ta' entacapone fil-plażma kemm fil-fażi ta' assorbiment kif ukoll f'dik ta' eliminazzjoni (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.3). Ma ġew irrapprtati l-ebda studji partikolari dwar il-farmakokinetika ta' carbidopa u ta' levodopa f'pazjenti b'indeboliment epatiku, iżda, huwa rrakkomandat li Corbila għandu jingħata b'kawtela lill-pazjenti b'indeboliment epatiku ħafif sa moderat.

Indeboliment renali: Indeboliment renali ma jaffettwax il-farmakokinetika ta' entacapone. Ma ġew irrapprtati l-ebda studji partikolari dwar il-farmakokinetika ta' levodopa u carbidopa f'pazjenti b'indeboliment renali. Madanakollu, jista' jiġi kkunsidrat intervall ta' dożagg ta' Corbila itwal ghall-pazjenti li qed jirċievu terapija b'djalisi (ara sezzjoni 4.2).

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta' sigurtà farmakologika, effett tossiku minn doži ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni u riskju ta' kanċer, dwar levodopa, carbidopa u entacapone studjati waħedhom jew f'tahlita, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Fi studji b'entacapone dwar l-effett tossiku minn doži ripetuti, kienet osservata anemija wisq probabbli minħabba l-kwalità ta' entacapone li jehel mal-ħadid. Dwar l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva ta' entacapone, tnaqqis fil-piż tal-fetu u ttardjar hafif fl-iżvilupp tal-ghadam kienu osservati fi fniek ikkurati b'livelli ta' espożizzjoni sistemika fil-firxa terapeutika. Kemm levodopa kif ukoll taħlitiet ta' carbidopa u levodopa ikkawżaw malformazzjonijiet vixerāli u skeletriċi fil-fniek.

6. TAGĦRIF FARMAČEWTIKU

6.1 Lista ta' eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Croscarmellose sodium
Magnesium stearate
Maize starch
Mannitol (E421)
Povidone K 30 (E1201)

Kisja b'rīta ta' 50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg u 150/37.5/200 mg:

Glycerol (85 fil-mija) (E422)
Hypromellose
Magnesium stearate
Polysorbate 80

Iron oxide aħmar (E172)

Sucrose

Titanium dioxide (E171)

Iron oxide isfar (E172)

Kisja b'rita ta' 75/18.75/200 mg, 125/31.25/200 mg, 175/43.75/200 mg u 200/50/200 mg:

Glycerol (85 fil-mija) (E422)

Hypromellose

Magnesium stearate

Polysorbate 80

Iron oxide aħmar (E172)

Sucrose

Titanium dioxide (E171)

6.2 Inkompatibiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott medicinali

3 snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott medicinali m'għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenit u ta' dak li hemm ġo fih

Flixkun tal-HDPE b'għeluq PP rezistenti għat-tfal.

Daqsijiet tal-pakkett ta' 50/12.5/200 mg, 100/25/200 mg u 150/37.5/200 mg:
10, 30, 100, 130, 175 u 250 pillola.

Daqsijiet tal-pakkett ta' 75/18.75/200 mg, 125/31.25/200 mg, 175/43.75/200 mg u 200/50/200 mg:
10, 30, 100, 130 u 175 pillola.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi

Kull fdal tal-prodott medicinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitkolu l-ligħid lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Il-Finlandja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

50 mg/12.5 mg/200 mg

EU/1/13/859/001–006

75 mg/18.75 mg/200 mg

EU/1/13/859/007–011

100 mg/25 mg/200 mg

EU/1/13/859/012–017

125 mg/31.25 mg/200 mg

EU/1/13/859/018–022

150 mg/37.5 mg/200 mg

EU/1/13/859/023–028

175 mg/43.75 mg/200 mg

EU/1/13/859/029–033

200 mg/50 mg/200 mg

EU/1/13/859/034–038

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĞDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 11 ta' Novembru 2013

Data tal-aħħar tiġid: 6 ta' Lulju 2018

10. DATA TA' REVIZJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediciċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Àgenzija Ewropea ghall-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

ANNESS II

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĞ
TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD
IL-PROVVISTA U L-UŽU**
- Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZAZZJONI
GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD
TAL-UŽU SIGUR U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDICINALI**

A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUġ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbi għall-hruġ tal-lott

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott medicinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

- Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs)**

Ir-rekwiżiti biex jiġu pprezentati PSURs għal dan il-prodott medicinali huma mniżzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAČI TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

- Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi pprezentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni ġidha li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

ANNESS III
TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF

A. TIKKETTAR

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Corbita 50 mg/12.5 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 50 mg ta' levodopa, 12.5 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

3. LISTA TA' ECCHIPJENTI

Fih sucrose.

4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT

Kartuna

10 pilloli miksija b'rita
30 pillola miksija b'rita
100 pillola miksija b'rita
130 pillola miksija b'rita
175 pillola miksija b'rita
250 pillola miksija b'rita

Tikketta

10 pilloli
30 pillola
100 pillola
130 pillola
175 pillola
250 pillola

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDICINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĆJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĆJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Kartuna

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Tikketta

Orion Corporation

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/13/859/001 10 pilloli miksijsa b'rita
EU/1/13/859/002 30 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/003 100 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/004 130 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/005 175 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/006 250 pillola miksijsa b'rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

corbilta 50/12.5/200 mg [*kartuna biss*]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż *[kartuna biss]*

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

[kartuna biss]:

PC {numru}
SN {numru}
<NN {numru}>

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

Corbita 75 mg/18.75 mg/200 mg pilloli miksijsa b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksijsa b'rita fiha 75 mg ta' levodopa, 18.75 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

3. LISTA TA' ECĆIPJENTI

Fih sucrose.

4. GHAMLA FARMAĆEWTIKA U KONTENUT

Kartuna

10 pilloli miksijsa b'rita
30 pillola miksijsa b'rita
100 pillola miksijsa b'rita
130 pillola miksijsa b'rita
175 pillola miksijsa b'rita

Tikketta

10 pilloli
30 pillola
100 pillola
130 pillola
175 pillola

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĆJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĆJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONI JET SPEĆJALI TA' KIF JINHAŽEN**10. PREKAWZJONI JET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDICINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BŻONN****11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ***Kartuna*

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Tikketta

Orion Corporation

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ

EU/1/13/859/007 10 pilloli miksijsa b'rita
EU/1/13/859/008 30 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/009 100 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/010 130 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/011 175 pillola miksijsa b'rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONI JET DWAR L-UŽU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

corbilta 75/18.75/200 mg [*kartuna biss*]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluž [*kartuna biss*]

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

[kartuna biss]:

PC {numru}
SN {numru}
<NN {numru}>

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 100 mg ta' levodopa, 25 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

3. LISTA TA' ECCHIPJENTI

Fih sucrose.

4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT

Kartuna

10 pilloli miksija b'rita
30 pillola miksija b'rita
100 pillola miksija b'rita
130 pillola miksija b'rita
175 pillola miksija b'rita
250 pillola miksija b'rita

Tikketta

10 pilloli
30 pillola
100 pillola
130 pillola
175 pillola
250 pillola

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDICINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĆJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĆJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

Kartuna

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Tikketta

Orion Corporation

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

EU/1/13/859/012 10 pilloli miksijsa b'rita
EU/1/13/859/013 30 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/014 100 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/015 130 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/016 175 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/017 250 pillola miksijsa b'rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

corbilta 100/25/200 mg [*kartuna biss*]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż *[kartuna biss]*

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

[kartuna biss]:

PC {numru}
SN {numru}
<NN {numru}>

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

Corbilta 125 mg/31.25 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 125 mg ta' levodopa, 31.25 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

3. LISTA TA' ECĆIPJENTI

Fih sucrose.

4. GHAMLA FARMAĆEWTIKA U KONTENUT

Kartuna

10 pilloli miksija b'rita
30 pillola miksija b'rita
100 pillola miksija b'rita
130 pillola miksija b'rita
175 pillola miksija b'rita

Tikketta

10 pilloli
30 pillola
100 pillola
130 pillola
175 pillola

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĆJALI TA' KIF JINHAŽEN**10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDICINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BŻONN****11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ***Kartuna*

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Tikketta

Orion Corporation

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ

EU/1/13/859/018 10 pilloli miksijsa b'rita
EU/1/13/859/019 30 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/020 100 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/021 130 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/022 175 pillola miksijsa b'rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

corbilta 125/31.25/200 mg [*kartuna biss*]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluž [*kartuna biss*]

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

[kartuna biss]:

PC {numru}
SN {numru}
<NN {numru}>

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI

Corbilta 150 mg/37.5 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksijsa b'rita fiha 150 mg ta' levodopa, 37.5 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

3. LISTA TA' ECCHIPJENTI

Fih sucrose u s-sodium.

4. GHAMLA FARMAČEWTIKA U KONTENUT

Kartuna

10 pilloli miksijsa b'rita
30 pillola miksijsa b'rita
100 pillola miksijsa b'rita
130 pillola miksijsa b'rita
175 pillola miksijsa b'rita
250 pillola miksijsa b'rita

Tikketta

10 pilloli
30 pillola
100 pillola
130 pillola
175 pillola
250 pillola

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDICINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĆJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĆJALI TA' KIF JINHAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĆINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĆINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQE明媚 HID FIS-SUQ

Kartuna

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Tikketta

Orion Corporation

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQE明媚 HID FIS-SUQ

EU/1/13/859/023 10 pilloli miksija b'rita
EU/1/13/859/024 30 pillola miksija b'rita
EU/1/13/859/025 100 pillola miksija b'rita
EU/1/13/859/026 130 pillola miksija b'rita
EU/1/13/859/027 175 pillola miksija b'rita
EU/1/13/859/028 250 pillola miksija b'rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĢENERALI TA' KIF JINGHATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŽU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

corbilta 150/37.5/200 mg [*kartuna biss*]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż *[kartuna biss]*

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

[kartuna biss]:

PC {numru}
SN {numru}
<NN {numru}>

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

Corbilta 175 mg/43.75 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 175 mg ta' levodopa, 43.75 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

3. LISTA TA' ECĆIPJENTI

Fih sucrose.

4. GHAMLA FARMAĆEWTIKA U KONTENUT

Kartuna

10 pilloli miksija b'rita
30 pillola miksija b'rita
100 pillola miksija b'rita
130 pillola miksija b'rita
175 pillola miksija b'rita

Tikketta

10 pilloli
30 pillola
100 pillola
130 pillola
175 pillola

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.

6. TWISSIJA SPEċJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEċJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONI JET SPEĆJALI TA' KIF JINHAŽEN**10. PREKAWZJONI JET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDICINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BŻONN****11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ***Kartuna*

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Tikketta

Orion Corporation

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ

EU/1/13/859/029 10 pilloli miksijsa b'rita
EU/1/13/859/030 30 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/031 100 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/032 130 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/033 175 pillola miksijsa b'rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONI JET DWAR L-UŽU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

corbilta 175/43.75/200 mg [*kartuna biss*]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluž [*kartuna biss*]

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

[kartuna biss]:

PC {numru}
SN {numru}
<NN {numru}>

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN U KLIEM FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĆINALI

Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b'rita fiha 200 mg ta' levodopa, 50 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.

3. LISTA TA' ECĆIPJENTI

Fih sucrose.

4. GHAMLA FARMAĆEWTIKA U KONTENUT

Kartuna

10 pilloli miksija b'rita
30 pillola miksija b'rita
100 pillola miksija b'rita
130 pillola miksija b'rita
175 pillola miksija b'rita

Tikketta

10 pilloli
30 pillola
100 pillola
130 pillola
175 pillola

5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.
Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĆJALI LI L-PRODOTT MEDIĆINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĆJALI OHRA, JEKK MEHTIEĞA

8. DATA TA' SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONI JET SPEĆJALI TA' KIF JINHAŽEN**10. PREKAWZJONI JET SPEĆJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDICINALI MHUX UŽATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDICINALI, JEKK HEMM BŻONN****11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ***Kartuna*

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Tikketta

Orion Corporation

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEKGHD FIS-SUQ

EU/1/13/859/034 10 pilloli miksijsa b'rita
EU/1/13/859/035 30 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/036 100 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/037 130 pillola miksijsa b'rita
EU/1/13/859/038 175 pillola miksijsa b'rita

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĜENERALI TA' KIF JINGHATA**15. ISTRUZZJONI JET DWAR L-UŽU****16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

corbilta 200/50/200 mg [*kartuna biss*]

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluž [*kartuna biss*]

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

[kartuna biss]:

PC {numru}
SN {numru}
<NN {numru}>

B. FULJETT TA' TAGHRIF

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg pilloli miksija b'rita levodopa/carbidopa/entacapone

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'ghandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta
3. Kif għandek tieħu Corbilta
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Corbilta
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża

Corbilta fih tliet sustanzi attivi (levodopa, carbidopa u entacapone) f'pillola waħda miksija b'rita. Corbilta jintuża għall-kura tal-marda ta' Parkinson.

Il-marda ta' Parkinson hija kkawżata minn livelli baxxi ta' sustanza msejħha dopamine fil-mohħ. Levodopa jżid il-livell ta' dopamine u b'hekk inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Carbidopa u entacapone itejjbu l-effetti kontra l-marda ta' Parkinson ta' levodopa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta

Tiħux Corbilta jekk inti:

- allergiku għal levodopa, carbidopa jew entacapone, jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6)
- għandek glawkom ta' angolu dejjaq (disturb fl-ghajn)
- għandek tumur tal-glandola adrenal
- qed tieħu certu mediċini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO)
- qatt kellek sindrome newrolettiu malinn (NMS – dan huwa reazzjoni rari għall-mediċini użati fil-kura ta' disturb mentali)
- qatt kellek rabdomijolisi mhux trawmatika (disturb muskolari rari)
- għandek mard sever tal-fwied.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Corbilta jekk għandek jew qatt kellek:

- attakk tal-qalb jew xi mard iehor tal-qalb, inkluż arritmija tal-qalb, jew tal-kanali tad-demm
- ażżma jew xi marda oħra tal-pulmun
- problema fil-fwied, għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata
- mard relatati mal-kliewi jew mal-ormoni
- ulċeri fl-istonku jew konvulzjonijiet

- jekk ikollok dijarea għal tul ta' żmien kellem lit-tabib tiegħek minħabba li dan jista' jkun sinjal ta' infjammazzjoni tal-musrana
- kull forma ta' disturb mentali sever bhal psikosi
- glawkomha kronika ta' angolu wiesa', għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata u l-pressjoni ta' ġo ghajnejk jista' jkollha bżonn tiġi sorveljata.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu:

- antipsikotiċi (medicini wżati biex jikkuraw il-psikosi)
- medicina li tista' tnaqqas il-pressjoni tad-demm meta tqum minn siġġu jew sodda. Għandek tkun taf li Corbila jista' jagħmel dawn ir-reazzjonijiet aghar.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk waqt kura b'Corbila inti:

- tinnota li l-muskoli tiegħek jibbiesgħu hafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Jekk isehħ xi wieħed minn dawn, **Kellem lit-tabib tiegħek minnufih.**
- thossox depress, ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, jew tinnota bidliet mhux tas-soltu fl-imġiba tiegħek
- torqod f'daqqa, jew jekk thossox imħeddel hafna. Jekk dan isehħ, m'għandekx issuq jew tuża ghoddha jew magni (ara wkoll sezzjoni “Sewqan u thaddim ta' magni”).
- tinnota li wara li tibda tieħu Corbila jibdew movimenti mhux ikkontrollati jew dawn imorru għal aghar. Jekk isehħ dan, it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn ibiddel id-doża tal-medicina tiegħek kontra l-marda ta' Parkinson.
- ikollok esperjenza ta' dijarea: huwa rrakkomandat li tissorvelja l-piż tiegħek sabiex tevita l-potenzjal ta' telf ta' piżi eċċessiv
- ikollok esperjenza ta' anoressija progressiva, astenja (debbulizza, thossox bla saħħha) u tnaqqis fil-piż f'perijodu relativament qasir. Jekk isehħ dan, għandha tiġi kkunsidrata valutazzjoni medika generali, inkluż il-funzjoni tal-fwied.
- thoss li għandek bżonn tieqaf tuża Corbila, ara sezzjoni “Jekk tieqaf tieħu Corbila”.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/persuna li tieħu hsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa sintomi bħal vizzju, li jwasslu għal xenqa ta' doži kbar ta' Corbila u medicini oħra użati fit-trattament tal-marda ta' Parkinson.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja/min jieħu hsiebek jinnota li qed tiżviluppa xewqat jew kilbiet sabiex iġġib ruhekk b'mod li mhux tas-soltu ġħalik jew jekk ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqa jew it-tentazzjoni li twettaq attivitajiet li jistgħu jkunu ta' hsara ġħalik jew ghall-oħrajn. Dawn l-imġibiet jissejhū disturbi tal-kontroll tal-impulsi u jistgħu jinkludu logħob tal-ażopard patologiku, ikel jew infiżżejjed, waħma sesswali kbira u mhux normali jew tinkwieta minħabba żieda fil-ħsibijiet jew hsus sesswali. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jirrevedi t-trattamenti li qed tingħata.

It-tabib tiegħek jista' jagħmel xi testijiet tal-laboratorju regolari waqt kura fit-tul b'Corbila.

Jekk għandek bżonn tagħmel operazzjoni, jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek li qed tuża Corbila.

Corbila mhux irrakkomandat biex jintuża għall-kura ta' sintomi ekstrapiramidali (eż. movimenti involontarji, roghda, rigidità tal-muskoli u kontrazzjonijiet tal-muskoli) ikkawżati minn medicini oħra.

Tfal u adolexxenti

Esperjenza b'Corbila f'pazjenti taht 18-il sena hija limitata. Għalhekk, l-użu ta' Corbila fit-tfal jew fl-adolexxenti mhux irrakkomandat.

Medicini oħra u Corbila

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħad-dan u l-ahħar jew tista' tieħu xi medicini oħra.

Tihux Corbilta jekk qed tieħu ċertu medicini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO).

Corbilta jista' jžid l-effetti u l-effetti sekondarji ta' xi medicini. Dawn jinkludu:

- medicini wżati ghall-kura tad-depressjoni bħal moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, venlafaxine u paroxetine
- rimiterole u isoprenaline, użati ghall-kura ta' mard respiratorju
- adrenaline, użat ghall-reazzjonijiet allergiči severi
- noradrenaline, dopamine u dobutamine, użati ghall-kura ta' mard tal-qalb u pressjoni tad-demm baxxa
- alpha-methyldopa, użat ghall-kura ta' pressjoni tad-demm għolja
- apomorphine, li jintuża ghall-kura tal-marda ta' Parkinson.

L-effetti ta' Corbilta jistgħu jiġu mdghajjfa minn ċertu medicini. Dawn jinkludu:

- antagonisti ta' dopamine użati ghall-kura ta' disturbi mentali, tqalligh u rimettar
- phenytoin, użat biex jipprevjeni konvulzjonijiet
- papaverine, użat biex jirrilassa l-muskoli.

Corbilta jista' jagħmlila aktar diffiċli biex inti tiddigerixxi l-ħadid. Għalhekk, tieħux Corbilta u supplimenti tal-ħadid fl-istess hin. Wara li tieħu wieħed minnhom, stenna mill-inqas 2 sa 3 sīgħat qabel ma tieħu l-ieħor.

Corbilta ma' ikel u xorġ

Corbilta jista' jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel.

Għal xi pazjenti, Corbilta jista' ma jiġix assorbit sew jekk jittieħed ma', jew ffit wara li jittieħed ikel li fih hafna proteini (bħal laham, ħut, prodotti mill-ħalib, żerriegħha u lewż). Kellem lit-tabib tiegħek jekk taħseb li dan jghodd għalik.

Tqala, treddiġ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbijja, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

M'għandekx tredda' waqt kura b'Corbilta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Corbilta jista' jbxaxxi l-pressjoni tad-demm tiegħek, li jista' jġagħlekk thossock mifxul jew sturdut. Għalhekk, oqghod attent hafna meta ssuq jew meta tuża xi ghoddha jew magni.

Jekk thossock imħeddel hafna, jew jekk xi kultant issib ruhek torqod f'daqqa wahda, stenna sakemm terġa thossock imqajjem sewwa qabel ma ssuq jew tagħmel kull haġa oħra li teħtieg li tkun vigilanti. Inkella, tista' tpoġġi lilek innifsek jew lil oħrajn f'riskju ta' korrispondenzer serju jew ta' mewt.

Corbilta fih sucrose

Corbilta fih sucrose (1.2 mg/pillola). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal-ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

Din il-mediciċina fiha anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża massima rakkomandata kuljum, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tieħu Corbilta

Dejjem għandek tieħu din il-mediciċina skont il-parir eż-żarr tat-tiegħi. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikkollok xi dubju.

Għall-adulti u l-anzjani:

It-tabib tiegħek jghidlek eżatt kemm għandek tiehu pilloli ta' Corbilta kuljum.

- Il-pilloli mhux maħsuba biex jinqasmu jew jinkisru f'biċċiet iżgħar.
- Għandek tiehu pillola wahda biss kull darba.
- Skont kif tirrispondi għall-kura, it-tabib tiegħek jista' jissuġġerilek doža oħla jew akar baxxa.
- Jekk qed tiehu pilloli ta' Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg jew 150 mg/37.5 mg/200 mg, tihux aktar minn 10 pilloli kuljum.

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li l-effett ta' Corbilta huwa qawwi wisq jew dghajnejf wisq, jew jekk ikollok esperjenza ta' xi effetti sekondarji possibbli.

Biex tiftaħ il-flixkun għall-ewwel darba: iftaħ l-ġħatu, imbagħad ġħafas is-sigill b'subghajk il-kbir sakemm jinqata'. Ara stampa 1.



Jekk tieħu Corbilta aktar milli suppost

Jekk bi żball hadt pilloli Corbilta aktar milli suppost, kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek minnufih. F'każ ta' doża eċċessiva jiusta' jħossok konfuż jew aġitat, ir-rata tal-qalb tiegħek tista' tkun aktar bil-mod jew aktar mgħażżeġ minn normal jew jista' jkun hemm bidla fil-kulur tal-ġilda, għajnejn, ilsien jew awrina.

Jekk tinsa tieħu Corbilta

M'għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk ikun fadal aktar minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, u l-pillola li jmiss fil-ħin normali.

Jekk ikun fadal inqas minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, stenna siegħa, wara hu pillola oħra. Wara dan kompli bħas-soltu.

Dejjem ħalli mill-inqas siegħa bejn pilloli Corbilta, sabiex tevita effetti sekondarji possibbli.

Jekk tieqaf tieħu Corbilta

Tieqafx tieħu Corbilta sakemm ma jghidlekx hekk it-tabib tiegħek. F'każ bħal dan it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta l-mediċini kontra l-marda ta' Parkinson l-oħra tiegħek, speċjalment levodopa, biex tingħata kontroll suffiċċenti għas-sintomi tiegħek. Jekk twaqqaf it-teħid ta' Corbilta u ta' mediċini kontra l-marda ta' Parkinson oħra f'daqqa, dan jista' jirriżulta f'effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Hafna minn dawn l-effetti sekondarji jistgħu jitneħħew billi tiġi aġġustata d-doża.

Jekk waqt il-kura b'Corbilta ikollok esperjenza tas-sintomi li ġejjin, **kellem lit-tabib tiegħek minnufih:**

- Il-muskoli tiegħek jibbiesgħu ħafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikkollok tregħid, aġitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaġġel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Dawn jistgħu jkunu sintomi tas-sindrom newrolettiku malinn (NMS, reazzjoni severa u rari għall-mediciċini wżati għall-kura ta' disturbi tas-sistema nervuża centrali) jew rabdomijolisi (disturb tal-muskolu rari u sever).
- Reazzjoni allergika, s-sintomi għandu mnejn jinkludu urtikarja (ħorriqija), ħakk, raxx, nefha fil-wiċċċ, xufftejn, ilsien jew grizmejn. Dan jiġi jikkawża diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla'.

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- movimenti mhux ikkontrollati (diskajnejji)
- thossok imdardar (tqallih)
- l-awrina tibdel il-kulur u ssir kannella fl-ahmar bla effett hażin
- uġiġi fil-muskoli
- dijarea.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- thossok mifxul jew ikkollok haġġi minħabba pressjoni tad-demm baxxa, pressjoni għolja
- sintomi tal-marda ta' Parkinson imorru għal aġħar, sturdament, ngħas
- rimettar, uġiġi u skomdu addominali, ħruq ta' stonku, halq xott, stitikezza
- inabbiltà biex torqod, allucinazzjonijiet, konfużjoni, holm mhux normali (inkluż inkubi), għejja bidliet mentali – inkluż problemi bil-memorja, ansjetà u depressjoni (possibilment bi hsibijiet ta' suwiċidju)
- avvenimenti ta' mard tal-qalb jew tal-arterji (eż. uġiġi fis-sider), rata jew ritmu tal-qalb irregolari
- waqgħat aktar frekwenti
- qtugħi ta' nifs
- żjieda fl-gharaq, raxx
- buġħawwieg fil-muskoli, nefha fis-saqajn
- tara mċajpar
- anemija
- tnaqqis fl-aptit, tnaqqis fil-piż
- uġiġi ta' ras, uġiġi fil-ġoggi
- infezzjoni fl-apparat tal-awrina.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- attakk tal-qalb
- fsada fil-musrana
- bidliet fl-ġħadd ta' ċelluli tad-demm li jistgħu jwasslu għal fsada, testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali
- konvulżjonijiet
- thossok aġitat
- sintomi psikotici
- kolite (infjammazzjoni tal-musrana l-ħoxna)
- bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, gharaq)
- diffikultà biex tibla
- żamma tal-awrina.

Mhux magħrufa (ma tistax tingħata stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Xenqa għal doži kbar ta' Corbila aktar minn dawk mehtieġa biex jiġi kkontrollati sintomi motorji, magħrufa bhala sindrom ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine. Xi wħud mill-pazjenti jkollhom movimenti involontarji severi mhux normali (diskajnejji), bidliet fil-burdata jew effetti sekondarji oħra wara li jieħdu doži kbar ta' Corbila.

Kieni rrapportati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin:

- epatite (infjammazzjoni tal-fwied)
- ħakk.

Tista' tesperjenza l-effetti sekondarji li ġejjin:

- Nuqqas ta' hila li tirreżisti l-impuls li twettaq azzjoni li tista' tkun ta' hsara, li tista' tinkludi:
 - impuls qawwi għal-logħob tal-ażżejjad eċċessiv minkejja konsegwenzi personali u familjari serji
 - tibdil jew żieda fl-interess u l-imġiba sesswali li jħassbu ħafna lilek jew lill-oħrajn, pereżempju, kilba sesswali qawwija
 - xiri jew infiq eċċessivi u bla kontroll
 - ikel bl-addoċċ (tiekol porzjonijiet kbar ta' ikel f'hin qasir) jew ikel b'mod kompulsiv (tiekol ikel aktar min-normal u aktar milli teħtieg biex taqta' l-ġuħ).

Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza kwalunkwe waħda minn dawn l-imġibet; dan jiddiskuti modi kif jimmaniġġa jew inaqqsas s-sintomi tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tīgi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Corbilta

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintħahaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxun u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi ghall-ahħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqqi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għaddekk tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Corbilta

- Is-sustanzi attivi ta' Corbilta huma levodopa, carbidopa u entacapone.
- Kull pillola Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg fiha 50 mg ta' levodopa, 12.5 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.
- Is-sustanzi mhux attivi l-ohra fil-qalba tal-pillola huma croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize starch, mannitol (E421) u povidone (E1201).
- Is-sustanzi fil-kisja b'rīta huma glycerol (85 fil-mija) (E422), hypromellose, magnesium stearate, polysorbate 80, iron oxide aħmar (E172), sucrose, titanium dioxide (E171), u iron oxide isfar (E172).

Kif jidher Corbilta u l-kontenut tal-pakkett

Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg: pilloli miskija b'rīta, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn aħmar fil-kannella jew fil-griz, tondi, ibbuzzati u mmarkati b'“LCE 50” fuq naħha waħda.

Corbilta huwa disponibbli f'sitt daqsijiet ta' pakketti differenti (10, 30, 100, 130, 175 jew 250 pillola). Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Manifattur

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

България

ТП Сандоз
Тел.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
Τηλ: +30 210 2811712

España

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

France

Orion Corporation
Tél: +358 10 4261

Hrvatska

Sandoz d.o.o.
Tel. +385 1 2353 111

Lietuva

Orion Corporation
Tel. +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.
Tel.: +36 1 430 2890

Malta

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.
Tel: +31 (0)36 5241600

Norge

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Österreich

Sandoz GmbH
Tel: +43 5338 200 0

Polska

Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +351 21 924 19 19

România

S.C Sandoz S.R.L.
+40 21 407 51 60

Ireland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland
Orion Corporation
Sími: +358 10 4261

Italia
Sandoz S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 3494

Kύπρος
Sandoz GmbH
Τηλ: +43 5338 200 0

Latvija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika
Sandoz d.d. organizačná zložka
Tel: +421 2 48 200 600

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Corbilta 75 mg/18.75 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbipoda/entacapone

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'ghandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta
3. Kif għandek tieħu Corbilta
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Corbilta
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża

Corbilta fih tliet sustanzi attivi (levodopa, carbipoda u entacapone) f'pillola waħda miksija b'rita. Corbilta jintuża għall-kura tal-marda ta' Parkinson.

Il-marda ta' Parkinson hija kkawżata minn livelli baxxi ta' sustanza msejħha dopamine fil-mohħ. Levodopa jżid il-livell ta' dopamine u b'hekk inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Carbipoda u entacapone itejjbu l-effetti kontra l-marda ta' Parkinson ta' levodopa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta

Tiħux Corbilta jekk inti:

- allergiku għal levodopa, carbipoda jew entacapone, jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6)
- għandek glawkom ta' angolu dejjaq (disturb fl-ghajn)
- għandek tumur tal-glandola adrenali
- qed tieħu certu mediċini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO)
- qatt kellek sindrome newroletti mal-inn (NMS – dan huwa reazzjoni rari għall-mediċini użati fil-kura ta' disturb mentali)
- qatt kellek rabdomijolisi mhux trawmatika (disturb muskolari rari)
- għandek mard sever tal-fwied.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tieħu Corbilta jekk għandek jew qatt kellek:

- attakk tal-qalb jew xi mard iehor tal-qalb, inkluż arritmija tal-qalb, jew tal-kanali tad-demm
- ażżma jew xi marda oħra tal-pulmun
- problema fil-fwied, għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata
- mard relatati mal-kliewi jew mal-ormoni
- ulċeri fl-istonku jew konvulzjonijiet

- jekk ikollok dijarea għal tul ta' żmien kellem lit-tabib tiegħek minħabba li dan jista' jkun sinjal ta' infjammazzjoni tal-musrana
- kull forma ta' disturb mentali sever bhal psikosi
- glawkomha kronika ta' angolu wiesa', għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata u l-pressjoni ta' ġo ghajnejk jista' jkollha bżonn tiġi sorveljata.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu:

- antipsikotiċi (medicini wżati biex jikkuraw il-psikosi)
- medicina li tista' tnaqqas il-pressjoni tad-demm meta tqum minn siġġu jew sodda. Għandek tkun taf li Corbila jista' jagħmel dawn ir-reazzjonijiet aghar.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk waqt kura b'Corbila inti:

- tinnota li l-muskoli tiegħek jibbiesgħu hafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Jekk isehħ xi wieħed minn dawn, **Kellem lit-tabib tiegħek minnufih.**
- thossox depress, ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, jew tinnota bidliet mhux tas-soltu fl-imġiba tiegħek
- torqod f'daqqa, jew jekk thossox imħeddel hafna. Jekk dan isehħ, m'għandekx issuq jew tuża ghoddha jew magni (ara wkoll sezzjoni “Sewqan u thaddim ta' magni”).
- tinnota li wara li tibda tieħu Corbila jibdew movimenti mhux ikkontrollati jew dawn imorru għal aghar. Jekk isehħ dan, it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn ibiddel id-doża tal-medicina tiegħek kontra l-marda ta' Parkinson.
- ikollok esperjenza ta' dijarea: huwa rrakkomandat li tissorvelja l-piż tiegħek sabiex tevita l-potenzjal ta' telf ta' piżi eċċessiv
- ikollok esperjenza ta' anoressija progressiva, astenja (debbulizza, thossox bla saħħha) u tnaqqis fil-piż f'perijodu relativament qasir. Jekk isehħ dan, għandha tiġi kkunsidrata valutazzjoni medika generali, inkluż il-funzjoni tal-fwied.
- thoss li għandek bżonn tieqaf tuża Corbila, ara sezzjoni “Jekk tieqaf tieħu Corbila”.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/persuna li tieħu ħsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa sintomi bħal vizzju, li jwasslu għal xenqa ta' doži kbar ta' Corbila u medicini oħra użati fit-trattament tal-marda ta' Parkinson.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja/min jieħu ħsiebek jinnota li qed tiżviluppa xewqat jew kilbiet sabiex iġġib ruħek b'mod li mhux tas-soltu ġhalik jew jekk ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqa jew it-tentazzjoni li twettaq attivitajiet li jistgħu jkunu ta' ħsara ġħalik jew ghall-oħrajn. Dawn l-imġibiet jissejħu disturbi tal-kontroll tal-impulsi u jistgħu jinkludu logħob tal-ażopard patologiku, ikel jew infiżżejjed, waħma sesswali kbira u mhux normali jew tinkwieta minħabba żieda fil-ħsibijiet jew ħsus sesswali. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jirrevedi t-trattamenti li qed tingħata.

It-tabib tiegħek jista' jagħmel xi testijiet tal-laboratorju regolari waqt kura fit-tul b'Corbila.

Jekk għandek bżonn tagħmel operazzjoni, jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek li qed tuża Corbila.

Corbila mhux irrakkomandat biex jintuża għall-kura ta' sintomi ekstrapiramidali (eż. movimenti involontarji, roghda, rigidità tal-muskoli u kontrazzjonijiet tal-muskoli) ikkawżati minn medicini oħra.

Tfal u adolexxenti

Esperjenza b'Corbila f'pazjenti taħt 18-il sena hija limitata. Għalhekk, l-użu ta' Corbila fit-tfal jew fl-adolexxenti mhux irrakkomandat.

Medicini oħra u Corbila

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħad-dan dan l-ahħar jew tista' tieħu xi medicini oħra.

Tieħux Corbilta jekk qed tieħu ċertu medicini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO).

Corbilta jista' jžid l-effetti u l-effetti sekondarji ta' xi medicini. Dawn jinkludu:

- medicini wżati ghall-kura tad-depressjoni bħal moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, venlafaxine u paroxetine
- rimiterole u isoprenaline, użati ghall-kura ta' mard respiratorju
- adrenaline, użat ghall-reazzjonijiet allergiči severi
- noradrenaline, dopamine u dobutamine, użati ghall-kura ta' mard tal-qalb u pressjoni tad-demm baxxa
- alpha-methyldopa, użat ghall-kura ta' pressjoni tad-demm għolja
- apomorphine, li jintuża ghall-kura tal-marda ta' Parkinson.

L-effetti ta' Corbilta jistgħu jiġu mdghajjfa minn ċertu medicini. Dawn jinkludu:

- antagonisti ta' dopamine użati ghall-kura ta' disturbi mentali, tqalligh u rimettar
- phenytoin, użat biex jipprevjeni konvulzjonijiet
- papaverine, użat biex jirrilassa l-muskoli.

Corbilta jista' jagħmlila aktar diffiċli biex inti tiddigerixxi l-ħadid. Għalhekk, tieħux Corbilta u supplimenti tal-ħadid fl-istess hin. Wara li tieħu wieħed minnhom, stenna mill-inqas 2 sa 3 sīgħat qabel ma tieħu l-ieħor.

Corbilta ma' ikel u xorġ

Corbilta jista' jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel.

Għal xi pazjenti, Corbilta jista' ma jiġix assorbit sew jekk jittieħed ma', jew fit wara li jittieħed ikel li fih hafna proteini (bħal laham, ħut, prodotti mill-ħalib, żerriegħha u lewż). Kellem lit-tabib tiegħek jekk taħseb li dan jghodd għalik.

Tqala, treddiġħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbijja, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

M'għandekx tredda' waqt kura b'Corbilta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Corbilta jista' jbaxxi l-pressjoni tad-demm tiegħek, li jista' jgħaż-żejt tħossok mifxul jew sturdut. Għalhekk, oqghod attent hafna meta ssuq jew meta tuża xi ghoddha jew magni.

Jekk thossok imheddel hafna, jew jekk xi kultant issib ruhek torqod f'daqqa wahda, stenna sakemm terġa thossok imqajjem sewwa qabel ma ssuq jew tagħmel kull haġa oħra li teħtieg li tkun vigilanti. Inkella, tista' tpoġġi lilek innifsek jew lil oħrajn f'riskju ta' korrispondenzer serju jew ta' mewt.

Corbilta fih sucrose

Corbilta fih sucrose (1.4 mg/pillola). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal-ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

Din il-mediciċina fiha anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża massima rakkomandata kuljum, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tieħu Corbilta

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.


Għall-adulti u l-anzjani:

It-tabib tiegħek jghidlek eżatt kemm għandek tieħu pilloli ta' Corbilta kuljum.

- Il-pilloli mhux maħsuba biex jinqasmu jew jinkisru f'biċċiet iż-ġħar.
- Għandek tieħu pillola wahda biss kull darba.
- Skont kif tirrispondi ghall-kura, it-tabib tiegħek jista' jissuġġerilek doża oħla jew akar baxxa.
- Jekk qed tieħu pilloli ta' Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg jew 150 mg/37.5 mg/200 mg, tihux aktar minn 10 pilloli kuljum.

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li l-effett ta' Corbilta huwa qawwi wisq jew dghajnejf wisq, jew jekk ikollok esperjenza ta' xi effetti sekondarji possibbli.

Biex tiftah il-flixkun ghall-ewwel darba: iftaħ l-ġħatu, imbagħad ġħafas is-sigill b'subgħajk il-kbir sakemm jinqata'. Ara stampa 1.



Jekk tieħu Corbilta aktar milli suppost

Jekk bi żball ħadu pilloli Corbilta aktar milli suppost, kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek minnufih. F'każ ta' doża eċċessiva jista' jħossok konfuż jew agħitat, ir-rata tal-qalb tiegħek tista' tkun aktar bil-mod jew aktar mghaż-ġġa minn normal jew jista' jkun hemm bidla fil-kulur tal-ġilda, għajnejn, ilsien jew awrina.

Jekk tinsa tieħu Corbilta

M'għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk ikun fadal aktar minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, u l-pillola li jmiss fil-hin normali.

Jekk ikun fadal inqas minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, stenna siegħa, wara hu pillola oħra. Wara dan kompli bħas-soltu.

Dejjem halli mill-inqas siegħa bejn pilloli Corbilta, sabiex tevita effetti sekondarji possibbli.

Jekk tieqaf tieħu Corbilta

Tieqafx tieħu Corbilta sakemm ma jghidlekx hekk it-tabib tiegħek. F'każ bħal dan it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta l-mediċini kontra l-marda ta' Parkinson l-oħra tiegħek, speċjalment levodopa, biex tingħata kontroll suffiċjenti għas-sintomi tiegħek. Jekk twaqqaqit it-teħid ta' Corbilta u ta' mediċini kontra l-marda ta' Parkinson oħra f'daqqa, dan jista' jirriżulta f'effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Hafna minn dawn l-effetti sekondarji jistgħidu jitneħħew billi tigi aġġustata d-doża.

Jekk waqt il-kura b'Corbilia ikollok esperjenza tas-sintomi li ġejjin, **kellem lit-tabib tiegħek minnufih:**

- Il-muskoli tiegħek jibbiesgħu ħafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Dawn jistgħu jkunu sintomi tas-sindrome newrolettiku malinn (NMS, reazzjoni severa u rari ghall-mediciċini wżati ghall-kura ta' disturbi tas-sistema nervuża centrali) jew rabdomijolisi (disturb tal-muskolu rari u sever).
- Reazzjoni allergika, s-sintomi għandu mnejn jinkludu urtikarja (horriqja), ħakk, raxx, nefha fil-wiċċċ, xufftejn, ilsien jew grizmejn. Dan jista' jikkawża diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla'.

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- movimenti mhux ikkontrollati (diskajnejji)
- thossok imdardar (tqallih)
- l-awrina tibdel il-kulur u ssir kannella fl-ahmar bla effett ħażin
- uġiġ fil-muskoli
- dijarea.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- thossok mifxul jew ikollok ħass ħażin minħabba pressjoni tad-demm baxxa, pressjoni għolja
- sintomi tal-marda ta' Parkinson imorru għal aghar, sturdament, ngħas
- rimettar, uġiġ u skomdu addominali, hruq ta' stonku, halq xott, stitikezza
- inabbiltà biex torqod, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, holm mhux normali (inkluż inkubi), għejja
- bidliet mentali – inkluż problemi bil-memorja, ansjetà u depressjoni (possibilment bi ħsibijiet ta' suwiċidju)
- avvenimenti ta' mard tal-qalb jew tal-arterji (eż. uġiġ fis-sider), rata jew ritmu tal-qalb irregolari
- waqgħat aktar frekwenti
- qtugħi ta' nifs
- żjieda fl-gharaq, raxx
- bugħawwieg fil-muskoli, nefha fis-saqajn
- tara mċajpar
- anemija
- tnaqqis fl-apptit, tnaqqis fil-piż
- uġiġ ta' ras, uġiġ fil-ġogħi
- infezzjoni fl-apparat tal-awrina.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- attakk tal-qalb
- fsada fil-musrana
- bidliet fl-ġħadd ta' ċelluli tad-demm li jistgħu jwasslu għal fsada, testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali
- konvulżjonijiet
- thossok agitat
- sintomi psikotici
- kolite (infjammazzjoni tal-musrana l-ħoxna)
- bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, gharaq)
- diffikultà biex tibla
- żamma tal-awrina.

Mhux magħrufa (ma tistax tingħata stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Xenqa għal doži kbar ta' Corbilia aktar minn dawk meħtieġa biex jiġu kkontrollati sintomi motorji, magħrufa bhala sindrome ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine. Xi wħud mill-pazjenti jkollhom movimenti involontarji severi mhux normali (diskajnejji), bidliet fil-burdata jew effetti sekondarji ohra wara li jieħdu doži kbar ta' Corbilia.

Kienu rrapporati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin:

- epatite (infjammazzjoni tal-fwied)
- hakk.

Tista' tesperjenza l-effetti sekondarji li ġejjin:

- Nuqqas ta' hila li tirreżisti l-impuls li twettaq azzjoni li tista' tkun ta' hsara, li tista' jinkludi:
 - impuls qawwi għal-logħob tal-ażżejjad eċċessiv minkejja konsegwenzi personali u familjari serji
 - tibdil jew żieda fl-interess u l-imġiba sesswali li jhassbu ħafna lilek jew lill-oħrajn, pereżempju, kilba sesswali qawwija
 - xiri jew infiq eċċessivi u bla kontroll
 - ikel bl-addoċċ (tiekol porzjonijiet kbar ta' ikel f'hin qasir) jew ikel b'mod kompulsiv (tiekol ikel aktar min-normal u aktar milli teħtieg biex taqta' l-ġuħi).

Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza kwalunkwe waħda minn dawn l-imġibiet; dan jiddiskuti modi kif jimmaniġġa jew inaqqsas s-sintomi tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tigi pprovdu aktar informazzjoni dwar is-sigurta ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Corbitala

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintlaħhaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxun u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi ghall-ahħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott medicinali m'għandux bżonn hażna speċjali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu ghall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Corbitala

- Is-sustanzi attivi ta' Corbitala huma levodopa, carbidopa u entacapone.
- Kull pillola Corbitala 75 mg/18.75 mg/200 mg fiha 75 mg ta' levodopa, 18.75 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.
- Is-sustanzi mhux attivi l-ohra fil-qalba tal-pillola huma croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize starch, mannitol (E421) u povidone (E1201).
- Is-sustanzi fil-kisja b'rita huma glycerol (85 fil-mija) (E422), hypromellose, magnesium stearate, polysorbate 80, iron oxide aħmar (E172), sucrose u titanium dioxide (E171).

Kif jidher Corbitala u l-kontenut tal-pakkett

Corbitala 75 mg/18.75 mg/200 mg: pilloli ovali, ta' lewn aħmar fil-kannella čar, immarkati b'“LCE 75” fuq naħha waħda.

Pilloli Corbitala 75 mg/18.75 mg/200 mg huma disponibbli f'ħames daqsijiet ta' pakketti differenti (10, 30, 100, 130, jew 175 pillola).

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Manifattur

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

България

ТП Сандоз
Тел.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
Τηλ: +30 210 2811712

España

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

France

Orion Corporation
Tél: +358 10 4261

Hrvatska

Sandoz d.o.o.
Tel. +385 1 2353 111

Lietuva

Orion Corporation
Tel. +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.
Tel.: +36 1 430 2890

Malta

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.
Tel: +31 (0)36 5241600

Norge

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Österreich

Sandoz GmbH
Tel: +43 5338 200 0

Polska

Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +351 21 924 19 19

România

S.C Sandoz S.R.L.
+40 21 407 51 60

Ireland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland
Orion Corporation
Sími: +358 10 4261

Italia
Sandoz S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 3494

Kύπρος
Sandoz GmbH
Τηλ: +43 5338 200 0

Latvija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika
Sandoz d.d. organizačná zložka
Tel: +421 2 48 200 600

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Corbila 100 mg/25 mg/200 mg pilloli miksija b'rita levodopa/carbidopa/entacapone

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'ghandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inh Corbila u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbila
3. Kif għandek tieħu Corbila
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Corbila
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inh Corbila u għalxiex jintuża

Corbila fih tliet sustanzi attivi (levodopa, carbidopa u entacapone) f'pillola waħda miksija b'rita. Corbila jintuża għall-kura tal-marda ta' Parkinson.

Il-marda ta' Parkinson hija kkawżata minn livelli baxxi ta' sustanza msejħha dopamine fil-mohħ. Levodopa jżid il-livell ta' dopamine u b'hekk inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Carbidopa u entacapone itejjbu l-effetti kontra l-marda ta' Parkinson ta' levodopa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbila

Tiħux Corbila jekk inti:

- allergiku għal levodopa, carbidopa jew entacapone, jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6)
- għandek glawkom ta' angolu dejjaq (disturb fl-ghajn)
- għandek tumur tal-glandola adrenali
- qed tieħu certu mediċini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO)
- qatt kellek sindrome newrolettiu malinn (NMS – dan huwa reazzjoni rari għall-mediċini użati fil-kura ta' disturb mentali)
- qatt kellek rabdomijolisi mhux trawmatika (disturb muskolari rari)
- għandek mard sever tal-fwied.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Corbila jekk għandek jew qatt kellek:

- attakk tal-qalb jew xi mard iehor tal-qalb, inkluż arritmija tal-qalb, jew tal-kanali tad-demm
- ażżma jew xi marda oħra tal-pulmun
- problema fil-fwied, għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata
- mard relatati mal-kliewi jew mal-ormoni
- ulċeri fl-istonku jew konvulzjonijiet

- jekk ikollok dijarea għal tul ta' żmien kellem lit-tabib tiegħek minħabba li dan jista' jkun sinjal ta' infjammazzjoni tal-musrana
- kull forma ta' disturb mentali sever bhal psikosi
- glawkomha kronika ta' angolu wiesa', għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata u l-pressjoni ta' ġo ghajnejk jista' jkollha bżonn tiġi sorveljata.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu:

- antipsikotiċi (medicini wżati biex jikkuraw il-psikosi)
- medicina li tista' tnaqqas il-pressjoni tad-demm meta tqum minn siġġu jew sodda. Għandek tkun taf li Corbila jista' jagħmel dawn ir-reazzjonijiet aghar.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk waqt kura b'Corbila inti:

- tinnota li l-muskoli tiegħek jibbiesgħu hafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Jekk isehħ xi wieħed minn dawn, **Kellem lit-tabib tiegħek minnufih.**
- thossox depress, ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, jew tinnota bidliet mhux tas-soltu fl-imġiba tiegħek
- torqod f'daqqa, jew jekk thossox imħeddel hafna. Jekk dan isehħ, m'għandekx issuq jew tuża ghoddha jew magni (ara wkoll sezzjoni “Sewqan u thaddim ta' magni”).
- tinnota li wara li tibda tieħu Corbila jibdew movimenti mhux ikkontrollati jew dawn imorru għal aghar. Jekk isehħ dan, it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn ibiddel id-doża tal-medicina tiegħek kontra l-marda ta' Parkinson.
- ikollok esperjenza ta' dijarea: huwa rrakkomandat li tissorvelja l-piż tiegħek sabiex tevita l-potenzjal ta' telf ta' piżi eċċessiv
- ikollok esperjenza ta' anoressija progressiva, astenja (debbulizza, thossox bla saħħha) u tnaqqis fil-piż f'perijodu relativament qasir. Jekk isehħ dan, għandha tiġi kkunsidrata valutazzjoni medika generali, inkluż il-funzjoni tal-fwied.
- thoss li għandek bżonn tieqaf tuża Corbila, ara sezzjoni “Jekk tieqaf tieħu Corbila”.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/persuna li tieħu hsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa sintomi bħal vizzju, li jwasslu għal xenqa ta' doži kbar ta' Corbila u medicini oħra użati fit-trattament tal-marda ta' Parkinson.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja/min jieħu hsiebek jinnota li qed tiżviluppa xewqat jew kilbiet sabiex iġġib ruhekk b'mod li mhux tas-soltu ġhalik jew jekk ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqa jew it-tentazzjoni li twettaq attivitajiet li jistgħu jkunu ta' hsara ġħalik jew ghall-oħrajn. Dawn l-imġibiet jissejhū disturbi tal-kontroll tal-impulsi u jistgħu jinkludu logħob tal-ażopard patologiku, ikel jew infiżżejjed, wahma sesswali kbira u mhux normali jew tinkwieta minħabba żieda fil-ħsibijiet jew ħsus sesswali. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jirrevedi t-trattamenti li qed tingħata.

It-tabib tiegħek jista' jagħmel xi testijiet tal-laboratorju regolari waqt kura fit-tul b'Corbila.

Jekk għandek bżonn tagħmel operazzjoni, jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek li qed tuża Corbila.

Corbila mhux irrakkomandat biex jintuża għall-kura ta' sintomi ekstrapiramidali (eż. movimenti involontarji, roghda, rigidità tal-muskoli u kontrazzjonijiet tal-muskoli) ikkawżati minn medicini oħra.

Tfal u adolexxenti

Esperjenza b'Corbila f'pazjenti taht 18-il sena hija limitata. Għalhekk, l-użu ta' Corbila fit-tfal jew fl-adolexxenti mhux irrakkomandat.

Medicini oħra u Corbila

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħad-dan dan l-ahħar jew tista' tieħu xi medicini oħra.

Tihux Corbilta jekk qed tieħu ċertu medicini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO).

Corbilta jista' jžid l-effetti u l-effetti sekondarji ta' xi medicini. Dawn jinkludu:

- medicini wżati ghall-kura tad-depressjoni bħal moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, venlafaxine u paroxetine
- rimiterole u isoprenaline, użati ghall-kura ta' mard respiratorju
- adrenaline, użat ghall-reazzjonijiet allergiči severi
- noradrenaline, dopamine u dobutamine, użati ghall-kura ta' mard tal-qalb u pressjoni tad-demm baxxa
- alpha-methyldopa, użat ghall-kura ta' pressjoni tad-demm għolja
- apomorphine, li jintuża ghall-kura tal-marda ta' Parkinson.

L-effetti ta' Corbilta jistgħu jiġu mdghajjfa minn ċertu medicini. Dawn jinkludu:

- antagonisti ta' dopamine użati ghall-kura ta' disturbi mentali, tqalligh u rimettar
- phenytoin, użat biex jipprevjeni konvulzjonijiet
- papaverine, użat biex jirrilassa l-muskoli.

Corbilta jista' jagħmlila aktar diffiċli biex inti tiddigerixxi l-ħadid. Għalhekk, tieħux Corbilta u supplimenti tal-ħadid fl-istess hin. Wara li tieħu wieħed minnhom, stenna mill-inqas 2 sa 3 sīgħat qabel ma tieħu l-ieħor.

Corbilta ma' ikel u xorġ

Corbilta jista' jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel.

Għal xi pazjenti, Corbilta jista' ma jiġix assorbit sew jekk jittieħed ma', jew fit wara li jittieħed ikel li fih hafna proteini (bħal laham, ħut, prodotti mill-ħalib, żerriegħha u lewż). Kellem lit-tabib tiegħek jekk taħseb li dan jghodd għalik.

Tqala, treddiġħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbijja, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

M'għandekx tredda' waqt kura b'Corbilta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Corbilta jista' jbxaxxi l-pressjoni tad-demm tiegħek, li jista' jġagħlekk thossock mifxul jew sturdut. Għalhekk, oqghod attent hafna meta ssuq jew meta tuża xi ghoddha jew magni.

Jekk thossock imheddel hafna, jew jekk xi kultant issib ruhek torqod f'daqqa wahda, stenna sakemm terġa thossock imqajjem sewwa qabel ma ssuq jew tagħmel kull haġa oħra li teħtieg li tkun vigilanti. Inkella, tista' tpoġġi lilek innifsek jew lil oħrajn f'riskju ta' korrispondenzer serju jew ta' mewt.

Corbilta fih sucrose

Corbilta fih sucrose (1.6 mg/pillola). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal-ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

Din il-mediciċina fiha anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża massima rakkomandata kuljum, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tieħu Corbilta

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.


Għall-adulti u l-anzjani:

It-tabib tiegħek jghidlek eżatt kemm għandek tieħu pilloli ta' Corbilta kuljum.

- Il-pilloli mhux maħsuba biex jinqasmu jew jinkisru f'biċċiet iżgħar.
- Għandek tieħu pillola wahda biss kull darba.
- Skont kif tirrispondi ghall-kura, it-tabib tiegħek jista' jissuġġerilek doża oħla jew akar baxxa.
- Jekk qed tieħu pilloli ta' Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg jew 150 mg/37.5 mg/200 mg, tihux aktar minn 10 pilloli kuljum.

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li l-effett ta' Corbilta huwa qawwi wisq jew dghajnejf wisq, jew jekk ikollok esperjenza ta' xi effetti sekondarji possibbli.

Biex tiftah il-flixkun ghall-ewwel darba: iftaħ l-ghatu, imbagħad għafas is-sigill b'subghajk il-kbir sakemm jinqata'. Ara stampa 1.



Jekk tieħu Corbilta aktar milli suppost

Jekk bi żball ħadu pilloli Corbilta aktar milli suppost, kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek minnufih. F'każ ta' doża eċċessiva jista' jħossok konfuż jew agitat, ir-rata tal-qalb tiegħek tista' tkun aktar bil-mod jew aktar mghaż-ġġala minn normal jew jista' jkun hemm bidla fil-kulur tal-ġilda, għajnejn, ilsien jew awrina.

Jekk tinsa tieħu Corbilta

M'għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk ikun fadal aktar minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, u l-pillola li jmiss fil-hin normali.

Jekk ikun fadal inqas minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, stenna siegħa, wara hu pillola oħra. Wara dan kompli bħas-soltu.

Dejjem halli mill-inqas siegħa bejn pilloli Corbilta, sabiex tevita effetti sekondarji possibbli.

Jekk tieqaf tieħu Corbilta

Tieqafx tieħu Corbilta sakemm ma jghidlekx hekk it-tabib tiegħek. F'każ bħal dan it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta l-mediċini kontra l-marda ta' Parkinson l-oħra tiegħek, speċjalment levodopa, biex tingħata kontroll suffiċjenti għas-sintomi tiegħek. Jekk twaqqaqit it-teħid ta' Corbilta u ta' mediċini kontra l-marda ta' Parkinson oħra f'daqqa, dan jista' jirriżulta f'effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Hafna minn dawn l-effetti sekondarji jistgħidu jitneħħew billi tigi aġġustata d-doża.

Jekk waqt il-kura b'Corbilia ikollok esperjenza tas-sintomi li ġejjin, **kellem lit-tabib tiegħek minnufih:**

- Il-muskoli tiegħek jibbiesgħu ħafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Dawn jistgħu jkunu sintomi tas-sindrome newrolettiku malinn (NMS, reazzjoni severa u rari ghall-mediciċini wżati ghall-kura ta' disturbi tas-sistema nervuża centrali) jew rabdomijolisi (disturb tal-muskolu rari u sever).
- Reazzjoni allergika, s-sintomi għandu mnejn jinkludu urtikarja (horriqja), ħakk, raxx, nefha fil-wiċċċ, xufftejn, ilsien jew grizmejn. Dan jista' jikkawża diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla'.

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- movimenti mhux ikkontrollati (diskajnejji)
- thossok imdardar (tqallih)
- l-awrina tibdel il-kulur u ssir kannella fl-ahmar bla effett hażin
- uġiġi fil-muskoli
- dijarea.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- thossok mifxul jew ikollok haqq minħabba pressjoni tad-demm baxxa, pressjoni għolja
- sintomi tal-marda ta' Parkinson imorru għal aghar, sturdament, ngħas
- rimettar, uġiġi u skomdu addominali, hruq ta' stonku, halq xott, stitikezza
- inabbiltà biex torqod, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, holm mhux normali (inkluż inkubi), għejja
- bidliet mentali – inkluż problemi bil-memorja, ansjetà u depressjoni (possibilment bi ħsibijiet ta' suwiċidju)
- avvenimenti ta' mard tal-qalb jew tal-arterji (eż. uġiġi fis-sider), rata jew ritmu tal-qalb irregolari
- waqgħat aktar frekwenti
- qtugħi ta' nifs
- żjieda fl-gharaq, raxx
- bugħawwieg fil-muskoli, nefha fis-saqajn
- tara mċajpar
- anemija
- tnaqqis fl-apptit, tnaqqis fil-piż
- uġiġi ta' ras, uġiġi fil-ġogħi
- infezzjoni fl-apparat tal-awrina.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- attakk tal-qalb
- fsada fil-musrana
- bidliet fl-ġħadd ta' ċelluli tad-demm li jistgħu jwasslu għal fsada, testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali
- konvulżjonijiet
- thossok agitat
- sintomi psikotici
- kolite (infjammazzjoni tal-musrana l-ħoxna)
- bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, gharaq)
- diffikultà biex tibla
- żamma tal-awrina.

Mhux magħrufa (ma tistax tingħata stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Xenqa għal doži kbar ta' Corbilia aktar minn dawk meħtieġa biex jiġi kkontrollati sintomi motorji, magħrufa bhala sindrome ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine. Xi wħud mill-pazjenti jkollhom movimenti involontarji severi mhux normali (diskajnejji), bidliet fil-burdata jew effetti sekondarji ohra wara li jieħdu doži kbar ta' Corbilia.

Kienu rrapporati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin:

- epatite (infjammazzjoni tal-fwied)
- hakk.

Tista' tesperjenza l-effetti sekondarji li ġejjin:

- Nuqqas ta' hila li tirreżisti l-impuls li twettaq azzjoni li tista' tkun ta' hsara, li tista' jinkludi:
 - impuls qawwi għal-logħob tal-ażżejjad eċċessiv minkejja konsegwenzi personali u familjari serji
 - tibdil jew żieda fl-interess u l-imġiba sesswali li jhassbu ħafna lilek jew lill-oħrajn, pereżempju, kilba sesswali qawwija
 - xiri jew infiq eċċessivi u bla kontroll
 - ikel bl-addoċċ (tiekol porzjonijiet kbar ta' ikel f'hin qasir) jew ikel b'mod kompulsiv (tiekol ikel aktar min-normal u aktar milli teħtieg biex taqta' l-ġuħ).

Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza kwalunkwe waħda minn dawn l-imġibiet; dan jiddiskuti modi kif jimmaniġġa jew inaqqsas s-sintomi tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tigi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Corbitala

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintlaħhaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxun u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi ghall-ahħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott medicinali m'għandux bżonn hażna speċjali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu ghall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Corbitala

- Is-sustanzi attivi ta' Corbitala huma levodopa, carbidopa u entacapone.
- Kull pillola Corbitala 100 mg/25 mg/200 mg fiha 100 mg ta' levodopa, 25 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.
- Is-sustanzi mhux attivi l-ohra fil-qalba tal-pillola huma croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize starch, mannitol (E421) u povidone (E1201).
- Is-sustanzi fil-kisja b'rita huma glycerol (85 fil-mija) (E422), hypromellose, magnesium stearate, polysorbate 80, iron oxide aħmar (E172), sucrose, titanium dioxide (E171), u iron oxide isfar (E172).

Kif jidher Corbitala u l-kontenut tal-pakkett

Corbitala 100 mg/25 mg/200 mg: pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn aħmar fil-kannella jew fil-griz, ovali u mmarkati b’ “LCE 100” fuq naħha waħda.

Corbitala huwa disponibbli f'sitt daqsijiet ta' pakketti differenti (10, 30, 100, 130, 175 jew 250 pillola). Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Manifattur

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

България

ТП Сандоз
Тел.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
Τηλ: +30 210 2811712

España

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

France

Orion Corporation
Tél: +358 10 4261

Hrvatska

Sandoz d.o.o.
Tel. +385 1 2353 111

Lietuva

Orion Corporation
Tel. +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.
Tel.: +36 1 430 2890

Malta

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.
Tel: +31 (0)36 5241600

Norge

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Österreich

Sandoz GmbH
Tel: +43 5338 200 0

Polska

Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +351 21 924 19 19

România

S.C Sandoz S.R.L.
+40 21 407 51 60

Ireland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland
Orion Corporation
Sími: +358 10 4261

Italia
Sandoz S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 3494

Kύπρος
Sandoz GmbH
Τηλ: +43 5338 200 0

Latvija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika
Sandoz d.d. organizačná zložka
Tel: +421 2 48 200 600

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Corbilta 125 mg/31.25 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'ghandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta
3. Kif għandek tieħu Corbilta
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Corbilta
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża

Corbilta fih tliet sustanzi attivi (levodopa, carbidopa u entacapone) f'pillola waħda miksija b'rita. Corbilta jintuża għall-kura tal-marda ta' Parkinson.

Il-marda ta' Parkinson hija kkawżata minn livelli baxxi ta' sustanza msejħha dopamine fil-mohħ. Levodopa jżid il-livell ta' dopamine u b'hekk inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Carbidopa u entacapone itejjbu l-effetti kontra l-marda ta' Parkinson ta' levodopa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta

Tiħux Corbilta jekk inti:

- allergiku għal levodopa, carbidopa jew entacapone, jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6)
- għandek glawkom ta' angolu dejjaq (disturb fl-ghajn)
- għandek tumur tal-glandola adrenal
- qed tieħu certu mediċini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO)
- qatt kellek sindrome newrolettiu malinn (NMS – dan huwa reazzjoni rari għall-mediċini użati fil-kura ta' disturb mentali)
- qatt kellek rabdomijolisi mhux trawmatika (disturb muskolari rari)
- għandek mard sever tal-fwied.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tieħu Corbilta jekk għandek jew qatt kellek:

- attakk tal-qalb jew xi mard iehor tal-qalb, inkluż arritmija tal-qalb, jew tal-kanali tad-demm
- ażżma jew xi marda oħra tal-pulmun
- problema fil-fwied, għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata
- mard relatati mal-kliewi jew mal-ormoni
- ulċeri fl-istonku jew konvulzjonijiet

- jekk ikollok dijarea għal tul ta' żmien kellem lit-tabib tiegħek minħabba li dan jista' jkun sinjal ta' infjammazzjoni tal-musrana
- kull forma ta' disturb mentali sever bhal psikosi
- glawkomha kronika ta' angolu wiesa', għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata u l-pressjoni ta' ġo ghajnejk jista' jkollha bżonn tiġi sorveljata.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu:

- antipsikotiċi (medicini wżati biex jikkuraw il-psikosi)
- medicina li tista' tnaqqas il-pressjoni tad-demm meta tqum minn siġġu jew sodda. Għandek tkun taf li Corbila jista' jagħmel dawn ir-reazzjonijiet aghar.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk waqt kura b'Corbila inti:

- tinnota li l-muskoli tiegħek jibbiesgħu hafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Jekk isehħ xi wieħed minn dawn, **Kellem lit-tabib tiegħek minnufih.**
- thossox depress, ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, jew tinnota bidliet mhux tas-soltu fl-imġiba tiegħek
- torqod f'daqqa, jew jekk thossox imħeddel hafna. Jekk dan isehħ, m'għandekx issuq jew tuża ghoddha jew magni (ara wkoll sezzjoni “Sewqan u thaddim ta' magni”).
- tinnota li wara li tibda tieħu Corbila jibdew movimenti mhux ikkontrollati jew dawn imorru għal aghar. Jekk isehħ dan, it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn ibiddel id-doża tal-medicina tiegħek kontra l-marda ta' Parkinson.
- ikollok esperjenza ta' dijarea: huwa rrakkomandat li tissorvelja l-piż tiegħek sabiex tevita l-potenzjal ta' telf ta' piżi eċċessiv
- ikollok esperjenza ta' anoressija progressiva, astenja (debbulizza, thossox bla saħħha) u tnaqqis fil-piż f'perijodu relativament qasir. Jekk isehħ dan, għandha tiġi kkunsidrata valutazzjoni medika generali, inkluż il-funzjoni tal-fwied.
- thoss li għandek bżonn tieqaf tuża Corbila, ara sezzjoni “Jekk tieqaf tieħu Corbila”.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/persuna li tieħu ħsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa sintomi bħal vizzju, li jwasslu għal xenqa ta' doži kbar ta' Corbila u medicini oħra użati fit-trattament tal-marda ta' Parkinson.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja/min jieħu ħsiebek jinnota li qed tiżviluppa xewqat jew kilbiet sabiex iġġib ruħek b'mod li mhux tas-soltu ġhalik jew jekk ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqa jew it-tentazzjoni li twettaq attivitajiet li jistgħu jkunu ta' ħsara ġħalik jew ghall-oħrajn. Dawn l-imġibiet jissejħu disturbi tal-kontroll tal-impulsi u jistgħu jinkludu logħob tal-ażopard patologiku, ikel jew infiżżejjed, wahma sesswali kbira u mhux normali jew tinkwieta minħabba żieda fil-ħsibijiet jew ħsus sesswali. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jirrevedi t-trattamenti li qed tingħata.

It-tabib tiegħek jista' jagħmel xi testijiet tal-laboratorju regolari waqt kura fit-tul b'Corbila.

Jekk għandek bżonn tagħmel operazzjoni, jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek li qed tuża Corbila.

Corbila mhux irrakkomandat biex jintuża għall-kura ta' sintomi ekstrapiramidali (eż. movimenti involontarji, roghda, rigidità tal-muskoli u kontrazzjonijiet tal-muskoli) ikkawżati minn medicini oħra.

Tfal u adolexxenti

Esperjenza b'Corbila f'pazjenti taħt 18-il sena hija limitata. Għalhekk, l-użu ta' Corbila fit-tfal jew fl-adolexxenti mhux irrakkomandat.

Medicini oħra u Corbila

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħad-dan dan l-ahħar jew tista' tieħu xi medicini oħra.

Tihux Corbilta jekk qed tieħu ċertu medicini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO).

Corbilta jista' jžid l-effetti u l-effetti sekondarji ta' xi medicini. Dawn jinkludu:

- medicini wżati ghall-kura tad-depressjoni bħal moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, venlafaxine u paroxetine
- rimiterole u isoprenaline, użati ghall-kura ta' mard respiratorju
- adrenaline, użat ghall-reazzjonijiet allergiči severi
- noradrenaline, dopamine u dobutamine, użati ghall-kura ta' mard tal-qalb u pressjoni tad-demm baxxa
- alpha-methyldopa, użat ghall-kura ta' pressjoni tad-demm għolja
- apomorphine, li jintuża ghall-kura tal-marda ta' Parkinson.

L-effetti ta' Corbilta jistgħu jiġu mdghajjfa minn ċertu medicini. Dawn jinkludu:

- antagonisti ta' dopamine użati ghall-kura ta' disturbi mentali, tqalligh u rimettar
- phenytoin, użat biex jipprevjeni konvulzjonijiet
- papaverine, użat biex jirrilassa l-muskoli.

Corbilta jista' jagħmlila aktar diffiċli biex inti tiddigerixxi l-ħadid. Għalhekk, tieħux Corbilta u supplimenti tal-ħadid fl-istess hin. Wara li tieħu wieħed minnhom, stenna mill-inqas 2 sa 3 sīgħat qabel ma tieħu l-ieħor.

Corbilta ma' ikel u xorb

Corbilta jista' jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel.

Għal xi pazjenti, Corbilta jista' ma jiġix assorbit sew jekk jittieħed ma', jew fit wara li jittieħed ikel li fih hafna proteini (bħal laham, ħut, prodotti mill-ħalib, żerriegħha u lewż). Kellem lit-tabib tiegħek jekk taħseb li dan jghodd għalik.

Tqala, treddiġħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbijja, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

M'għandekx tredda' waqt kura b'Corbilta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Corbilta jista' jbxaxxi l-pressjoni tad-demm tiegħek, li jista' jġagħlekk thossock mifxul jew sturdut. Għalhekk, oqghod attent hafna meta ssuq jew meta tuża xi ghodda jew magni.

Jekk thossock imheddel hafna, jew jekk xi kultant issib ruhek torqod f'daqqa wahda, stenna sakemm terġa thossock imqajjem sewwa qabel ma ssuq jew tagħmel kull haġa oħra li teħtieg li tkun vigilanti. Inkella, tista' tpoġġi lilek innifsek jew lil oħrajn f'riskju ta' korrispondenzer serju jew ta' mewt.

Corbilta fih sucrose

Corbilta fih sucrose (1.6 mg/pillola). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal-ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

Din il-mediciċina fiha anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża massima rakkomandata kuljum, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tieħu Corbilta

Dejjem għandek tieħu din il-mediciċina skont il-parir eż-żarr tat-tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikkollok xi dubju.

Għall-adulti u l-anzjani:

It-tabib tiegħek jghidlek eż-żarr kemm għandek tiehu pilloli ta' Corbilta kuljum.

- Il-pilloli mhux maħsuba biex jinqasmu jew jinkisru f'biċċiet iżgħar.
- Għandek tiehu pillola wahda biss kull darba.
- Skont kif tirrispondi għall-kura, it-tabib tiegħek jista' jissuġġerilek doža oħla jew akar baxxa.
- Jekk qed tieħu pilloli ta' Corbilta 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg jew 150 mg/37.5 mg/200 mg, tihux aktar minn 10 pilloli kuljum.

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li l-effett ta' Corbilta huwa qawwi wisq jew dghajnejf wisq, jew jekk ikollok esperjenza ta' xi effetti sekondarji possibbli.

Biex tiftaħ il-flixkun għall-ewwel darba: iftaħ l-għatu, imbagħad ġħafas is-sigill b'subghajk il-kbir sakemm jinqata'. Ara stampa 1.



Jekk tieħu Corbilta aktar milli suppost

Jekk bi żball hadt pilloli Corbilta aktar milli suppost, kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek minnufih. F'każ ta' doža eċċessiva jiġi jaħossok konfuż jew aġitat, ir-rata tal-qalb tiegħek tista' tkun aktar bil-mod jew aktar mgħażżeġ minn normal jew jista' jkun hemm bidla fil-kulur tal-ġilda, għajnejn, ilsien jew awrina.

Jekk tinsa tieħu Corbilta

M'għandekx tieħu doža doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk ikun fadal aktar minn siegħa sad-doža li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, u l-pillola li jmiss fil-ħin normali.

Jekk ikun fadal inqas minn siegħa sad-doža li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, stenna siegħa, wara hu pillola oħra. Wara dan kompli bħas-soltu.

Dejjem ħalli mill-inqas siegħa bejn pilloli Corbilta, sabiex tevita effetti sekondarji possibbli.

Jekk tieqaf tieħu Corbilta

Tieqafx tieħu Corbilta sakemm ma jghidlekx hekk it-tabib tiegħek. F'każ bħal dan it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta l-mediċini kontra l-marda ta' Parkinson l-oħra tiegħek, speċjalment levodopa, biex tingħata kontroll suffiċċenti għas-sintomi tiegħek. Jekk twaqqaqit it-teħid ta' Corbilta u ta' mediċini kontra l-marda ta' Parkinson oħra f'daqqa, dan jista' jirriżulta f'effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Hafna minn dawn l-effetti sekondarji jistgħu jitneħħew billi tiġi aġġustata d-doža.

Jekk waqt il-kura b'Corbilta ikollok esperjenza tas-sintomi li ġejjin, **kellem lit-tabib tiegħek minnufih:**

- Il-muskoli tiegħek jibbiesgħu ħafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikkollok tregħid, aġitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaġġel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Dawn jistgħu jkunu sintomi tas-sindrom newrolettiku malinn (NMS, reazzjoni severa u rari għall-mediciċini wżati għall-kura ta' disturbi tas-sistema nervuża centrali) jew rabdomijolisi (disturb tal-muskolu rari u sever).
- Reazzjoni allergika, s-sintomi għandu mnejn jinkludu urtikarja (ħorriqija), ħakk, raxx, nefha fil-wiċċċ, xufftejn, ilsien jew grizmejn. Dan jiġi jikkawża diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla'.

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- movimenti mhux ikkontrollati (diskajnejji)
- thossok imdardar (tqallih)
- l-awrina tibdel il-kulur u ssir kannella fl-ahmar bla effett hażin
- uġiġi fil-muskoli
- dijarea.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- thossok mifxul jew ikkollok haġġi minħabba pressjoni tad-demm baxxa, pressjoni għolja
- sintomi tal-marda ta' Parkinson imorru għal aġħar, sturdament, ngħas
- rimettar, uġiġi u skomdu addominali, ħruq ta' stonku, halq xott, stitikezza
- inabbiltà biex torqod, allucinazzjonijiet, konfużjoni, holm mhux normali (inkluż inkubi), għejja bidliet mentali – inkluż problemi bil-memorja, ansjetà u depressjoni (possibilment bi hsibijiet ta' suwiċidju)
- avvenimenti ta' mard tal-qalb jew tal-arterji (eż. uġiġi fis-sider), rata jew ritmu tal-qalb irregolari
- waqghat aktar frekwenti
- qtugħi ta' nifs
- żjieda fl-gharaq, raxx
- buġħawwieg fil-muskoli, nefha fis-saqajn
- tara mċajpar
- anemija
- tnaqqis fl-aptit, tnaqqis fil-piż
- uġiġi ta' ras, uġiġi fil-ġoggi
- infezzjoni fl-apparat tal-awrina.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- attakk tal-qalb
- fsada fil-musrana
- bidliet fl-ġħadd ta' ċelluli tad-demm li jistgħu jwasslu għal fsada, testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali
- konvulżjonijiet
- thossok aġitat
- sintomi psikotici
- kolite (infjammazzjoni tal-musrana l-ħoxna)
- bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, gharaq)
- diffikultà biex tibla
- żamma tal-awrina.

Mhux magħrufa (ma tistax tingħata stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Xenqa għal doži kbar ta' Corbila aktar minn dawk mehtiegħa biex jiġi kkontrollati sintomi motorji, magħrufa bhala sindrom ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine. Xi wħud mill-pazjenti jkollhom movimenti involontarji severi mhux normali (diskajnejji), bidliet fil-burdata jew effetti sekondarji oħra wara li jieħdu doži kbar ta' Corbila.

Kieni rrapportati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin:

- epatite (infjammazzjoni tal-fwied)
- ħakk.

Tista' tesperjenza l-effetti sekondarji li ġejjin:

- Nuqqas ta' hila li tirreżisti l-impuls li twettaq azzjoni li tista' tkun ta' hsara, li tista' tinkludi:
 - impuls qawwi għal-logħob tal-ażżejjad eċċessiv minkejja konsegwenzi personali u familjari serji
 - tibdil jew żieda fl-interess u l-imġiba sesswali li jħassbu ħafna lilek jew lill-oħrajn, pereżempju, kilba sesswali qawwija
 - xiri jew infiq eċċessivi u bla kontroll
 - ikel bl-addoċċ (tiekol porzjonijiet kbar ta' ikel f'hin qasir) jew ikel b'mod kompulsiv (tiekol ikel aktar min-normal u aktar milli teħtieg biex taqta' l-ġuħ).

Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza kwalunkwe waħda minn dawn l-imġibet; dan jiddiskuti modi kif jimmaniġġa jew inaqqsas s-sintomi tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tīgi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Corbilta

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintħahaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxun u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi ghall-ahħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-draña jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għaddekk tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fih Corbilta

- Is-sustanzi attivi ta' Corbilta huma levodopa, carbidopa u entacapone.
- Kull pillola Corbilta 125 mg/31.25 mg/200 mg fiha 125 mg ta' levodopa, 31.25 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.
- Is-sustanzi mhux attivi l-ohra fil-qalba tal-pillola huma croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize starch, mannitol (E421) u povidone (E1201).
- Is-sustanzi fil-kisja b'rīta huma glycerol (85 fil-mija) (E422), hypromellose, magnesium stearate, polysorbate 80, iron oxide aħmar (E172), sucrose u titanium dioxide (E171).

Kif jidher Corbilta u l-kontenut tal-pakkett

Corbilta 125 mg/31.25 mg/200 mg: pilloli ovali, ta' lewn aħmar fil-kannella čar, immarkati b'“LCE 125” fuq naħha waħda.

Pilloli Corbilta 125 mg/31.25 mg/200 mg huma disponibbli f'hames daqsijiet ta' pakketti differenti (10, 30, 100, 130 jew 175 pillola). Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Manifattur

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

България

ТП Сандоз
Тел.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
Τηλ: +30 210 2811712

España

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

France

Orion Corporation
Tél: +358 10 4261

Hrvatska

Sandoz d.o.o.
Tel. +385 1 2353 111

Lietuva

Orion Corporation
Tel. +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.
Tel.: +36 1 430 2890

Malta

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.
Tel: +31 (0)36 5241600

Norge

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Österreich

Sandoz GmbH
Tel: +43 5338 200 0

Polska

Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +351 21 924 19 19

România

S.C Sandoz S.R.L.
+40 21 407 51 60

Ireland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland
Orion Corporation
Sími: +358 10 4261

Italia
Sandoz S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 3494

Kύπρος
Sandoz GmbH
Τηλ: +43 5338 200 0

Latvija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika
Sandoz d.d. organizačná zložka
Tel: +421 2 48 200 600

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Corbilta 150 mg/37.5 mg/200 mg pilloli miksija b'rita levodopa/carbipoda/entacapone

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'ghandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta
3. Kif għandek tieħu Corbilta
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Corbilta
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża

Corbilta fih tliet sustanzi attivi (levodopa, carbipoda u entacapone) f'pillola waħda miksija b'rita. Corbilta jintuża għall-kura tal-marda ta' Parkinson.

Il-marda ta' Parkinson hija kkawżata minn livelli baxxi ta' sustanza msejħha dopamine fil-mohħ. Levodopa jżid il-livell ta' dopamine u b'hekk inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Carbipoda u entacapone itejjbu l-effetti kontra l-marda ta' Parkinson ta' levodopa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta

Tiħux Corbilta jekk inti:

- allergiku għal levodopa, carbipoda jew entacapone, jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6)
- għandek glawkom ta' angolu dejjaq (disturb fl-ghajn)
- għandek tumur tal-glandola adrenal
- qed tieħu certu mediċini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO)
- qatt kellek sindrome newroletti mal-inn (NMS – dan huwa reazzjoni rari għall-mediċini użati fil-kura ta' disturb mentali)
- qatt kellek rabdomijolisi mhux trawmatika (disturb muskolari rari)
- għandek mard sever tal-fwied.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tieħu Corbilta jekk għandek jew qatt kellek:

- attakk tal-qalb jew xi mard iehor tal-qalb, inkluż arritmija tal-qalb, jew tal-kanali tad-demm
- ażżma jew xi marda oħra tal-pulmun
- problema fil-fwied, għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata
- mard relatati mal-kliewi jew mal-ormoni
- ulċeri fl-istonku jew konvulzjonijiet

- jekk ikollok dijarea għal tul ta' żmien kellem lit-tabib tiegħek minħabba li dan jista' jkun sinjal ta' infjammazzjoni tal-musrana
- kull forma ta' disturb mentali sever bhal psikosi
- glawkomha kronika ta' angolu wiesa', għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata u l-pressjoni ta' ġo ghajnejk jista' jkollha bżonn tiġi sorveljata.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu:

- antipsikotiċi (medicini wżati biex jikkuraw il-psikosi)
- medicina li tista' tnaqqas il-pressjoni tad-demm meta tqum minn siġġu jew sodda. Għandek tkun taf li Corbila jista' jagħmel dawn ir-reazzjonijiet aghar.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk waqt kura b'Corbila inti:

- tinnota li l-muskoli tiegħek jibbiesgħu hafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Jekk isehħ xi wieħed minn dawn, **Kellem lit-tabib tiegħek minnufih.**
- thossox depress, ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, jew tinnota bidliet mhux tas-soltu fl-imġiba tiegħek
- torqod f'daqqa, jew jekk thossox imħeddel hafna. Jekk dan isehħ, m'għandekx issuq jew tuża ghoddha jew magni (ara wkoll sezzjoni “Sewqan u thaddim ta' magni”).
- tinnota li wara li tibda tieħu Corbila jibdew movimenti mhux ikkontrollati jew dawn imorru għal aghar. Jekk isehħ dan, it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn ibiddel id-doża tal-medicina tiegħek kontra l-marda ta' Parkinson.
- ikollok esperjenza ta' dijarea: huwa rrakkomandat li tissorvelja l-piż tiegħek sabiex tevita l-potenzjal ta' telf ta' piżi eċċessiv
- ikollok esperjenza ta' anoressija progressiva, astenja (debbulizza, thossox bla saħħha) u tnaqqis fil-piż f'perijodu relativament qasir. Jekk isehħ dan, għandha tiġi kkunsidrata valutazzjoni medika generali, inkluż il-funzjoni tal-fwied.
- thoss li għandek bżonn tieqaf tuża Corbila, ara sezzjoni “Jekk tieqaf tieħu Corbila”.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/persuna li tieħu ħsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa sintomi bħal vizzju, li jwasslu għal xenqa ta' doži kbar ta' Corbila u medicini oħra użati fit-trattament tal-marda ta' Parkinson.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja/min jieħu ħsiebek jinnota li qed tiżviluppa xewqat jew kilbiet sabiex iġġib ruhekk b'mod li mhux tas-soltu ġhalik jew jekk ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqa jew it-tentazzjoni li twettaq attivitajiet li jistgħu jkunu ta' ħsara ġħalik jew ghall-oħrajn. Dawn l-imġibiet jissejhū disturbi tal-kontroll tal-impulsi u jistgħu jinkludu logħob tal-ażopard patologiku, ikel jew infiżżejjed, wahma sesswali kbira u mhux normali jew tinkwieta minħabba żieda fil-ħsibijiet jew ħsus sesswali. **It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jirrevedi t-trattamenti li qed tingħata.**

It-tabib tiegħek jista' jagħmel xi testijiet tal-laboratorju regolari waqt kura fit-tul b'Corbila.

Jekk għandek bżonn tagħmel operazzjoni, jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek li qed tuża Corbila.

Corbila mhux irrakkomandat biex jintuża ġħall-kura ta' sintomi ekstrapiramidali (eż. movimenti involontarji, roghda, rigidità tal-muskoli u kontrazzjonijiet tal-muskoli) ikkawżati minn medicini oħra.

Tfal u adolexxenti

Esperjenza b'Corbila f'pazjenti taht 18-il sena hija limitata. Għalhekk, l-użu ta' Corbila fit-tfal jew fl-adolexxenti mhux irrakkomandat.

Medicini oħra u Corbila

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħad-dan dan l-ahħar jew tista' tieħu xi medicini oħra.

Tieħux Corbilta jekk qed tieħu ċertu medicini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO).

Corbilta jista' jžid l-effetti u l-effetti sekondarji ta' xi medicini. Dawn jinkludu:

- medicini wżati ghall-kura tad-depressjoni bħal moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, venlafaxine u paroxetine
- rimiterole u isoprenaline, użati ghall-kura ta' mard respiratorju
- adrenaline, użat ghall-reazzjonijiet allergiči severi
- noradrenaline, dopamine u dobutamine, użati ghall-kura ta' mard tal-qalb u pressjoni tad-demm baxxa
- alpha-methyldopa, użat ghall-kura ta' pressjoni tad-demm għolja
- apomorphine, li jintuża ghall-kura tal-marda ta' Parkinson.

L-effetti ta' Corbilta jistgħu jiġu mdghajjfa minn ċertu medicini. Dawn jinkludu:

- antagonisti ta' dopamine użati ghall-kura ta' disturbi mentali, tqalligh u rimettar
- phenytoin, użat biex jipprevjeni konvulzjonijiet
- papaverine, użat biex jirrilassa l-muskoli.

Corbilta jista' jagħmlila aktar diffiċli biex inti tiddigerixxi l-ħadid. Għalhekk, tieħux Corbilta u supplimenti tal-ħadid fl-istess hin. Wara li tieħu wieħed minnhom, stenna mill-inqas 2 sa 3 sīgħat qabel ma tieħu l-ieħor.

Corbilta ma' ikel u xorġ

Corbilta jista' jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel.

Għal xi pazjenti, Corbilta jista' ma jiġix assorbit sew jekk jittieħed ma', jew fiti wara li jittieħed ikel li fih hafna proteini (bħal laħam, ħut, prodotti mill-ħalib, żerriegħha u lewż). Kellem lit-tabib tiegħek jekk taħseb li dan jghodd għalik.

Tqala, treddiġħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbijja, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-medicina.

M'għandekx tredda' waqt kura b'Corbilta.

Sewqan u thaddim ta' magni

Corbilta jista' jbaxxi l-pressjoni tad-demm tiegħek, li jista' jgħaż-żejt tħossok mifxul jew sturdut. Għalhekk, oqghod attent hafna meta ssuq jew meta tuża xi ghoddha jew magni.

Jekk thossok imheddel hafna, jew jekk xi kultant issib ruhek torqod f'daqqa wahda, stenna sakemm terġa thossok imqajjem sewwa qabel ma ssuq jew tagħmel kull haġa oħra li teħtieg li tkun vigilanti. Inkella, tista' tpoġgi lilek innifsek jew lil oħrajn f'riskju ta' korrispondenzer serju jew ta' mewt.

Corbilta fih sucrose u s-sodium

Corbilta fih sucrose (1.9 mg/pillola). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal-ċerti tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-medicina.

Din il-medicina fiha 2.6 mg sodium (il-komponent principali tal-melh tat-tisjir/li jintuża mal-ikel) f'kull pillola. Id-doża massima rakkomandata ta' kuljum (10 pilloli) fiha 26 mg ta' sodium. Dan huwa ekwivalenti għal 1.3% tal-ammont massimu rakkomandat ta' sodium li għandu jittieħed kuljum mad-dieta minn adult.

3. Kif għandek tieħu Corbilta

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.


Għall-adulti u l-anzjani:

It-tabib tiegħek jghidlek eżatt kemm għandek tieħu pilloli ta' Corbila kuljum.

- Il-pilloli mhux maħsuba biex jinqasmu jew jinkisru f'biċċiet iżgħar.
- Għandek tieħu pillola waħda biss kull darba.
- Skont kif tirrispondi għall-kura, it-tabib tiegħek jista' jiġi jissuġġerilek doža ogħla jew akar baxxa.
- Jekk qed tieħu pilloli ta' Corbila 50 mg/12.5 mg/200 mg, 75 mg/18.75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg jew 150 mg/37.5 mg/200 mg, tihux aktar minn 10 pilloli kuljum.

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li l-effett ta' Corbila huwa qawwi wisq jew dghajnejf wisq, jew jekk ikollok esperjenza ta' xi effetti sekondarji possibbli.

Biex tiftaħ il-flixkun għall-ewwel darba: iftaħ l-għatu, imbagħad għafas is-sigill b'subgħajk il-kbir sakemm jinqata'. Ara stampa 1.



Jekk tieħu Corbila aktar milli suppost

Jekk bi żball ġadu pilloli Corbila aktar milli suppost, kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek minnufih. F'każ ta' doža eċċessiva jista' jħossok konfuż jew aġitat, ir-rata tal-qalb tiegħek tista' tkun aktar bil-mod jew aktar mgħażżeġla minn normal jew jista' jkun hemm bidla fil-kulur tal-ġilda, għajnejn, ilsien jew awrina.

Jekk tinsa tieħu Corbila

M'għandekx tieħu doža doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk ikun fadal aktar minn siegħa sad-doža li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, u l-pillola li jmiss fil-ħin normali.

Jekk ikun fadal inqas minn siegħa sad-doža li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, stenna siegħa, wara hu pillola ohra. Wara dan kompli bhas-soltu.

Dejjem ħalli mill-inqas siegħa bejn pilloli Corbila, sabiex tevita effetti sekondarji possibbli.

Jekk tieqaf tieħu Corbila

Tieqafx tieħu Corbila sakemm ma jgħidlekx hekk it-tabib tiegħek. F'każ bħal dan it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta l-mediċina kontra l-marda ta' Parkinson l-oħra tiegħek, speċjalment levodopa, biex tingħata kontroll suffiċċenti għas-sintomi tiegħek. Jekk twaqqaqit it-teħid ta' Corbila u ta' mediċina kontra l-marda ta' Parkinson oħra f'daqqa, dan jista' jirriżulta f'effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Hafna minn dawn l-effetti sekondarji jistgħu jitneħħew billi tiġi aġġustata d-doža.

Jekk waqt il-kura b'Corbilia ikollok esperjenza tas-sintomi li ġejjin, **kellem lit-tabib tiegħek minnufih:**

- Il-muskoli tiegħek jibbiesgħu ħafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Dawn jistgħu jkunu sintomi tas-sindrome newrolettiku malinn (NMS, reazzjoni severa u rari ghall-mediciċini wżati ghall-kura ta' disturbi tas-sistema nervuża centrali) jew rabdomijolisi (disturb tal-muskolu rari u sever).
- Reazzjoni allergika, s-sintomi għandu mnejn jinkludu urtikarja (horriqja), ħakk, raxx, nefha fil-wiċċċ, xufftejn, ilsien jew grizmejn. Dan jista' jikkawża diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla'.

Komuni ħafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- movimenti mhux ikkontrollati (diskajnejji)
- thossok imdardar (tqallih)
- l-awrina tibdel il-kulur u ssir kannella fl-ahmar bla effett hażin
- uġiġi fil-muskoli
- dijarea.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- thossok mifxul jew ikollok hass hażin minħabba pressjoni tad-demm baxxa, pressjoni għolja
- sintomi tal-marda ta' Parkinson imorru għal aghar, sturdament, ngħas
- rimettar, uġiġi u skomdu addominali, ħruq ta' stonku, halq xott, stitikezza
- inabbiltà biex torqod, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, holm mhux normali (inkluż inkubi), għejja
- bidliet mentali – inkluż problemi bil-memorja, ansjetà u depressjoni (possibilment bi ħsibijiet ta' suwiċidju)
- avvenimenti ta' mard tal-qalb jew tal-arterji (eż. uġiġi fis-sider), rata jew ritmu tal-qalb irregolari
- waqgħat aktar frekwenti
- qtugħi ta' nifs
- żjieda fl-gharaq, raxx
- bugħawwieg fil-muskoli, nefha fis-saqajn
- tara mċajpar
- anemija
- tnaqqis fl-apptit, tnaqqis fil-piż
- uġiġi ta' ras, uġiġi fil-ġogħi
- infezzjoni fl-apparat tal-awrina.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- attakk tal-qalb
- fsada fil-musrana
- bidliet fl-ġħadd ta' ċelluli tad-demm li jistgħu jwasslu għal fsada, testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali
- konvulżjonijiet
- thossok agitat
- sintomi psikotici
- kolite (infjammazzjoni tal-musrana l-ħoxna)
- bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, gharaq)
- diffikultà biex tibla
- żamma tal-awrina.

Mhux magħrufa (ma tistax tingħata stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Xenqa għal doži kbar ta' Corbilia aktar minn dawk meħtieġa biex jiġu kkontrollati sintomi motorji, magħrufa bhala sindrome ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine. Xi wħud mill-pazjenti jkollhom movimenti involontarji severi mhux normali (diskajnejji), bidliet fil-burdata jew effetti sekondarji ohra wara li jieħdu doži kbar ta' Corbilia.

Kienu rrapporati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin:

- epatite (infjammazzjoni tal-fwied)
- hakk.

Tista' tesperjenza l-effetti sekondarji li ęejjin:

- Nuqqas ta' hila li tirreżisti l-impuls li twettaq azzjoni li tista' tkun ta' hsara, li tista' jinkludi:
 - impuls qawwi għal-logħob tal-ażżejjad eċċessiv minkejja konsegwenzi personali u familjari serji
 - tibdil jew żieda fl-interess u l-imġiba sesswali li jhassbu ħafna lilek jew lill-oħrajn, pereżempju, kilba sesswali qawwija
 - xiri jew infiq eċċessivi u bla kontroll
 - ikel bl-addoċċ (tiekol porzjonijiet kbar ta' ikel f'hin qasir) jew ikel b'mod kompulsiv (tiekol ikel aktar min-normal u aktar milli teħtieg biex taqta' l-ġuħ).

Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza kwalunkwe waħda minn dawn l-imġibiet; dan jiddiskuti modi kif jimmaniġġa jew inaqqsas s-sintomi tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mniżzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tigi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Corbitala

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintlaħhaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxun u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi ghall-ahħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott medicinali m'għandux bżonn hażna speċjali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu ghall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Corbitala

- Is-sustanzi attivi ta' Corbitala huma levodopa, carbidopa u entacapone.
- Kull pillola Corbitala 150 mg/37.5 mg/200 mg fiha 150 mg ta' levodopa, 37.5 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.
- Is-sustanzi mhux attivi l-ohra fil-qalba tal-pillola huma croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize starch, mannitol (E421) u povidone (E1201).
- Is-sustanzi fil-kisja b'rita huma glycerol (85 fil-mija) (E 422), hypromellose, polysorbate 80, iron oxide ahmar (E 172), sucrose, titanium dioxide (E 171), u iron oxide isfar (E 172).

Kif jidher Corbitala u l-kontenut tal-pakkett

Corbitala 150 mg/37.5 mg/200 mg: pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ta' lewn ahmar fil-kannella jew fil-griż, b'forma ta' elissi mtawwla u mmarkati b'"LCE 150" fuq naħha waħda.

Corbitala huwa disponibbli f'sitt daqsijiet ta' pakketti differenti (10, 30, 100, 130, 175 jew 250 pillola). Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Manifattur

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

България

ТП Сандоз
Тел.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
Τηλ: +30 210 2811712

España

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

France

Orion Corporation
Tél: +358 10 4261

Hrvatska

Sandoz d.o.o.
Tel. +385 1 2353 111

Lietuva

Orion Corporation
Tel. +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.
Tel.: +36 1 430 2890

Malta

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.
Tel: +31 (0)36 5241600

Norge

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Österreich

Sandoz GmbH
Tel: +43 5338 200 0

Polska

Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +351 21 924 19 19

România

S.C Sandoz S.R.L.
+40 21 407 51 60

Ireland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland
Orion Corporation
Sími: +358 10 4261

Italia
Sandoz S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 3494

Kύπρος
Sandoz GmbH
Τηλ: +43 5338 200 0

Latvija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika
Sandoz d.d. organizačná zložka
Tel: +421 2 48 200 600

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Corbilta 175 mg/43.75 mg/200 mg pilloli miksija b'rita
levodopa/carbidopa/entacapone

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'ghandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta
3. Kif għandek tieħu Corbilta
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Corbilta
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża

Corbilta fih tliet sustanzi attivi (levodopa, carbidopa u entacapone) f'pillola waħda miksija b'rita. Corbilta jintuża għall-kura tal-marda ta' Parkinson.

Il-marda ta' Parkinson hija kkawżata minn livelli baxxi ta' sustanza msejħha dopamine fil-mohħ. Levodopa jżid il-livell ta' dopamine u b'hekk inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Carbidopa u entacapone itejjbu l-effetti kontra l-marda ta' Parkinson ta' levodopa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta

Tiħux Corbilta jekk inti:

- allergiku għal levodopa, carbidopa jew entacapone, jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6)
- għandek glawkom ta' angolu dejjaq (disturb fl-ghajn)
- għandek tumur tal-glandola adrenal
- qed tieħu certu mediċini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO)
- qatt kellek sindrome newrolettiu malinn (NMS – dan huwa reazzjoni rari għall-mediċini użati fil-kura ta' disturb mentali)
- qatt kellek rabdomijolisi mhux trawmatika (disturb muskolari rari)
- għandek mard sever tal-fwied.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek qabel tieħu Corbilta jekk għandek jew qatt kellek:

- attakk tal-qalb jew xi mard iehor tal-qalb, inkluż arritmija tal-qalb, jew tal-kanali tad-demm
- ażżma jew xi marda oħra tal-pulmun
- problema fil-fwied, għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata
- mard relatati mal-kliewi jew mal-ormoni
- ulċeri fl-istonku jew konvulzjonijiet

- jekk ikollok dijarea għal tul ta' żmien kellem lit-tabib tiegħek minħabba li dan jista' jkun sinjal ta' infjammazzjoni tal-musrana
- kull forma ta' disturb mentali sever bhal psikosi
- glawkomha kronika ta' angolu wiesa', għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata u l-pressjoni ta' ġo ghajnejk jista' jkollha bżonn tiġi sorveljata.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu:

- antipsikotiċi (medicini wżati biex jikkuraw il-psikosi)
- medicina li tista' tnaqqas il-pressjoni tad-demm meta tqum minn siġġu jew sodda. Għandek tkun taf li Corbila jista' jagħmel dawn ir-reazzjonijiet aghar.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk waqt kura b'Corbila inti:

- tinnota li l-muskoli tiegħek jibbiesgħu hafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Jekk isehħ xi wieħed minn dawn, **Kellem lit-tabib tiegħek minnufih.**
- thossox depress, ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, jew tinnota bidliet mhux tas-soltu fl-imġiba tiegħek
- torqod f'daqqa, jew jekk thossox imħeddel hafna. Jekk dan isehħ, m'għandekx issuq jew tuża ghoddha jew magni (ara wkoll sezzjoni “Sewqan u thaddim ta' magni”).
- tinnota li wara li tibda tieħu Corbila jibdew movimenti mhux ikkontrollati jew dawn imorru għal aghar. Jekk isehħ dan, it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn ibiddel id-doża tal-medicina tiegħek kontra l-marda ta' Parkinson.
- ikollok esperjenza ta' dijarea: huwa rrakkomandat li tissorvelja l-piż tiegħek sabiex tevita l-potenzjal ta' telf ta' piżi eċċessiv
- ikollok esperjenza ta' anoressija progressiva, astenja (debbulizza, thossox bla saħħha) u tnaqqis fil-piż f'perijodu relativament qasir. Jekk isehħ dan, għandha tiġi kkunsidrata valutazzjoni medika generali, inkluż il-funzjoni tal-fwied.
- thoss li għandek bżonn tieqaf tuża Corbila, ara sezzjoni “Jekk tieqaf tieħu Corbila”.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/persuna li tieħu ħsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa sintomi bħal vizzju, li jwasslu għal xenqa ta' doži kbar ta' Corbila u medicini oħra użati fit-trattament tal-marda ta' Parkinson.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja/min jieħu ħsiebek jinnota li qed tiżviluppa xewqat jew kilbiet sabiex iġġib ruhek b'mod li mhux tas-soltu ġhalik jew jekk ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqa jew it-tentazzjoni li twettaq attivitajiet li jistgħu jkunu ta' ħsara ġħalik jew ghall-oħrajn. Dawn l-imġibiet jissejhū disturbi tal-kontroll tal-impulsi u jistgħu jinkludu logħob tal-ażopard patologiku, ikel jew infiżżejjed, wahma sesswali kbira u mhux normali jew tinkwieta minħabba żieda fil-ħsibijiet jew ħsus sesswali. **It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jirrevedi t-trattamenti li qed tingħata.**

It-tabib tiegħek jista' jagħmel xi testijiet tal-laboratorju regolari waqt kura fit-tul b'Corbila.

Jekk għandek bżonn tagħmel operazzjoni, jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek li qed tuża Corbila.

Corbila mhux irrakkomandat biex jintuża għall-kura ta' sintomi ekstrapiramidali (eż. movimenti involontarji, roghda, rigidità tal-muskoli u kontrazzjonijiet tal-muskoli) ikkawżati minn medicini oħra.

Tfal u adolexxenti

Esperjenza b'Corbila f'pazjenti taht 18-il sena hija limitata. Għalhekk, l-użu ta' Corbila fit-tfal jew fl-adolexxenti mhux irrakkomandat.

Medicini oħra u Corbila

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħad-dan dan l-ahħar jew tista' tieħu xi medicini oħra.

Tihux Corbila jekk qed tieħu ċertu medicini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO).

Corbila jista' jžid l-effetti u l-effetti sekondarji ta' xi medicini. Dawn jinkludu:

- medicini wżati ghall-kura tad-depressjoni bhal moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, venlafaxine u paroxetine
- rimiterole u isoprenaline, użati ghall-kura ta' mard respiratorju
- adrenaline, użat ghall-reazzjonijiet allerġiċi severi
- noradrenaline, dopamine u dobutamine, użati ghall-kura ta' mard tal-qalb u pressjoni tad-demm baxxa
- alpha-methyldopa, użat ghall-kura ta' pressjoni tad-demm għolja
- apomorphine, li jintuża ghall-kura tal-marda ta' Parkinson.

L-effetti ta' Corbila jistgħu jiġu mdghajjfa minn ċertu medicini. Dawn jinkludu:

- antagonisti ta' dopamine użati ghall-kura ta' disturbi mentali, tqalligh u rimettar
- phenytoin, użat biex jipprevjeni konvulzjonijiet
- papaverine, użat biex jirrilassa l-muskoli.

Corbila jista' jagħmlia aktar diffiċli biex inti tiddigerixxi l-ħadid. Għalhekk, tieħux Corbila u supplimenti tal-ħadid fl-istess hin. Wara li tieħu wieħed minnhom, stenna mill-inqas 2 sa 3 sīgħat qabel ma tieħu l-ieħor.

Corbila ma' ikel u xorġ

Corbila jista' jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel.

Għal xi pazjenti, Corbila jista' ma jiġix assorbit sew jekk jittieħed ma', jew fit wara li jittieħed ikel li fih hafna proteini (bħal laħam, ħut, prodotti mill-ħalib, żerriegħha u lewż). Kellem lit-tabib tiegħek jekk taħseb li dan jghodd għalik.

Tqala, treddiġħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbijja, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

M'għandekx tredda' waqt kura b'Corbila.

Sewqan u thaddim ta' magni

Corbila jista' jbxaxxi l-pressjoni tad-demm tiegħek, li jista' jġagħlekk thossock mifxul jew sturdut. Għalhekk, oqghod attent hafna meta ssuq jew meta tuża xi ghoddha jew magni.

Jekk thossock imheddel hafna, jew jekk xi kultant issib ruhek torqod f'daqqa wahda, stenna sakemm terġa thossock imqajjem sewwa qabel ma ssuq jew tagħmel kull haġa oħra li teħtieg li tkun vigilanti. Inkella, tista' tpoġgi lilek innifsek jew lil oħrajn f'riskju ta' korrispondenzer serju jew ta' mewt.

Corbila fih sucrose

Corbila fih sucrose (1.89 mg/pillola). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal-ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

Din il-mediciċina fiha anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża massima rakkomandata kuljum, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tieħu Corbila

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.


Għall-adulti u l-anzjani:

It-tabib tiegħek jghidlek eżatt kemm għandek tieħu pilloli ta' Corbitalta kuljum.

- Il-pilloli mhux maħsuba biex jinqasmu jew jinkisru f'biċċiet iż-ġħar.
- Għandek tieħu pillola wahda biss kull darba.
- Skont kif tirrispondi ghall-kura, it-tabib tiegħek jista' jissuġġerilek doża oħla jew akar baxxa.
- Jekk qed tieħu pilloli ta' Corbitalta 175 mg/43.75 mg/200 mg, tiħux aktar minn 8 pilloli ta' din il-qawwa kuljum.

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li l-effett ta' Corbitala huwa qawwi wisq jew dghajnejf wisq, jew jekk ikollok esperjenza ta' xi effetti sekondarji possibbli.

Biex tiftah il-flixkun ghall-ewwel darba: iftaħ l-għatru, imbagħad għafas is-siġill b'subghajk il-kbir sakemm jinqata'. Ara stampa 1.



Jekk tieħu Corbitala aktar milli suppost

Jekk bi żball ħadu pilloli Corbitala aktar milli suppost, kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek minnufih. F'każ ta' doża eċċessiva jista' jħossok konfuż jew aġitat, ir-rata tal-qalb tiegħek tista' tkun aktar bil-mod jew aktar mgħaggħla minn normal jew jista' jkun hemm bidla fil-kulur tal-ġilda, għajnejn, il-sien jew awrina.

Jekk tinsa tiehu Corbitala

M'għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk ikun fadal aktar minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, u l-pillola li jmiss fil-hin normali.

Jekk ikun fadal inqas minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, stenna siegħa, wara hu pillola oħra. Wara dan kompli bħas-soltu.

Dejjem halli mill-inqas siegħa bejn pilloli Corbitala, sabiex tevita effetti sekondarji possibbli.

Jekk tieqaf tieħu Corbitala

Tieqafx tieħu Corbitala sakemm ma jghidlekx hekk it-tabib tiegħek. F'każ bħal dan it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta l-mediċini kontra l-marda ta' Parkinson l-oħra tiegħek, speċjalment levodopa, biex tingħata kontroll suffiċċenti għas-sintomi tiegħek. Jekk twaqqaf it-teħid ta' Corbitala u ta' mediċini kontra l-marda ta' Parkinson oħra f'daqqa, dan jista' jirrizulta f'effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Hafna minn dawn l-effetti sekondarji jistgħu jitneħħew billi tigi aġġustata d-doża.

Jekk waqt il-kura b'Corbitala ikollok esperjenza tas-sintomi li ġejjin, **kellem lit-tabib tiegħek minnufih:**

- Il-muskoli tiegħek jibbiesgħu ħafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikkollok tregħid, aġitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Dawn jistgħu jkunu sintomi tas-sindrom newrolettiku malinn (NMS, reazzjoni severa u rari għall-mediciċini wżati għall-kura ta' disturbi tas-sistema nervuża centrali) jew rabdomijolisi (disturb tal-muskolu rari u sever).
- Reazzjoni allergika, s-sintomi għandu mnejn jinkludu urtikarja (ħorriqija), ħakk, raxx, nefha fil-wiċċċ, xufftejn, ilsien jew grizmejn. Dan jiġi jikkawża diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla'.

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- movimenti mhux ikkontrollati (diskajnejji)
- thossok imdardar (tqallih)
- l-awrina tibdel il-kulur u ssir kannella fl-ahmar bla effett hażin
- uġiġi fil-muskoli
- dijarea.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- thossok mifxul jew ikkollok haġġi minħabba pressjoni tad-demm baxxa, pressjoni għolja
- sintomi tal-marda ta' Parkinson imorru għal aġħar, sturdament, ngħas
- rimettar, uġiġi u skomdu addominali, ħruq ta' stonku, halq xott, stitikezza
- inabbiltà biex torqod, allucinazzjonijiet, konfużjoni, holm mhux normali (inkluż inkubi), għejja bidliet mentali – inkluż problemi bil-memorja, ansjetà u depressjoni (possibilment bi hsibijiet ta' suwiċidju)
- avvenimenti ta' mard tal-qalb jew tal-arterji (eż. uġiġi fis-sider), rata jew ritmu tal-qalb irregolari
- waqgħat aktar frekwenti
- qtugħi ta' nifs
- żjieda fl-gharaq, raxx
- buġħawwieg fil-muskoli, nefha fis-saqajn
- tara mċajpar
- anemija
- tnaqqis fl-aptit, tnaqqis fil-piż
- uġiġi ta' ras, uġiġi fil-ġoggi
- infezzjoni fl-apparat tal-awrina.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- attakk tal-qalb
- fsada fil-musrana
- bidliet fl-ġħadd ta' ċelluli tad-demm li jistgħu jwasslu għal fsada, testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali
- konvulżjonijiet
- thossok aġitat
- sintomi psikotici
- kolite (infjammazzjoni tal-musrana l-ħoxna)
- bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, gharaq)
- diffikultà biex tibla
- żamma tal-awrina.

Mhux magħrufa (ma tistax tingħata stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Xenqa għal doži kbar ta' Corbila aktar minn dawk mehtiegħ biex jiġi kkontrollati sintomi motorji, magħrufa bhala sindrom ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine. Xi wħud mill-pazjenti jkollhom movimenti involontarji severi mhux normali (diskajnejji), bidliet fil-burdata jew effetti sekondarji oħra wara li jieħdu doži kbar ta' Corbila.

Kieni rrapportati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin:

- epatite (infjammazzjoni tal-fwied)
- ħakk.

Tista' tesperjenza l-effetti sekondarji li ġejjin:

- Nuqqas ta' hila li tirreżisti l-impuls li twettaq azzjoni li tista' tkun ta' hsara, li tista' tinkludi:
 - impuls qawwi għal-logħob tal-ażżejjad eċċessiv minkejja konsegwenzi personali u familjari serji
 - tibdil jew żieda fl-interess u l-imġiba sesswali li jħassbu ħafna lilek jew lill-oħrajn, pereżempju, kilba sesswali qawwija
 - xiri jew infiq eċċessivi u bla kontroll
 - ikel bl-addoċċ (tiekol porzjonijiet kbar ta' ikel f'hin qasir) jew ikel b'mod kompulsiv (tiekol ikel aktar min-normal u aktar milli teħtieg biex taqta' l-ġuħ).

Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza kwalunkwe waħda minn dawn l-imġibet; dan jiddiskuti modi kif jimmaniġġa jew inaqqsas s-sintomi tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tīgi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Corbila

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintħahaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxun u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi ghall-ahħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn hażna speċjali.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-draña jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għaddekk tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fihi Corbila

- Is-sustanzi attivi ta' Corbila huma levodopa, carbidopa u entacapone.
- Kull pillola Corbila 175 mg/43.75 mg/200 mg fiha 175 mg ta' levodopa, 43.75 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.
- Is-sustanzi mhux attivi l-oħra fil-qalba tal-pillola huma croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize starch, mannitol (E421) u povidone (E1201).
- Is-sustanzi fil-kisja b'rīta huma glycerol (85 fil-mija) (E422), hypromellose, magnesium stearate, polysorbate 80, iron oxide ahmar (E172), sucrose u titanium dioxide (E171).

Kif jidher Corbila u l-kontenut tal-pakkett

Corbila 175 mg/43.75 mg/200 mg: pilloli ovali, ta' lewn ahmar fil-kannella čar, mingħajr sinjal immaqqax, immarkati b’“LCE 175” fuq naħha waħda.

Pilloli Corbila 175 mg/43.75 mg/200 mg huma disponibbli f'ħames daqsijiet ta' pakketti differenti (10, 30, 100, 130 jew 175 pillola). Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Manifattur

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

България

ТП Сандоз
Тел.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
Τηλ: +30 210 2811712

España

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

France

Orion Corporation
Tél: +358 10 4261

Hrvatska

Sandoz d.o.o.
Tel. +385 1 2353 111

Lietuva

Orion Corporation
Tel. +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.
Tel.: +36 1 430 2890

Malta

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.
Tel: +31 (0)36 5241600

Norge

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Österreich

Sandoz GmbH
Tel: +43 5338 200 0

Polska

Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +351 21 924 19 19

România

S.C Sandoz S.R.L.
+40 21 407 51 60

Ireland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland
Orion Corporation
Sími: +358 10 4261

Italia
Sandoz S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 3494

Kύπρος
Sandoz GmbH
Τηλ: +43 5338 200 0

Latvija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika
Sandoz d.d. organizačná zložka
Tel: +421 2 48 200 600

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.

Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg pilloli miksija b'rita levodopa/carbidopa/entacapone

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M'ghandekx tghaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjal ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F'dan il-fuljett:

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta
3. Kif għandek tieħu Corbilta
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif taħżeen Corbilta
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inh Corbilta u għalxiex jintuża

Corbilta fih tliet sustanzi attivi (levodopa, carbidopa u entacapone) f'pillola waħda miksija b'rita. Corbilta jintuża għall-kura tal-marda ta' Parkinson.

Il-marda ta' Parkinson hija kkawżata minn livelli baxxi ta' sustanza msejħha dopamine fil-mohħ. Levodopa jżid il-livell ta' dopamine u b'hekk inaqqas is-sintomi tal-marda ta' Parkinson. Carbidopa u entacapone itejjbu l-effetti kontra l-marda ta' Parkinson ta' levodopa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tieħu Corbilta

Tiħux Corbilta jekk inti:

- allergiku għal levodopa, carbidopa jew entacapone, jew għal xi sustanza oħra ta' din il-mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6)
- għandek glawkom ta' angolu dejjaq (disturb fl-ghajn)
- għandek tumur tal-glandola adrenal
- qed tieħu certu mediċini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO)
- qatt kellek sindrome newrolettiu malinn (NMS – dan huwa reazzjoni rari għall-mediċini użati fil-kura ta' disturb mentali)
- qatt kellek rabdomijolisi mhux trawmatika (disturb muskolari rari)
- għandek mard sever tal-fwied.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu Corbilta jekk għandek jew qatt kellek:

- attakk tal-qalb jew xi mard iehor tal-qalb, inkluż arritmija tal-qalb, jew tal-kanali tad-demm
- ażżma jew xi marda oħra tal-pulmun
- problema fil-fwied, għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata
- mard relatati mal-kliewi jew mal-ormoni
- ulċeri fl-istonku jew konvulzjonijiet

- jekk ikollok dijarea għal tul ta' żmien kellem lit-tabib tiegħek minħabba li dan jista' jkun sinjal ta' infjammazzjoni tal-musrana
- kull forma ta' disturb mentali sever bhal psikosi
- glawkomha kronika ta' angolu wiesa', għax id-doża tiegħek jista' jkollha bżonn tiġi aġġustata u l-pressjoni ta' ġo ghajnejk jista' jkollha bżonn tiġi sorveljata.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk qed tieħu:

- antipsikotiċi (medicini wżati biex jikkuraw il-psikosi)
- medicina li tista' tnaqqas il-pressjoni tad-demm meta tqum minn siġġu jew sodda. Għandek tkun taf li Corbila jista' jagħmel dawn ir-reazzjonijiet aghar.

Kellem lit-tabib tiegħek jekk waqt kura b'Corbila inti:

- tinnota li l-muskoli tiegħek jibbiesgħu hafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikollok tregħid, agitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Jekk isehħ xi wieħed minn dawn, **Kellem lit-tabib tiegħek minnufih.**
- thossox depress, ikollok ħsibijiet ta' suwiċidju, jew tinnota bidliet mhux tas-soltu fl-imġiba tiegħek
- torqod f'daqqa, jew jekk thossox imħeddel hafna. Jekk dan isehħ, m'għandekx issuq jew tuża ghoddha jew magni (ara wkoll sezzjoni “Sewqan u thaddim ta' magni”).
- tinnota li wara li tibda tieħu Corbila jibdew movimenti mhux ikkontrollati jew dawn imorru għal aghar. Jekk isehħ dan, it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn ibiddel id-doża tal-medicina tiegħek kontra l-marda ta' Parkinson.
- ikollok esperjenza ta' dijarea: huwa rrakkomandat li tissorvelja l-piż tiegħek sabiex tevita l-potenzjal ta' telf ta' piżi eċċessiv
- ikollok esperjenza ta' anoressija progressiva, astenja (debbulizza, thossox bla saħħha) u tnaqqis fil-piż f'perijodu relativament qasir. Jekk isehħ dan, għandha tiġi kkunsidrata valutazzjoni medika generali, inkluż il-funzjoni tal-fwied.
- thoss li għandek bżonn tieqaf tuża Corbila, ara sezzjoni “Jekk tieqaf tieħu Corbila”.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja tiegħek/persuna li tieħu hsiebek tinnutaw li inti qed tiżviluppa sintomi bħal vizzju, li jwasslu għal xenqa ta' doži kbar ta' Corbila u medicini oħra użati fit-trattament tal-marda ta' Parkinson.

Għid lit-tabib tiegħek jekk inti jew il-familja/min jieħu hsiebek jinnota li qed tiżviluppa xewqat jew kilbiet sabiex iġġib ruhekk b'mod li mhux tas-soltu ġhalik jew jekk ma tistax tirreżisti l-impuls, ix-xewqa jew it-tentazzjoni li twettaq attivitajiet li jistgħu jkunu ta' hsara ġħalik jew ghall-oħrajn. Dawn l-imġibiet jissejhū disturbi tal-kontroll tal-impulsi u jistgħu jinkludu logħob tal-ażopard patologiku, ikel jew infiżżejjed, wahma sesswali kbira u mhux normali jew tinkwieta minħabba żieda fil-ħsibijiet jew ħsus sesswali. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jirrevedi t-trattamenti li qed tingħata.

It-tabib tiegħek jista' jagħmel xi testijiet tal-laboratorju regolari waqt kura fit-tul b'Corbila.

Jekk għandek bżonn tagħmel operazzjoni, jekk jogħġibok għid lit-tabib tiegħek li qed tuża Corbila.

Corbila mhux irrakkomandat biex jintuża għall-kura ta' sintomi ekstrapiramidali (eż. movimenti involontarji, roghda, rigidità tal-muskoli u kontrazzjonijiet tal-muskoli) ikkawżati minn medicini oħra.

Tfal u adolexxenti

Esperjenza b'Corbila f'pazjenti taht 18-il sena hija limitata. Għalhekk, l-użu ta' Corbila fit-tfal jew fl-adolexxenti mhux irrakkomandat.

Medicini oħra u Corbila

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħad-dan u l-ahħar jew tista' tieħu xi medicini oħra.

Tihux Corbila jekk qed tieħu ċertu medicini biex tikkura d-depressjoni (taħlita ta' inibituri selettivi ta' MAO-A u MAO-B, jew inibituri mhux selettivi ta' MAO).

Corbila jista' jžid l-effetti u l-effetti sekondarji ta' xi medicini. Dawn jinkludu:

- medicini wżati ghall-kura tad-depressjoni bħal moclobemide, amitriptyline, desipramine, maprotiline, venlafaxine u paroxetine
- rimiterole u isoprenaline, użati ghall-kura ta' mard respiratorju
- adrenaline, użat ghall-reazzjonijiet allerġiċi severi
- noradrenaline, dopamine u dobutamine, użati ghall-kura ta' mard tal-qalb u pressjoni tad-demm baxxa
- alpha-methyldopa, użat ghall-kura ta' pressjoni tad-demm għolja
- apomorphine, li jintuża ghall-kura tal-marda ta' Parkinson.

L-effetti ta' Corbila jistgħu jiġu mdghajjfa minn ċertu medicini. Dawn jinkludu:

- antagonisti ta' dopamine użati ghall-kura ta' disturbi mentali, tqalligh u rimettar
- phenytoin, użat biex jipprevjeni konvulzjonijiet
- papaverine, użat biex jirrilassa l-muskoli.

Corbila jista' jagħmlia aktar diffiċli biex inti tiddigerixxi l-ħadid. Għalhekk, tieħux Corbila u supplimenti tal-ħadid fl-istess hin. Wara li tieħu wieħed minnhom, stenna mill-inqas 2 sa 3 sīgħat qabel ma tieħu l-ieħor.

Corbila ma' ikel u xorġ

Corbila jista' jittieħed mal-ikel jew mingħajr ikel.

Għal xi pazjenti, Corbila jista' ma jiġix assorbit sew jekk jittieħed ma', jew fit wara li jittieħed ikel li fih hafna proteini (bħal laham, ħut, prodotti mill-ħalib, żerriegħha u lewż). Kellem lit-tabib tiegħek jekk taħseb li dan jghodd għalik.

Tqala, treddiġħ u fertilità

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbijja, itlob il-parir tat-tabib jew tal-ispiżjar tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

M'għandekx tredda' waqt kura b'Corbila.

Sewqan u thaddim ta' magni

Corbila jista' jbaxxi l-pressjoni tad-demm tiegħek, li jista' jġagħlekk thossock mifxul jew sturdut. Għalhekk, oqghod attent hafna meta ssuq jew meta tuża xi ghoddha jew magni.

Jekk thossock imheddel hafna, jew jekk xi kultant issib ruhek torqod f'daqqa wahda, stenna sakemm terġa thossock imqajjem sewwa qabel ma ssuq jew tagħmel kull haġa oħra li teħtieg li tkun vigilanti. Inkella, tista' tpoġġi lilek innifsek jew lil oħrajn f'riskju ta' korrispondenzer serju jew ta' mewt.

Corbila fih sucrose

Corbila fih sucrose (2.3 mg/pillola). Jekk it-tabib qallek li għandek intolleranza għal-ċerti tipi ta' zokkor ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediciċina.

Din il-mediciċina fiha anqas minn 1 mmol (23 mg) sodium f'kull doża massima rakkomandata kuljum, jiġifieri essenzjalment 'hielsa mis-sodium'.

3. Kif għandek tieħu Corbila

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib jew l-ispiżjar tiegħek. Iċċekkja mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.


Għall-adulti u l-anzjani:

It-tabib tiegħek jghidlek eżatt kemm għandek tieħu pilloli ta' Corbitalta kuljum.

- Il-pilloli mhux maħsuba biex jinqasmu jew jinkisru f'biċċiet iż-ġħar.
- Għandek tieħu pillola waħda biss kull darba.
- Skont kif tirrispondi ghall-kura, it-tabib tiegħek jista' jissuġġerilek doża oħla jew akar baxxa.
- Jekk qed tieħu pilloli ta' Corbitalta 200 mg/50 mg/200 mg, tiħux aktar minn 7 pilloli ta' din il-qawwa kuljum.

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek jekk taħseb li l-effett ta' Corbitala huwa qawwi wisq jew dghajnejf wisq, jew jekk ikollok esperjenza ta' xi effetti sekondarji possibbli.

Biex tiftah il-flixkun ghall-ewwel darba: iftaħ l-għatru, imbagħad ghafas is-siġill b'subghajk il-kbir sakemm jinqata'. Ara stampa 1.



Jekk tieħu Corbitala aktar milli suppost

Jekk bi żball ħadu pilloli Corbitala aktar milli suppost, kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek minnufih. F'każ ta' doża eċċessiva jista' jħossok konfuż jew aġitat, ir-rata tal-qalb tiegħek tista' tkun aktar bil-mod jew aktar mgħaggħla minn normal jew jista' jkun hemm bidla fil-kulur tal-ġilda, għajnejn, il-sien jew awrina.

Jekk tinsa tiehu Corbitala

M'għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull pillola li tkun insejt tieħu.

Jekk ikun fadal aktar minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, u l-pillola li jmiss fil-hin normali.

Jekk ikun fadal inqas minn siegħa sad-doża li jmiss tiegħek:

Hu pillola minnufih hekk kif tiftakar, stenna siegħa, wara hu pillola ohra. Wara dan kompli bħas-soltu.

Dejjem halli mill-inqas siegħa bejn pilloli Corbitala, sabiex tevita effetti sekondarji possibbli.

Jekk tieqaf tieħu Corbitala

Tieqafx tieħu Corbitala sakemm ma jghidlekx hekk it-tabib tiegħek. F'każ bħal dan it-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta l-mediċini kontra l-marda ta' Parkinson l-ohra tiegħek, speċjalment levodopa, biex tingħata kontroll suffiċċenti għas-sintomi tiegħek. Jekk twaqqaf it-teħid ta' Corbitala u ta' mediċini kontra l-marda ta' Parkinson ohra f'daqqa, dan jista' jirrizulta f'effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina ohra, din il-mediċina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f'kulhadd. Hafna minn dawn l-effetti sekondarji jistgħu jitneħħew billi tigi aġġustata d-doża.

Jekk waqt il-kura b'Corbitala ikollok esperjenza tas-sintomi li ġejjin, **kellem lit-tabib tiegħek minnufih:**

- Il-muskoli tiegħek jibbiesgħu ħafna jew jingibdu f'daqqa bis-saħħha, jew jekk ikkollok tregħid, aġitazzjoni, konfużjoni, deni, polz mgħaggel, jew oxxillazzjonijiet kbar fil-pressjoni tad-demm tiegħek. Dawn jistgħu jkunu sintomi tas-sindrom newrolettiku malinn (NMS, reazzjoni severa u rari għall-mediciċini wżati għall-kura ta' disturbi tas-sistema nervuża centrali) jew rabdomijolisi (disturb tal-muskolu rari u sever).
- Reazzjoni allergika, s-sintomi għandu mnejn jinkludu urtikarja (ħorriqija), ħakk, raxx, nefha fil-wiċċċ, xufftejn, ilsien jew grizmejn. Dan jiġi jikkawża diffikultajiet biex tieħu n-nifs jew biex tibla'.

Komuni hafna (jistgħu jaffettwaw aktar minn persuna waħda minn kull 10):

- movimenti mhux ikkontrollati (diskajnejji)
- thossok imdardar (tqallih)
- l-awrina tibdel il-kulur u ssir kannella fl-ahmar bla effett hażin
- uġiġi fil-muskoli
- dijarea.

Komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

- thossok mifxul jew ikkollok haġġi minħabba pressjoni tad-demm baxxa, pressjoni għolja
- sintomi tal-marda ta' Parkinson imorru għal aġħar, sturdament, ngħas
- rimettar, uġiġi u skomdu addominali, ħruq ta' stonku, halq xott, stitikezza
- inabbiltà biex torqod, allucinazzjonijiet, konfużjoni, holm mhux normali (inkluż inkubi), għejja bidliet mentali – inkluż problemi bil-memorja, ansjetà u depressjoni (possibilment bi hsibijiet ta' suwiċidju)
- avvenimenti ta' mard tal-qalb jew tal-arterji (eż. uġiġi fis-sider), rata jew ritmu tal-qalb irregolari
- waqgħat aktar frekwenti
- qtugħi ta' nifs
- żjieda fl-gharaq, raxx
- buġħawwieg fil-muskoli, nefha fis-saqajn
- tara mċajpar
- anemija
- tnaqqis fl-aptit, tnaqqis fil-piż
- uġiġi ta' ras, uġiġi fil-ġoggi
- infezzjoni fl-apparat tal-awrina.

Mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

- attakk tal-qalb
- fsada fil-musrana
- bidliet fl-ġħadd ta' ċelluli tad-demm li jistgħu jwasslu għal fsada, testijiet tal-funzjoni tal-fwied mhux normali
- konvulżjonijiet
- thossok aġitat
- sintomi psikotici
- kolite (infjammazzjoni tal-musrana l-ħoxna)
- bidla fil-kulur minbarra bidla fil-kulur tal-awrina (eż. ġilda, dwiefer, xagħar, gharaq)
- diffikultà biex tibla
- żamma tal-awrina.

Mhux magħrufa (ma tistax tingħata stima tal-frekwenza mid-data disponibbli):

Xenqa għal doži kbar ta' Corbila aktar minn dawk mehtiegħa biex jiġi kkontrollati sintomi motorji, magħrufa bhala sindrom ta' indeboliment fir-regolazzjoni ta' dopamine. Xi wħud mill-pazjenti jkollhom movimenti involontarji severi mhux normali (diskajnejji), bidliet fil-burdata jew effetti sekondarji oħra wara li jieħdu doži kbar ta' Corbila.

Kieni rrapportati wkoll l-effetti sekondarji li ġejjin:

- epatite (infjammazzjoni tal-fwied)
- ħakk.

Tista' tesperjenza l-effetti sekondarji li ġejjin:

- Nuqqas ta' hila li tirreżisti l-impuls li twettaq azzjoni li tista' tkun ta' hsara, li tista' tinkludi:
 - impuls qawwi għal-logħob tal-ażżejjad eċċessiv minkejja konsegwenzi personali u familjari serji
 - tibdil jew żieda fl-interess u l-imġiba sesswali li jħassbu ħafna lilek jew lill-oħrajn, pereżempju, kilba sesswali qawwija
 - xiri jew infiq eċċessivi u bla kontroll
 - ikel bl-addoċċ (tiekol porzjonijiet kbar ta' ikel f'hin qasir) jew ikel b'mod kompulsiv (tiekol ikel aktar min-normal u aktar milli teħtieg biex taqta' l-ġuħ).

Għid lit-tabib tiegħek jekk tesperjenza kwalunkwe waħda minn dawn l-imġibet; dan jiddiskuti modi kif jimmaniġġa jew inaqqsas s-sintomi tiegħek.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li muhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali mnizzla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tīgi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-mediċina.

5. Kif taħżeen Corbitala

Żomm din il-mediċina fejn ma tidħirx u ma tintħahaqx mit-tfal.

Tużax din il-mediċina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-flixxun u l-kartuna. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi ghall-ahħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn hażna speċjali.

Tarmix medicini mal-ilma tad-draña jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi medicini li m'għaddekk tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni ohra

X'fihi Corbitala

- Is-sustanzi attivi ta' Corbitala huma levodopa, carbidopa u entacapone.
- Kull pillola ta' Corbitala 200 mg/50 mg/200 mg fiha 200 mg ta' levodopa, 50 mg ta' carbidopa u 200 mg ta' entacapone.
- Is-sustanzi mhux attivi l-ohra fil-qalba tal-pillola huma croscarmellose sodium, magnesium stearate, maize starch, mannitol (E421) u povidone (E1201).
- Is-sustanzi fil-kisja b'rita huma glycerol (85% fil-mija) (E422), hypromellose, magnesium stearate, polysorbate 80, iron oxide aħmar (E172), sucrose u titanium dioxide (E171).

Kif jidher Corbitala u l-kontenut tal-pakkett

Corbitala 200 mg/50 mg/200 mg: pilloli miskija b'rita, bla sinjal imnaqqax, ovali, ta' lewn aħmar skur fil-kannella immarkati b'“LCE 200” fuq naħha waħda.

Corbitala 200 mg/50 mg/200 mg huwa disponibbli f'hames daqsijiet ta' pakketti differenti (10, 30, 100, 130, jew 175 pillola). Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Il-Finlandja

Manifattur

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Il-Finlandja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġibok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

България

ТП Сандоз
Тел.: + 359 2 970 47 47

Česká republika

Sandoz s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Danmark

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Deutschland

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Eesti

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ελλάδα

Novartis (Hellas) S.A.C.I.
Τηλ: +30 210 2811712

España

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

France

Orion Corporation
Tél: +358 10 4261

Hrvatska

Sandoz d.o.o.
Tel. +385 1 2353 111

Lietuva

Orion Corporation
Tel. +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.
Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.
Tel.: +36 1 430 2890

Malta

Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Nederland

Sandoz B.V.
Tel: +31 (0)36 5241600

Norge

Orion Corporation
Tlf: +358 10 4261

Österreich

Sandoz GmbH
Tel: +43 5338 200 0

Polska

Orion Corporation
Tel.: +358 10 4261

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.
Tel: +351 21 924 19 19

România

S.C Sandoz S.R.L.
+40 21 407 51 60

Ireland
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Ísland
Orion Corporation
Sími: +358 10 4261

Italia
Sandoz S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 3494

Kύπρος
Sandoz GmbH
Τηλ: +43 5338 200 0

Latvija
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d.
Tel: +386 1 580 21 11

Slovenská republika
Sandoz d.d. organizačná zložka
Tel: +421 2 48 200 600

Suomi/Finland
Orion Corporation
Puh./Tel: +358 10 4261

Sverige
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)
Orion Corporation
Tel: +358 10 4261

Dan il-fuljett kien rivedut l-ahħar f'

Sorsi oħra ta' informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea ghall-Mediċini: <http://www.ema.europa.eu>.