

**ANNEX I**

**SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT**

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati

## 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni  
Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbata

## 2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' 0.5 ml fiha:

Serotip polysaccharide pnevmokokkali 4*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 6B*	4 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 9V*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 14F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 18C*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 19F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 23F*	2 mikrogrammi

\* Konjugat għall-proteina *carrier* CRM<sub>197</sub> u adsorbit fuq aluminium phosphate (0.5 mg)

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

## 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

It-tilqima hi suspensjoni bajda omogenja.

## 4. TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tilqima attiva kontra mard ikkawżat minn *Streptococcus pneumoniae* serotipi 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F u 23F (li jinkludi sepsis, meningite, pnevmonja, batteremija u infjammazzjoni akuta fil-parti tan-nofs tal-widna) fi trabi u fi tfal minn xahrejn sa 5 snin (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u 5.1).

Għan-numru ta' doži li jridu jingħataw fil-gruppi differenti ta' età, ara sezzjoni 4.2.

L-użu ta' Prevenar għandu jkun stabbilit fuq il-bażi ta' rakkomandazzjonijiet uffiċjali, li jikkunsidraw l-impatt ta' mard invażiv fi gruppi differenti ta' età, kif ukoll il-varjabilità tal-epidemjoloġija tas-serotip f'żoni ġeografiċi differenti (ara sezzjonijiet 4.4, 4.8 u 5.1).

### 4.2 Fozoġija u metodu ta' kif għandu jingħata

#### Fozoġija

L-iskedi tal-immunizzazzjoni għal Prevenar għandhom ikunu bbażati fuq rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Trabi ta' bejn 2 - 6 xhur:

Is-serje primarja tat-trabi tikkonsisti fi tliet doži, kull waħda ta' 0.5 ml. L-ewwel doża normalment tingħata meta t-tarbija jkollha xahrejn, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži. Ir-raba' doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Alternattivament, meta Prevenar jingħata bħala parti minn programm ta' rutina ta' immunizzazzjoni lit-trabi, tista' tkun ikkunsidrata skeda b'żewġ doži. L-ewwel doża tista' tingħata mill-età ta' xahrejn,

bit-tieni doża li tinghata mill-inqas xahrejn wara, u t-tielet doża (booster) li tinghata fl-età ta' 11-15-il xahar (ara sezzjoni 5.1)

Trabi akbar u tfal li ma ngħatawx tilqima qabel:

Trabi ta' bejn 7 - 11-il xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži. It-tielet doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Tfal li għandhom bejn 12 - 23 xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahrejn bejn id-doži.

Tfal li għandhom bejn 24 xahar – 5 snin: doża waħda.

Il-ħtieġa ta' doża *booster* wara dawn l-iskedi ta' immunizzazzjoni ma kinitx stabbilita.

Metodu ta' kif għandu jinghata

It-tilqima għandha tinghata permezz ta' injezzjoni ġol-muskoli. Is-siti ppreferuti huma n-nana anterolaterali tal-koxxa (muskolu *vastus lateralis*) fit-trabi, jew il-muskolu deltojd tan-naħa ta' fuq tad-driegħ fi tfal żgħar.

### 4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal xi sustanzi mhux attivi, jew għat-*toxoid* tad-difterite.

Bhal fil-każ ta' tilqim iehor, l-ġhoti ta' Prevenar għandu jkun possibbli li jbatu minn mard b'deni akut jew sever. Madankollu, il-preżenza ta' infezzjoni żgħira, bhal rih, m'għandhiex tirriżulta fid-differiment tat-tilqima.

### 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Bħat-tilqim kollu li jista' jiġi injettat, il-kura u s-supervizjoni medika adattata għandhom dejjem ikunu disponibbli fil-pront f'każ ta' avveniment anafilatiku rari wara l-ġhoti tat-tilqima.

Tagħtix Prevenar minn ġol-vina.

Ir-riskju potenzjali ta' apnea u l-ħtieġa għal monitoraġġ respiratorju għal 48-72 siegħa għandhom ikunu kkunsidrati meta tagħti l-serje tal-immunizzazzjoni primarja lil trabi prematuri hafna (li twieldu wara ≤ 28 ġimgħa ta' tqala) u partikularment lil dawk li kellhom storja medika ta' immaturità respiratorja. Minhabba li l-benefiċċju tat-tilqima hu għoli f'dan il-grupp tat-trabi, it-tilqima m'għandhiex tinżammn jew tkun ittardjata.

Prevenar mhux ser jipprotegi kontra serotipi oħrajn ta' *Streptococcus pneumoniae* hlief dawk inklużi fit-tilqima, jew kontra mikro-organizmi oħrajn li jikkawżaw mard invażiv jew infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna.

Din it-tilqima m'għandhiex tinghata lil trabi jew lil tfal li għandhom it-tromboċitopenja jew kwalunkwe disturb tal-koagulazzjoni li minhabba fih l-injezzjoni ġol-muskoli tkun kontraindikata, hlief jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq b'mod ċar ir-riskju tal-ġhoti.

Għalkemm xi rispons tal-antikorpi għat-*toxoid* tad-difterite jista' jseħh, l-immunizzazzjoni b'din it-tilqima ma tissostwixxix l-immunizzazzjoni ta' rutina kontra d-difterite

Għal tfal minn sentejn sa 5 snin, intużat skeda ta' immunizzazzjoni li kienet tikkonsisti f'doża waħda. Rata oghla ta' reazzjonijiet lokali kienet osservata fi tfal li kellhom iktar minn 24 xahar, meta mqabbla mat-trabi (ara sezzjoni 4.8).

Tfal b'indeboliment fir-rispons immuni, kemm jekk dan isehh minhabba l-użu ta' terapija immunosoppressiva, difett ġenetiku, infezzjoni bl-HIV, jew kawżi oħrajn, jista' jkollhom tnaqqis fir-rispons tal-antikorpi għall-immunizzazzjoni attiva.

Dejta limitata wriet li Prevenar (serje primarja bi tliet doži) jikkaguna rispons immuni aċċettabbli fi trabi li għandhom il-marda taċ-ċelluli *sickle*, bi profil tas-sigurtà simili għal dak osservat fi gruppi li mhux qegħdin f'riskju għoli (ara sezzjoni 5.1). Dejta dwar is-sigurtà u l-immunogeniċità għandhom mhumiex disponibbli għal tfal fi gruppi oħrajn speċifiċi li qegħdin f'riskju għoli għal mard pnemkokkali invażiv (eż. tfal b'disfunzjoni kongenitali oħra jew b'disfunzjoni miksuba tal-milsa, li huma infettati bl-HIV, li għandhom malinn, u li għandhom sindrome nefrotiku). It-tilqima fi gruppi li qegħdin f'riskju għoli għandha tkun ikkunsidrata fuq bażi individwali.

Tfal ta' taht is-sentejn għandhom jirċievu s-serje ta' tilqim ta' Prevenar li hi adattata għall-età tagħhom (ara sezzjoni 4.2). L-użu ta' tilqima konjugata pnemkokkali ma tissostitwixxi l-użu ta' tilqim tal-polysaccharide pnemkokkali li fih 23 valent fit-tfal  $\geq$  ta' 24 xahar b'kundizzjonijiet (bħall-marda taċ-ċelluli *sickle*, asplenja, infezzjoni bl-HIV, mard kroniku jew li huma immunokompromessi) li jpoġġuom f'riskju ogħla għal mard invażiv minhabba *Streptococcus pneumoniae*. F'juri ikun rakkomandat, it-tfal f'riskju li għandhom  $\geq$  24 xahar u li jkun digà tlaqqmu bi Prevenar, għandhom jirċievu tilqima tal-polysaccharide pnemkokkali li fiha 23 valent. L-intervall bejn it-tilqima tal-konjugat pnemkokkali (Prevenar) u t-tilqima tal-polysaccharide pnemkokkali li fiha 23 valent, m'għandux ikun ta' inqas minn 8 ġimghat. M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli li tindika jekk l-għoti ta' tilqima tal-polysaccharide pnemkokkali li fiha 23 valent, li tfal li ma jkunux tlaqqmu, jew lil tfal li jkun digà tlaqqmu bi Prevenar, jistax jirriżulta f'rispons eċċessiv għal doži addizzjonali ta' Prevenar.

Meta Prevenar jingħata flimkien ma' tilqim eżavalenti (DTaP/HiB(PRIP-T)/IPV/HepB), it-tabib għandu jkun konxju li dejta minn studji kliniċi tindika li r-rata ta' reazzjonijiet bid-deni kienet ogħla meta mqabbla ma' dik li ssehh wara l-għoti ta' tilqim eżavalenti wandu. Dawn ir-reazzjonijiet kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom moderati (inqas minn jew 39°C) u kienu temporanji (ara sezzjoni 4.8).

Il-kura kontra d-deni għandha tinbeda skont il-linji gwida lokali tal-kura.

Mediċina profilattika kontra d-deni hi rakkomandata:

- għat-tfal kollha li jkun qed jirċievu Prevenar fl-istess hin ma' tilqim li jkun fih *whole cell pertussis* minhabba rata ogħla ta' reazzjonijiet bid-deni (ara sezzjoni 4.8).
- għat-tfal li jkollhom il-puplesiji, jew li jkollhom passat mediku ta' puplesiji kkawżati mid-deni.

Bhal ma jiġri bi kwalunkve tilqima, Prevenar jista' ma jipproteġix l-individwi kollha li jkun qed jirċievu t-tilqima kontra l-marda pnemkokkali. Flimkien ma' dan, għas-serotipi tat-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun iktar baxxa b'mod sostanzjali milli minn protezzjoni kontra l-mard invażiv. Minhabba li l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi kkawżata minn hafna organiżmi li mhumiex serotipi pnemkokkali rappreżentati fit-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjonijiet kollha fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun baxxa (ara sezzjoni 5.1).

#### **4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott**

Prevenar jista' jingħata fl-istess hin ma' tilqim pedjatriku ieħor skont l-iskedi rakkomandati tal-immunizzazzjoni. Tilqim differenti li jista' jiġi injettat għandu dejjem jingħata f'siti differenti tal-injezzjoni.

Ir-rispons immuni għat-tilqim pedjatriku ta' rutina mogħti flimkien ma' Prevenar f'siti differenti tal-injezzjoni, kien evalwat f'7 studji kliniċi kkontrollati. Ir-rispons tal-antikorpi għat-tilqim bil-konjugat tal-proteina tat-tetnu Hib (PRP-T), tetnu u Epatite B (HepB) kien simili għall-kontrolli. Għat-tilqim konjugat Hib ibbażat fuq is-CRM, kien osservat titjib fir-risponsi tal-antikorpi għall-Hib u d-diferite fis-serje ta' tilqim li tingħata lit-trabi. Meta ngħata l-*booster*, xi trazzin tal-livell tal-antikorpi Hib kien

osservat, iżda t-tfal kollha kellhom livelli protettivi. Tnaqqis inkonsistenti fir-rispons għall-antigeni tal-pertussis, kif ukoll għat-tilqima tal-polio inattivata (*inactivated polio vaccine - IPV*) kien osservat. Ir-rilevanza klinika ta' dawn l-interazzjonijiet mhijiex magħrufa. Riżultati limitati minn studji *open label* urew rispons aċċettabbli għall-MMR u l-ġidri r-rih.

Dejta dwar l-ghoti fl-istess hin ta' Prevenar ma' Infanrix hexa (tilqima DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB) ma wriet l-ebda interferenza klinikament rilevanti fir-rispons tal-antikorpi għal kull wiehed mill-antigeni individwali, meta mogħtija bħala tilqima primarja ta' 3 doži.

Dejta suffiċjenti dwar l-interferenza meta jsir l-ghoti fl-istess hin ta' tilqim ieħor eżivalenti flimkien ma' Prevenar, bħalissa mhijiex disponibbli.

Fi prova klinika li qabblat l-ghoti separat mal-ghoti fl-istess hin ta' Prevenar (tliet doži wara 2, 3.5 u 6 xhur u doża *booster* wara madwar 12-il xahar) u Meningitec (tilqima konjugata Ċ meningokokkali; żewġ doži wara xahrejn u 6 xhur u doża *booster* wara madwar 12-il xahar), ma kien hemm l-ebda evidenza ta' interferenza immuni bejn iż-żewġ tilqimiet konjugati wara s-serje primarja se je jew wara d-doži *booster*.

#### 4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Prevenar mhux intenzjonat għall-użu fl-adulti. Dejta mill-bniedem dwar l-użu matul it-tqala jew it-treddigh u dwar ir-riproduzzjoni fl-animali, mhijiex disponibbli.

#### 4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Mhux rilevanti.

#### 4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurtà tat-tilqima kienet evalwata fi studji kliniċi kontrollati differenti, li fihom iktar minn 18,000 tarbija b'saħħithom (età ta' minn 6 ġimgħat sa 18-il xahar) kienu inkluzi. Il-maġġoranza tal-esperjenza dwar is-sigurtà tiġi mill-prova dwar l-effikaċja li kienha 17,066 tarbija rċievew 55,352 doża ta' Prevenar. Flimkien ma' dan, is-sigurtà fi tfal akbar li ma kinux imlaqqa kienet evalwata.

Fl-istudji kollha, Prevenar ingħata fl-istess hin mat-tilqim rakkomandat li jingħata fi żmien it-tfulija.

Fost l-iktar reazzjonijiet avversi rrapportati b'mod komuni, kien hemm reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni u deni.

Ma kienet osservata l-ebda zieda konsistenti fir-reazzjonijiet lokali jew sistemici meta ngħataw doži ripetuti matul is-serje primarja jew bid-doża *booster*, bl-eċċezzjonijiet ikunu rata oghla ta' sensitività temporanja (36.5%) u sensitività li interferixxiet mal-moviment tar-riglejn jew tad-dirghajn (18.5%) li kienu osservati bid-doża *booster*.

Fi tfal akbar li kienu qed jirċievu doża waħda tat-tilqima, rata oghla ta' reazzjonijiet lokali kienu osservati iktar minn dak li kien deskritt qabel fi żmien it-tfulija. Dawn ir-reazzjonijiet kienu primarjament temporanji fin-natura tagħhom. Fi studju li sar wara li nħarġet il-liċenzja għal dan il-prodott, li kien jinvolvi 115 tifel u tifla li kellhom bejn sentejn u 5 snin, is-sensittività kienet irrappurtata f'sa 39.1% tat-tfal; fi 15.7% tat-tfal, is-sensittività interferixxiet mal-moviment tar-riglejn jew tad-dirghajn, Il-hmura kienet irrappurtata f'40.0% tat-tfal, u l-ebusija kienet irrappurtata fi 32.2% tat-tfal. Il-hmura jew l-ebusija ta'  $\geq 2$  ċm fid-dijametru kienet irrappurtata fi 22.6% u fi 13.9% tat-tfal rispettivament.

Meta Prevenar jingħata flimkien ma' tilqim eżivalenti (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), deni b'temperatura ta'  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  kull doża kien irrappurtat fi 28.3% sa 48.3% tat-trabi fil-grupp li kien qed jirċievi Prevenar u t-tilqima eżivalenti fl-istess hin meta mqabbel ma' 15.6% sa 23.4% fil-grupp li kien qed jirċievi t-tilqima eżivalenti waħidha. Deni b'temperatura ta' iktar minn  $39.5^{\circ}\text{C}$  kull doża

kien osservat f'0.6 sa 2.8% tat-trabi li kienu qed jirċievu Prevenar u tilqim eżivalenti (ara sezzjoni 4.4).

Ir-reazzjoġeneċità kienet oghla fi tfal li kienu qed jirċievu tilqim *whole cell pertussis* fl-istess hin. Fi studju, li kien jinkludi 1,662 tifel/tifla, deni b'temperatura ta'  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  kien irrappurtat f'41.2% tat-tfal li rċievu Prevenar fl-istess hin ma' DTP meta mqabbel ma' 27.9% fil-grupp tal-kontroll. Deni b'temperatura ta'  $> 39^{\circ}\text{C}$  kien irrappurtat fi 3.3% tat-tfal meta mqabbel ma' 1.2% fil-grupp tal-kontroll.

Reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-provi kliniċi jew mill-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-suq huma elenkati fit-tabella li ġejja skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi u skont il-frekwenza, u dan japplika għall-gruppi kollha tal-eż. 4.4.

Il-frekwenza hi definita kif ġej:

Komuni ħafna ( $\geq 1/10$ )

Komuni ( $\geq 1/100$  sa  $< 1/10$ )

Mhux komuni ( $\geq 1/1,000$  sa  $< 1/100$ )

Rari ( $\geq 1/10,000$  sa  $< 1/1,000$ )

Rari ħafna ( $< 1/10,000$ )

F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mnizzla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitnizzlu l-ewwel.

Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika:

Rari ħafna: Limfadenopatija lokalizzata fiż-żona tas-sit tal-injezzjoni

Disturbi fis-sistema immuni:

Rari: Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva bħal reazzjonijiet anafilattiċi/anafilattojdi li jinkludu xokk, edema anġjonewrotika, bronkospażmu, qtugħ ta' nifs, edema tal-wieċ.

Disturbi fis-sistema nervuża:

Rari: Puplesiji, li jinkludu puplesiji kkawzati mid-deni.

Disturbi gastro-intestinali:

Komuni ħafna: Rimettar, dijarea, nuqqas ta' aptit.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taħt il-ġilda:

Mhux komuni: Raxx/urtikarja.

Rari ħafna: Eritema multiforme.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

Komuni ħafna: Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (eż. eritema, ebusija/nefha, uġiġ/sensittività); deni  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , irritabilità, biki, nġas, irqad bla kwiet.

Komuni: Nefha/ebusija fis-sit tal-injezzjoni u eritema  $> 2.4$  ċm, sensitività li tinterferixxi mal-moviment. Deni  $> 39^{\circ}\text{C}$ .

Rari: Epišodju iporisponsiv ipotoniku, reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva fis-sit tal-injezzjoni (eż., oem atite, ħakk, urtikarja), fwawar.

Apnea fi trabi prematuri ħafna ( $\leq 28$  ġimġha ta' tqala) (ara sezzjoni 4.4).

#### 4.9 Doża eċċessiva

Kien hemm rapporti ta' doża eċċessiva bi Prevenar, li jinkludu każijiet ta' għoti ta' doża li kienet oghla minn dik rakkomandata, u każijiet ta' dozi sussegwenti li nġataw iktar kmieni miż-żmien rakkomandat (i.e. qrib wisq tad-doża ta' qabel). L-ebda effetti mhux mixtieqa ma kienu rrappurtati fil-maġġoranza tal-individwi. B'mod ġenerali, ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati b'doża eċċessiva kienu wkoll irrappurtati b'dozi waħdanin irrakkomandati ta' Prevenar.

## 5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

### 5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: tilqim pnevmokokkali, Kodiċi ATC: J07AL02

#### Immunogeniċità

Židiet sinifikanti fl-antikorp (imkejla permezz ta' ELISA) kienu osservati għas-serotipi tat-tilqim kollu wara serje primarja bi tliet dozi ta' Prevenar fit-trabi u wara dozi *booster*, għalkemm il-koncentrazzjonijiet medji ġeometriċi varjaw bejn is-7 serotipi. Intwera wkoll li Prevenar jikkaġuna antikorpi funzjonali (kif imkejla permezz ta' opsonofagoċitosi) għas-serotipi kollha tat-tilqima wara s-serje primarja. Il-persistenza fit-tul tal-antikorpi ma kinitx investigata wara l-ghoti ta' serje primarja fit-trabi flimkien ma' *booster* jew wara l-ghoti ta' dozi *priming* waħidhom lil tfal ikbar. L-ghoti ta' polysaccharides pnevmokokkali mhux konjugati fl-eġa ta' 13-il xahar wara s-serje primarja bi Prevenar, ikkawża rispons anamnesticu tal-antikorp għas-7 serotipi inklużi fit-tilqima, li jindika li l-*priming* kien seħħ.

L-immunogeniċità ta' serje primarja b'żewġ dozi fit-trabi flimkien ma' *booster* bejn wieħed u iehor fl-eġa ta' sena, kienet dokumentata f'diversi studji. Il-biċċa l-kbira tad-dejta indikat li porzjonijiet iżgħar ta' trabi laħqu koncentrazzjonijiet ta' antikorpi ta'  $\geq 0.35 \mu\text{g/ml}$  (ir-referenza tal-koncentrazzjoni tal-antikorp rakkomandata mill-WHO)<sup>1</sup> kontra serotipi 6B u 23F wara serje primarja b'żewġ dozi mqabbla direttament jew indirettament ma' serje primarja bi tliet dozi. Flimkien ma' dan, il-GMCs kienu iktar baxxi għall-antikorpi għall-biċċa l-kbira tas-serotipi wara serje tat-trabi b'żewġ dozi milli b'serje tat-trabi bi tliet dozi. Madankollu, ir-risponsi tal-antikorp għal dozi *booster* fit-trabi wara serje tat-trabi ta' żewġ dozi jew serje tat-trabi ta' tliet dozi kienu komparabbli għas-7 serotipi kollha tat-tilqima u indikaw li ż-żewġ korsijiet tat-trabi kisbu *priming* adegwat.

Židiet sinifikanti fl-antikorp (imkejla permezz ta' ELISA) għas-serotipi kollha tat-tilqima kienu osservati wara l-ghoti ta' dozi waħidhom ta' Prevenar lil tfal li kellhom minn sentejn sa 5 snin. Il-koncentrazzjonijiet tal-antikorp kienu simili għal dawk li nkisbu wara serje tat-trabi bi tliet dozi u doża (*booster*) li nġataw lil trabi ta' inqas minn sentejn. Ma sarux provi dwar l-effikaċja fil-popolazzjoni ta' pazjenti ta' minn sentejn sa 5 snin.

L-effikaċja tal-prova klinika tas-serje primarja tat-trabi b'żewġ dozi flimkien ma' *booster*, ma kinitx stabbilita, u l-konsegwenzi kliniċi ta' koncentrazzjonijiet iktar baxxi ta' antikorpi kontra serotipi 6B u 23F wara s-serje tat-trabi b'żewġ dozi mhumiex magħrufa.

#### L-effikaċja kontra mard invażiv

Stimi tal-effikaċja kontra mard invażiv inkisbu fil-popolazzjoni Amerikana, fejn il-kopertura tas-serotip tat-tilqima varjat minn 80 sa 89%. Informazzjoni epidemjoloġika bejn is-sena 1988 u 2003 indikat li fl-Ewropa, il-kopertura hi iktar baxxa u tvarja minn pajjiż għall-iehor. Konsegwentement, Prevenar għandu jkopri bejn 54% u 84% tal-iżolati minn mard pnevmokokkali invażiv (*invasive pneumococcal disease* - IPD) fi tfal Ewropej li għandhom inqas minn sentejn. Fi tfal Ewropej ta' bejn sentejn u 5 snin, Prevenar għandu jkopri madwar 62% sa 83% tal-iżolati kliniċi responsabbli għal mard pnevmokokkali invażiv. Hu stmat li iktar minn 80% tar-razez reżistenti kontra l-mikrobi ser ikunu koperti mis-serotipi inklużi fit-tilqima. Il-kopertura tas-serotip tat-tilqima fil-popolazzjoni pedjatrika tonqos hekk kif l-eġa tizdied. It-tnaqqis fl-inċidenza ta' IPD li kienet osservata fi tfal akbar tista' tkun parzjalment minhabba l-immunità miksuba b'mod naturali.

<sup>1</sup> Rapport tekniku tal-WHO Nru. 927, 2005; Appendix serological criteria for calculation and licensure of new pneumococcal conjugate vaccine formulations for use in infants (Appendiċi tal-kriterji seroloġiċi għall-kalkulazzjoni u l-illieċenzjar ta' formulazzjonijiet ġodda ta' tilqim b'konjugat pnevmokokkali għall-użu fit-trabi).

L-effikaċja kontra mard invażiv kienet evalwata fi prova fuq skala kbira, *randomised, double-blind*, f'popolazzjoni multi-etnika f'Kalifornja tat-Tramuntana (prova Kaiser Permanente). Iktar minn 37,816 tarbija ngħataw tilqima jew bi Prevenar, jew b'tilqima tal-kontroll (tilqima ta' grupp Ċ konjugat meningokokkali), wara 2, 4, 6 u 12-15-il xahar. Fiż-żmien tal-istudju, is-serotipi inkluzi fit-tilqima ammontaw għal 89% tal-IPD.

Total ta' 52 każ ta' mard invażiv ikkawżat minn serotipi tat-tilqima, akkumula f'perjodu *blinded follow-up* sal-20 t'April, 1999. L-istima ta' l-effikaċja speċifika għas-serotip tat-tilqima kienet ta' 94% (95% CI: 81, 99) fil-popolazzjoni *intent-to-treat* u 97% (95% CI: 85, 100) fil-popolazzjoni skont il-protokoll (imlaqqma b'mod shih) (40 każ). Fl-Ewropa, l-istimi tal-effettività fit-tfal ta' inqas minn sentejn ivarjaw minn 51% sa 79% meta tikkunsidra l-kopertura tat-tilqima kontra serotipi li jikkawżaw mard invażiv.

#### L-effikaċja kontra l-pnewmonja

Fil-prova Kaiser Permanente, l-effikaċja kienet ta' 87.5% (95% CI: 7, 99) kontra l-pnewmonja batteremika minhabba s-serotipi tat-tilqima ta' *S. pneumoniae*.

L-effettività (ma saret l-ebda konferma mikrobijoloġika tad-dijanjosi) kontra l-pnewmonja mhux batteremika kienet evalwata wkoll. Minhabba li hafna patoġeni, hlief is-serotipi pnewmokokkali rappreżentati fit-tilqima, jistgħu jikkontribwixxu għall-inċidenza tal-pnewmonja fit-tfal, il-protezzjoni kontra l-pnewmonja klinika kollha hi mistennija li tkun iktar baxxa mill-għal mard pnewmokokkali invażiv. Fil-prova skont il-protokoll, it-tnaqqis fl-istima tar-riskju għall-ewwel episodju ta' pnewmonja klinika b'*x-ray* anormali tas-sider (definit bħala l-preżenza ta' infiltrati, effużjoni jew konsolidazzjoni) kien ta' 35% (95% CI: 4, 56).

#### L-effikaċja kontra infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna

L-infjammazzjoni akuta fil-parti tan-nofs tal-widna (*acute otitis media* - AOM) hi marda komuni tat-tfulija b'etjoloġiji differenti. Il-batterji jistgħu jkunu responsabbli għal 60-70% tal-episodji kliniċi ta' AOM. Il-pnewmokokkus hu responsabbli għal 30-40% tal-AOMs batterjali kollha u għal porzjon akbar ta' AOM severa. Teoretikament, Prevenar jista' jevita madwar 60-80% tas-serotipi li jikkawżaw AOM pnewmokokkali. Hu s-mat li Prevenar jista' jevita 6-13% tal-episodji kliniċi kollha ta' AOM.

L-effikaċja ta' Prevenar kontra infjammazzjoni akuta fil-parti tan-nofs tal-widna (*acute otitis media* - AOM) kienet evalwata fi prova klinika *randomised, double blind*, fuq 1,662 tarbija Finlandizi li ngħataw tilqima jew bi Prevenar, jew b'tilqima tal-kontroll (tilqima kontra l-Epatite B), wara 2, 4, 6 u 12-15-il xahar ta' età. L-istima għall-effikaċja tat-tilqima kontra t-tilqima-serotip AOM, ir-risultat aħhari primarju tal-prova, kienet ta' 57% (95% CI: 44, 67) fl-analiżi skont il-protokoll u 54% (95% CI: 41, 64) fl-analiżi *intent-to-treat*. Żieda ta' 33% (95% CI: -1, 80) fl-AOM minhabba serogruppi li ma kinux inkluzi fit-tilqima kienet osservata f'pazjenti immunizzati. Madankollu, il-benefiċċju totali kien ta' tnaqqis ta' 34% (95% CI: 21, 45) fl-inċidenza tal-AOMs pnewmokokkali kollha. L-impatt tat-tilqima fuq in-numru totali ta' episodji ta' infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna irrispettivament mill-etjoloġija kien ta' tnaqqis ta' 6% (95% CI: -4, 16).

Sottosett ta' tfal f'dan l-istudju kienu segwiti sakemm kellhom minn 4 sa 5 snin. F'dan il-*follow-up*, l-effikaċja tat-tilqima għal OM frekwenti (definita bħala mill-anqas 3 episodji fi żmien 6 xhur) kienet ta' 18% (95% CI: 1, 32), għal infjammazzjoni kronika fil-parti tan-nofs tal-widna b'effużjoni, 50% (95% CI: 15, 71), u għat-tqeghid ta' tubu tat-timpanostomija, 39% (95% CI: 4, 61).

L-effikaċja ta' Prevenar kontra AOM kienet evalwata bħala rizultat aħhari sekondarju fil-prova Kaiser Permanente. It-tfal kienu segwiti sa meta kellhom 3.5 snin. L-impatt tat-tilqima fuq in-numru totali ta' episodji ta' infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna irrispettivament mill-etjoloġija kien ta' tnaqqis ta' 7% (95% CI: 4, 10). L-effett tat-tilqima fl-analiżi skont il-protokoll kien tnaqqis ta' 9% (95% CI: 3, 15) f'AOM rikorrenti (definita bħala 3 episodji f'sitt xhur jew 4 episodji f'sena) jew tnaqqis ta' 23% (95% CI: 7, 36) għal AOM rikorrenti (5 episodji f'sitt xhur jew 6 episodji f'sena). Il-



frekwenza tat-tqeghid ta' tubu tat-timpanostomija tnaqqset b'24% (95% CI: 12, 35) fl-analizi skont il-protokoll u 23% (95% CI: 11, 34) fl-analizi *intent-to-treat*.

### Effettività

L-effettività ta' Prevenar kontra IPD (i.e. li kienet tinkludi l-protezzjoni moghtija mit-tilqima u mill-immunità tal-'merhla' minhabba t-trasmissjoni mnaqqsa tas-serotipi tat-tilqima fil-popolazzjoni) kienet evalwata fi programmi nazzjonali ta' immunizzazzjoni li jużaw serje tat-trabi bi tliet dozi jew b'żewġ dozi, kull waħda b'dozi *booster*.

Fl-Istati Uniti tal-Amerika, tilqim ġeneralizzat bi Prevenar bl-użu ta' serje b'erba' dozi fit-trabi u programm *catch-up* għal tfal sa 5 snin kien introdott fis-sena 2000. L-effettività tat-tilqima kontra IPD ikkawżata minn serotipi tat-tilqima kienet evalwata fi tfal li kellhom minn 3 sa 59 xahar, fl-ewwel erba' snin tal-programm ta' implimentazzjoni. Meta mqabbel mal-ebda t-tilqima, *point estimates* għall-effettività ta' 2, 3, jew 4 dozi moghtija fuq skeda tat-trabi kienu simili: 96% (95% CI 88-99); 95% (95% CI 88-99); u 100% (95% CI 94-100), rispettivament. Fl-Istati Uniti tal-Amerika l-istess perjodu ta' żmien, kien hemm tnaqqis ta' 94% fit-tip ta' tilqima IPD f'individwi li kellhom inqas minn 5 snin, meta mqabbla mal-linja bażi ta' qabel it-tilqima (1998/99). Fl-istess żmien kien hemm tnaqqis ta' 62% fit-tip ta' tilqima IPD f'individwi li kellhom iktar minn 5 snin. Dan l-effett indirett jew 'tal-merhla' hu minhabba tnaqqis fit-trasmissjoni tas-serotipi tat-tilqima minn tfa' żgħir li kienu mlaqqma mill-bqija tal-popolazzjoni u jikkoinċidi mat-tnaqqis tal-*carriage* nażofaringeali tas-serotipi tat-tilqima.

Fi Quebec, Canada Prevenar kien introdott f'età ta' 2, 4 u 12-il xahar bi programm ta' doża waħda *catch-up* fi tfal li kellhom sa 5 snin. Fl-ewwel sentejn tal-programm, b'kopertura ta' iktar minn 90%, l-effettività osservata kontra l-IPD ikkawżata minn serotipi tat-tilqima kienet ta' 93% (95% CI 75-98) għas-serje ta' 2 dozi lit-trabi, u 100% (95% CI 91-100) għall-skeda kompluta.

Dejta preliminari mill-Ingilterra u Wales irrappurta a nqas minn sena wara l-introduzzjoni ta' immunizzazzjoni ta' rutina fl-età ta' 2, 4 u 13-il xahar, bi programm ta' doża waħda *catch-up* għal tfal li kellhom minn 13 sa 23 xahar, issuġġeriet li l-effettività ta' din l-iskeda tista' tkun iktar baxxa kontra serotip 6B milli kontra s-serotipi oħrajn tat-tilqima.

L-effettività ta' serje primarja b'żewġ dozi ma kinitx stabbilita kontra l-pnewmonja jew infjammazzjoni akuta fil-parti tan-nofs tal-widna.

### Dejta addizzjonali dwar l-immunogeniċità

L-immunogeniċità ta' Prevenar kienet investigata fi studju *open-label*, multicentriku f'49 tarbija bil-marda taċ-ċelluli *sickle cell* it-tfal kienu mlaqqma bi Prevenar (3 dozi b'intervall ta' xahar bejniethom mill-età ta' xahrejn) u 46 minn dawn it-tfal irċievew ukoll tilqima tal-polysaccharide pnewmokokkali bi 23 valent fl-età ta' 15-18-il xahar. Wara l-immunizzazzjoni primarja, 95.6% tat-tfal kellhom livelli ta' antikorpi ta' mill-anqas 0.35 µg/ml għas-seba' serotipi kollha li jinsabu fi Prevenar. Żieda sinifikanti kienet osservata fil-konċentrazzjonijiet ta' antikorpi kontra s-seba' serotipi wara t-tilqima bil-polysaccharide, li tissuġġerixxi li l-memorja immunoloġika kienet stabbilita sew.

### **5.2 Taghrif farmakokinetiku**

Mhux applikabbli.

### **5.3 Taghrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-medicina**

Studju dwar it-tossiċità ta' dozi ripetuti moghtija ġol-muskoli (13-il ġimgħa, 5 injezzjonijiet, waħda kull tliet ġimgħat) tat-tilqima tal-konjugat pnewmokokkali fil-fniek, ma żvela l-ebda evidenza ta' kwalunkwe effetti tossiċi sinifikanti lokali jew sistemici.

Studju dwar it-tossicità ta' dozi ripetuti moghtija taht il-gilda (13-il ġimgħa, 7 injezzjonijiet tad-doża klinika, waħda kull ġimgħtejn, segwiti minn perjodu ta' rkupru ta' 4 ġimgħat) ta' Prevenar fil-firien u x-xadini, ma żvela l-ebda evidenza ta' kwalunkwe effetti tossiċi sinifikanti lokali jew sistemici.

## **6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU**

### **6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi**

Sodium chloride  
Ilma għall-injezzjonijiet

### **6.2 Inkompatibilitajiet**

Minhabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott mediċinali m'għandux jithallat ma' prodotti mediċinali oħrajn.

### **6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali**

3 snin

### **6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna**

Ahżen fi friġġ (2°C – 8°C).  
Tagħmlux fil-friza.

### **6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm go fil.**

0.5 ml suspensjoni għall-injezzjoni f'kunjett (hgieg ta' Tip I) b'tapp griż tal-lastku tal-butyl.

Daqsijiet tal-pakkett:  
Kunjett 1 jew 10 kunjetti mingħajr siringa/labar.

Kunjett 1 b'siringa u 2 labar (1 biex tiġled, 1 għall-injezzjoni).

Jista' jkun li mhux il-pakketti ad-daqsijiet kollha jkun għall-skop kummerċjali

### **6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittiehdu meta jintrema u għal immaniġġar iehor**

Meta jinħażen, derozitu abjad u *supernatant* ċar jista' jkun osservat.

It-tilqima għandha tithawwad tajjeb biex tinkiseb suspensjoni bajda omogenja, u tkun eżaminata viżwalment għal kwalunkwe frak u/jew varjazzjoni tal-aspett fiżiku, qabel ma tingħata. Tużahiex jekk il-kontenitur ma jkunx hekk.

Kull idal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-igijiet lokali.

## **7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/00/167/001

EU/1/00/167/002

EU/1/00/167/005

**9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 02/02/2001

Data ta' l-aħħar tiġdid: 02/02/2011

**10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta' l-Aġenzija Ewropeja  
dwar il-Mediċini <http://www.ema.europa.eu>

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati

## 1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pneumokokkali, adsorbita

## 2. GHAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' 0.5 ml fiha:

Serotip polysaccharide pneumokokkali 4*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pneumokokkali 6B*	4 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pneumokokkali 9V*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pneumokokkali 14F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pneumokokkali 18C*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pneumokokkali 19F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pneumokokkali 23F*	2 mikrogrammi

\* Konjugat -għall-proteina *carrier* CRM<sub>197</sub> u adsorbit fuq aluminium phosphate (0.5 mg)

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

## 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest.

It-tilqima hi suspensjoni bajda omogena.

## 4. TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Tilqima attiva kontra mard ikkawżat minn *Streptococcus pneumoniae* serotipi 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F u 23F (li jinkludi sepsis, meningite, pneumonja, batteremija u infjammazzjoni akuta fil-parti tan-nofs tal-widna) fi trabi u fi tfal minn xahrejn sa 5 snin (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u 5.1).

Għan-numru ta' doži li jridu jingħataw fil-gruppi differenti ta' età, ara sezzjoni 4.2.

L-użu ta' Prevenar għandu jkun stabbilit fuq il-baži ta' rakkomandazzjonijiet uffiċjali, li jikkunsidraw l-impatt ta' mard invażiv fi gruppi differenti ta' età, kif ukoll il-varjabilità tal-epidemjoloġija tas-serotip f' zoni ġeografiċi differenti (ara sezzjonijiet 4.4, 4.8 u 5.1).

### 4.2 Fożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

#### Fożoloġija

L-iskedi tal-immunizzazzjoni għal Prevenar għandhom ikunu bbażati fuq rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Trabi ta' bejn 2 - 6 xhur:

Is-serje primarja tat-trabi tikkonsisti fi tliet doži, kull waħda ta' 0.5 ml. L-ewwel doża normalment tingħata meta t-tarbija jkollha xahrejn, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži. Ir-raba' doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Alternattivament, meta Prevenar jingħata bhala parti minn programm ta' rutina ta' immunizzazzjoni lit-trabi, tista' tkun ikkunsidrata skeda b'żewġ doži. L-ewwel doża tista' tingħata mill-età ta' xahrejn,

bit-tieni doża li tinghata mill-inqas xahrejn wara, u t-tielet doża (*booster*) li tinghata fl-età ta' 11-15-il xahar (ara sezzjoni 5.1)

Trabi akbar u tfal li ma ngħatawx tilqima qabel:

Trabi ta' bejn 7 - 11-il xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži. It-tielet doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Tfal li għandhom bejn 12 - 23 xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahrejn bejn id-doži.

Tfal li għandhom bejn 24 xahar – 5 snin: doża waħda.

Il-ħtieġa ta' doża *booster* wara dawn l-iskedi ta' immunizzazzjoni ma kinitx stabbilita.

Metodu ta' kif għandu jinghata

It-tilqima għandha tinghata permezz ta' injezzjoni ġol-muskoli. Is-siti ppreferuti huma n-nana anterolaterali tal-koxxa (muskolu *vastus lateralis*) fit-trabi, jew il-muskolu deltojd tan-naħa ta' fuq tad-driegħ fi tfal żgħar.

### 4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal xi sustanzi mhux attivi, jew għat-*toxoid* tad-difterite.

Bhal fil-każ ta' tilqim iehor, l-ġhoti ta' Prevenar għandu jkun possibbli li jbatu minn mard b'deni akut jew sever. Madankollu, il-preżenza ta' infezzjoni żgħira, bhal rih, m'għandhiex tirriżulta fid-differiment tat-tilqima.

### 4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Bħat-tilqim kollu li jista' jiġi injettat, il-kura u s-supervizjoni medika adattata għandhom dejjem ikunu disponibbli fil-pront f'każ ta' avveniment anafatiku rari wara l-ġhoti tat-tilqima.

Tagħtix Prevenar minn ġol-vina.

Ir-riskju potenzjali ta' apnea u l-ħtieġa għal monitoraġġ respiratorju għal 48-72 siegħa għandhom ikunu kkunsidrati meta tagħti l-serje tal-immunizzazzjoni primarja lil trabi prematuri hafna (li twieldu wara ≤ 28 ġimgħa ta' tqala) u partikularment lil dawk li kellhom storja medika ta' immaturità respiratorja. Minhabba li l-benefiċċju tat-tilqima hu għoli f'dan il-grupp tat-trabi, it-tilqima m'għandhiex tinżamn jew tkun ittardjata.

Prevenar mhux ser jipproteġi kontra serotipi oħrajn ta' *Streptococcus pneumoniae* hliet dawk inklużi fit-tilqima, jew kontra mikro-organizmi oħrajn li jikkawżaw mard invażiv jew infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna.

Din it-tilqima m'għandhiex tinghata lil trabi jew lil tfal li għandhom it-tromboċitopenja jew kwalunkwe disturb tal-koagulazzjoni li minhabba fih l-injezzjoni ġol-muskoli tkun kontraindikata, hliet jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq b'mod ċar ir-riskju tal-ġhoti.

Għalkemm xi rispons tal-antikorpi għat-*toxoid* tad-difterite jista' jseħh, l-immunizzazzjoni b'din it-tilqima ma tissostwixxi l-immunizzazzjoni ta' rutina kontra d-difterite

Għal tfal minn sentejn sa 5 snin, intużat skeda ta' immunizzazzjoni li kienet tikkonsisti f'doża waħda. Rata oghla ta' reazzjonijiet lokali kienet osservata fi tfal li kellhom iktar minn 24 xahar, meta mqabbla mat-trabi (ara sezzjoni 4.8).

Tfal b'indeboliment fir-rispons immuni, kemm jekk dan isehh minhabba l-użu ta' terapija immunosoppressiva, difett ġenetiku, infezzjoni bl-HIV, jew kawżi oħrajn, jista' jkollhom tnaqqis fir-rispons tal-antikorpi għall-immunizzazzjoni attiva.

Dejta limitata wriet li Prevenar (serje primarja bi tliet doži) jikkaguna rispons immuni aċċettabbli fi trabi li għandhom il-marda taċ-ċelluli *sickle*, bi profil tas-sigurtà simili għal dak osservat fi gruppi li mhux qegħdin f'riskju għoli (ara sezzjoni 5.1). Dejta dwar is-sigurtà u l-immunogeniċità għandhom mhumiex disponibbli għal tfal fi gruppi oħrajn speċifiċi li qegħdin f'riskju għoli għal mard pnemkokkali invażiv (eż. tfal b'disfunzjoni kongenitali oħra jew b'disfunzjoni miksuba tal-milsa, li huma infettati bl-HIV, li għandhom malinn, u li għandhom sindrome nefrotiku). It-tilqima fi gruppi li qegħdin f'riskju għoli għandha tkun ikkunsidrata fuq bażi individwali.

Tfal ta' taht is-sentejn għandhom jirċievu s-serje ta' tilqim ta' Prevenar li hi adattata għall-età tagħhom (ara sezzjoni 4.2). L-użu ta' tilqima konjugata pnemkokkali ma tissostitwixxi l-użu ta' tilqim tal-polysaccharide pnemkokkali li fih 23 valent fit-tfal  $\geq$  ta' 24 xahar b'kundizzjonijiet (bħall-marda taċ-ċelluli *sickle*, asplinja, infezzjoni bl-HIV, mard kroniku jew li huma immunokompromessi) li jpoġġuom f'riskju ogħla għal mard invażiv minhabba *Streptococcus pneumoniae*. F'jiżi ikun rakkomandat, it-tfal f'riskju li għandhom  $\geq$  24 xahar u li jkunu diġà tlaqqmu bi Prevenar, għandhom jirċievu tilqima tal-polysaccharide pnemkokkali li fiha 23 valent. L-intervall bejn it-tilqima tal-konjugat pnemkokkali (Prevenar) u t-tilqima tal-polysaccharide pnemkokkali li fiha 23 valent, m'għandux ikun ta' inqas minn 8 ġimgħat. M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli li tindika jekk l-għoti ta' tilqima tal-polysaccharide pnemkokkali li fiha 23 valent, li tfal li ma jkunux tlaqqmu, jew lil tfal li jkunu diġà tlaqqmu bi Prevenar, jistax jirriżulta f'rispons eċċessiv għal doži addizzjonali ta' Prevenar.

Meta Prevenar jingħata flimkien ma' tilqim eżavalenti (DTaP/HiB(PRIP-T)/IPV/HepB), it-tabib għandu jkun konxju li dejta minn studji kliniċi tindika li r-rata ta' reazzjonijiet bid-deni kienet ogħla meta mqabbla ma' dik li ssehh wara l-għoti ta' tilqim eżavalenti wandu. Dawn ir-reazzjonijiet kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom moderati (inqas minn jew 39°C) u kienu temporanji (ara sezzjoni 4.8).

Il-kura kontra d-deni għandha tinbeda skont il-linji gwida lokali tal-kura.

Mediċina profilattika kontra d-deni hi rakkomandata:

- għat-tfal kollha li jkunu qed jirċievu Prevenar fl-istess hin ma' tilqim li jkun fih *whole cell pertussis* minhabba rata ogħla ta' reazzjonijiet bid-deni (ara sezzjoni 4.8).
- għat-tfal li jkollhom il-puplesiji, jew li jkollhom passat mediku ta' puplesiji kkawżati mid-deni.

Bhal ma jiġri bi kwalunkve tilqima, Prevenar jista' ma jipproteġix l-individwi kollha li jkunu qed jirċievu t-tilqima kontra l-marda pnemkokkali. Flimkien ma' dan, għas-serotipi tat-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun iktar baxxa b'mod sostanzjali milli minn protezzjoni kontra l-mard invażiv. Minhabba li l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi kkawżata minn hafna organiżmi li mhumiex serotipi pnemkokkali rappreżentati fit-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjonijiet kollha fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun baxxa (ara sezzjoni 5.1).

#### **4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jablux ma' dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott**

Prevenar jista' jingħata fl-istess hin ma' tilqim pedjatriku ieħor skont l-iskedi rakkomandati tal-immunizzazzjoni. Tilqim differenti li jista' jiġi injettat għandu dejjem jingħata f'siti differenti tal-injezzjoni.

Ir-rispons immuni għat-tilqim pedjatriku ta' rutina mogħti flimkien ma' Prevenar f'siti differenti tal-injezzjoni, kien evalwat f'7 studji kliniċi kkontrollati. Ir-rispons tal-antikorpi għat-tilqim bil-konjugat tal-proteina tat-tetnu Hib (PRP-T), tetnu u Epatite B (HepB) kien simili għall-kontrolli. Għat-tilqim konjugat Hib ibbażat fuq is-CRM, kien osservat titjib fir-risponsi tal-antikorpi għall-Hib u d-diferite fis-serje ta' tilqim li tingħata lit-trabi. Meta ngħata l-*booster*, xi trazzin tal-livell tal-antikorpi Hib kien

osservat, iżda t-tfal kollha kellhom livelli protettivi. Tnaqqis inkonsistenti fir-rispons għall-antigeni tal-pertussis, kif ukoll għat-tilqima tal-polio inattivata (*inactivated polio vaccine - IPV*) kien osservat. Ir-rilevanza klinika ta' dawn l-interazzjonijiet mhijiex magħrufa. Rizultati limitati minn studji *open label* urew rispons aċċettabbli għall-MMR u l-ġidri r-rih.

Dejta dwar l-ghoti fl-istess hin ta' Prevenar ma' Infanrix hexa (tilqima DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB) ma wriet l-ebda interferenza klinikament rilevanti fir-rispons tal-antikorpi għal kull wiehed mill-antigeni individwali, meta mogħtija bħala tilqima primarja ta' 3 doži.

Dejta suffiċjenti dwar l-interferenza meta jsir l-ghoti fl-istess hin ta' tilqim ieħor eżivalenti flimkien ma' Prevenar, bħalissa mhijiex disponibbli.

Fi prova klinika li qabblat l-ghoti separat mal-ghoti fl-istess hin ta' Prevenar (tliet doži wara 2, 3.5, 6 xhur u doża *booster* wara madwar 12-il xahar) u Meningitec (tilqima konjugata Ċ meningokokkali; żewġ doži wara xahrejn u 6 xhur u doża *booster* wara madwar 12-il xahar), ma kien hemm l-ebda evidenza ta' interferenza immuni bejn iż-żewġ tilqimiet konjugati wara s-serje primarja se je jew wara d-doži *booster*.

#### 4.6 Fertilità, tqala u treddigh

Prevenar mhux intenzjonat għall-użu fl-adulti. Dejta mill-bniedem dwar l-użu matul it-tqala jew it-treddigh u dwar ir-riproduzzjoni fl-animali, mhijiex disponibbli.

#### 4.7 Effetti fuq il-hila biex issuq u thaddem magni

Mhux rilevanti.

#### 4.8 Effetti mhux mixtieqa

Is-sigurtà tat-tilqima kienet evalwata fi studji kliniċi kontrollati differenti, li fihom iktar minn 18,000 tarbija b'saħħithom (età ta' minn 6 ġimgħat sa 18-il xahar) kienu inkluzi. Il-maġġoranza tal-esperjenza dwar is-sigurtà tiġi mill-prova dwar l-effikaċja li kienha 17,066 tarbija rċievew 55,352 doża ta' Prevenar. Flimkien ma' dan, is-sigurtà fi tfal akbar li ma kinux imlaqqa kienet evalwata.

Fl-istudji kollha, Prevenar ingħata fl-istess hin mat-tilqim rakkomandat li jingħata fi żmien it-tfulija.

Fost l-iktar reazzjonijiet avversi rrapportati b'mod komuni, kien hemm reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni u deni.

Ma kienet osservata l-ebda zieda konsistenti fir-reazzjonijiet lokali jew sistemici meta ngħataw doži ripetuti matul is-serje primarja jew bid-doża *booster*, bl-eċċezzjonijiet ikunu rata oghla ta' sensitività temporanja (36.5%) u sensitività li interferixxiet mal-moviment tar-riglejn jew tad-dirghajn (18.5%) li kienu osservati bid-doża *booster*.

Fi tfal akbar li kienu qed jirċievu doża waħda tat-tilqima, rata oghla ta' reazzjonijiet lokali kienu osservati iktar minn dak li kien deskritt qabel fi żmien it-tfulija. Dawn ir-reazzjonijiet kienu primarjament temporanji fin-natura tagħhom. Fi studju li sar wara li nħarġet il-liċenzja għal dan il-prodott, li kien jinvolvi 115 tifel u tifla li kellhom bejn sentejn u 5 snin, is-sensittività kienet irrappurtata f'sa 39.1% tat-tfal; fi 15.7% tat-tfal, is-sensittività interferixxiet mal-moviment tar-riglejn jew tad-dirghajn. Il-hmura kienet irrappurtata f'40.0% tat-tfal, u l-ebusija kienet irrappurtata fi 32.2% tat-tfal. Il-hmura jew l-ebusija ta'  $\geq 2$  ċm fid-dijametru kienet irrappurtata fi 22.6% u fi 13.9% tat-tfal rispettivament.

Meta Prevenar jingħata flimkien ma' tilqim eżivalenti (DTaP/Hib(PRP-T)/IPV/HepB), deni b'temperatura ta'  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  kull doża kien irrappurtat fi 28.3% sa 48.3% tat-trabi fil-grupp li kien qed jirċievi Prevenar u t-tilqima eżivalenti fl-istess hin meta mqabbel ma' 15.6% sa 23.4% fil-grupp li kien qed jirċievi t-tilqima eżivalenti waħidha. Deni b'temperatura ta' iktar minn  $39.5^{\circ}\text{C}$  kull doża

kien osservat f'0.6 sa 2.8% tat-trabi li kienu qed jirċievu Prevenar u tilqim eżivalenti (ara sezzjoni 4.4).

Ir-reazzjoġeneċità kienet oghla fi tfal li kienu qed jirċievu tilqim *whole cell pertussis* fl-istess hin. Fi studju, li kien jinkludi 1,662 tifel/tifla, deni b'temperatura ta'  $\geq 38^{\circ}\text{C}$  kien irrappurtat f'41.2% tat-tfal li rċievu Prevenar fl-istess hin ma' DTP meta mqabbel ma' 27.9% fil-grupp tal-kontroll. Deni b'temperatura ta'  $> 39^{\circ}\text{C}$  kien irrappurtat fi 3.3% tat-tfal meta mqabbel ma' 1.2% fil-grupp tal-kontroll.

Reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-provi kliniċi jew mill-esperjenza ta' wara t-tqeghid fis-suq huma elenkati fit-tabella li ġejja skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi u skont il-frekwenza, u dan japplika għall-gruppi kollha tal-età.

Il-frekwenza hi definita kif ġej:

Komuni ħafna ( $\geq 1/10$ )

Komuni ( $\geq 1/100$  sa  $< 1/10$ )

Mhux komuni ( $\geq 1/1,000$  sa  $< 1/100$ )

Rari ( $\geq 1/10,000$  sa  $< 1/1,000$ )

Rari ħafna ( $< 1/10,000$ )

F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mnizzla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitnizzlu l-ewwel.

Disturbi tad-demem u tas-sistema limfatika:

Rari ħafna: Limfadenopatija lokalizzata fiż-zona ta' sit tal-injezzjoni

Disturbi fis-sistema immuni:

Rari: Reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva bħal reazzjonijiet anafilattiċi/anafilattojdi li jinkludu xokk, edema anġjonewrotika, bronkospazmu, qtugħ ta' nifs, edema tal-wieċ.

Disturbi fis-sistema nervuża:

Rari: Puplesiji, li jinkludu puplesiji kkawżati mid-deni.

Disturbi gastro-intestinali:

Komuni ħafna: Rimotta, dijarea, nuqqas t'aptit.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta' taht il-ġilda:

Mhux komuni: Raxx/urtikarja.

Rari ħafna: Eritema multiforme.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

Komuni ħafna: Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni (eż. eritema, ebusija/nefha, uġiġh/sensittività); deni  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , irritabilità, biki, nġhas, irqad bla kwiet.

Komuni: Nefha/ebusija fis-sit tal-injezzjoni u eritema  $> 2.4$  ċm, sensitività li tinterferixxi mal-moviment, deni  $> 39^{\circ}\text{C}$ .

Rari: Episodju iporisponsiv ipotoniku, reazzjonijiet ta' sensitività eċċessiva fis-sit tal-injezzjoni (eż., dermatite, ħakk, urtikarja), fwawar.

Apnea fi trabi prematuri ħafna ( $\leq 28$  ġimġha ta' tqala) (ara sezzjoni 4.4).

#### 4.9 Doża eċċessiva

Kien hemm rapporti ta' doża eċċessiva bi Prevenar, li jinkludu każijiet ta' għoti ta' doża li kienet oghla minn dik rakkomandata, u każijiet ta' doži sussegwenti li ngħataw iktar kmieni miż-żmien rakkomandat (i.e. qrib wisq tad-doża ta' qabel). L-ebda effetti mhux mixtieqa ma kienu rrappurtati fil-



maġġoranza tal-individwi. B' mod ġenerali, ir-reazzjonijiet avversi rrapportati b' doża eċċessiva kienu wkoll irrappurtati b' doži waħdanin irrakkomandati ta' Prevenar.

## 5. TAGHRIF FARMAKOLOĠIKU

### 5.1 Taghrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: tilqim pnevmokokkali, Kodiċi ATC: J07AL02

#### Immunogeniċità

Židiet sinifikanti fl-antikorp (imkejla permezz ta' ELISA) kienu osservati għas-serotipi tat-tilqim kollha wara serje primarja bi tliet doži ta' Prevenar fit-trabi u wara doži *booster*, għalkemm il-konċentrazzjonijiet medji ġeometriċi varjaw bejn is-7 serotipi. Intwera wkoll li Prevenar jikkawna antikorpi funzjonali (kif imkejla permezz ta' opsonofagoċitosi) għas-serotipi kollha tat-tilqima wara s-serje primarja. Il-persistenza fit-tul tal-antikorpi ma kinitx investigata wara l-ghoti ta' serje primarja fit-trabi flimkien ma' *booster* jew wara l-ghoti ta' doži *priming* waħidhom lil tfal iktar. L-ghoti ta' polysaccharides pnevmokokkali mhux konjugati fl-età ta' 13-il xahar wara s-serje primarja bi Prevenar, ikkawża rispons anamnesticu tal-antikorp għas-7 serotipi inklużi fit-tilqima, li jindikaw li l-*priming* kien seħh.

L-immunogeniċità ta' serje primarja b'żewġ doži fit-trabi flimkien ma' *booster* bejn wieħed u ieħor fl-età ta' sena, kienet dokumentata f'diversi studji. Il-biċċa l-kbira tad-dejta indikat li porzjonijiet iżgħar ta' trabi laħqu konċentrazzjonijiet ta' antikorpi ta'  $\geq 0.35 \mu\text{g/ml}$  (ir-referenza tal-konċentrazzjoni tal-antikorp rakkomandata mill-WHO)<sup>2</sup> kontra serotipi 6B u 23F wara serje primarja b'żewġ doži mqabbla direttament jew indirettament ma' serje primarja bi tliet doži. Flimkien ma' dan, il-GMCs kienu iktar baxxi għall-antikorpi għall-biċċa l-kbira tas-serotipi wara serje tat-trabi b'żewġ doži milli b' serje tat-trabi bi tliet doži. Madankollu, ir-rispons ta' antikorp għal doži *booster* fit-trabi wara serje tat-trabi ta' żewġ doži jew serje tat-trabi ta' tliet doži kienu komparabbli għas-7 serotipi kollha tat-tilqima u indikaw li ż-żewġ korsijiet tat-trabi kienu *priming* adegwat.

Židiet sinifikanti fl-antikorp (imkejla permezz ta' ELISA) għas-serotipi kollha tat-tilqima kienu osservati wara l-ghoti ta' doži waħidhom ta' Prevenar lil tfal li kellhom minn sentejn sa 5 snin. Il-konċentrazzjonijiet tal-antikorp kienu simili għal dawk li nkisbu wara serje tat-trabi bi tliet doži u doża (*booster*) li nġataw lil trabi ta' inqas minn sentejn. Ma sarux provi dwar l-effikaċja fil-popolazzjoni ta' pazjenti ta' minn sentejn sa 5 snin.

L-effikaċja tal-prova klinika tas-serje primarja tat-trabi b'żewġ doži flimkien ma' *booster*, ma kinitx stabbilita, u l-konsegwenzi kliniċi ta' konċentrazzjonijiet iktar baxxi ta' antikorpi kontra serotipi 6B u 23F wara s-serje tat-trabi b'żewġ doži mhumiex magħrufa.

#### L-effikaċja kontra mard invażiv

Stim tal-effikaċja kontra mard invażiv inkisbu fil-popolazzjoni Amerikana, fejn il-kopertura tas-serotip tat-tilqima varjat minn 80 sa 89%. Informazzjoni epidemjoloġika bejn is-sena 1988 u 2003 indikat li fl-Ewropa, il-kopertura hi iktar baxxa u tvarja minn pajjiż għall-ieħor. Konsegwentement, Prevenar għandu jkopri bejn 54% u 84% tal-iżolati minn mard pnevmokokkali invażiv (*invasive pneumococcal disease* - IPD) fi tfal Ewropej li għandhom inqas minn sentejn. Fi tfal Ewropej ta' bejn sentejn u 5 snin, Prevenar għandu jkopri madwar 62% sa 83% tal-iżolati kliniċi responsabbli għal mard pnevmokokkali invażiv. Hu smat li iktar minn 80% tar-razez reżistenti kontra l-mikrobi ser ikunu koperti mis-serotipi inklużi fit-tilqima. Il-kopertura tas-serotip tat-tilqima fil-popolazzjoni

<sup>2</sup> Rapport tekniku tal-WHO Nru. 927, 2005; Appendix serological criteria for calculation and licensure of new pneumococcal conjugate vaccine formulations for use in infants (Appendiċi tal-kriterji seroloġiċi għall-kalkulazzjoni u l-illičenzjar ta' formulazzjonijiet ġodda ta' tilqim b'konjugat pnevmokokkali għall-użu fit-trabi).

pedjatrika tonqos hekk kif l-età tizdied. It-tnaqqis fl-inkidenza ta' IPD li kienet osservata fi tfal akbar tista' tkun parzjalment minhabba l-immunità miksuba b' mod naturali.

L-effikaċja kontra mard invażiv kienet evalwata fi prova fuq skala kbira, *randomised, double-blind*, f'popolazzjoni multi-etnika f'Kalifornja tat-Tramuntana (prova Kaiser Permanente). Iktar minn 37,816 tarbija ngħataw tilqima jew bi Prevenar, jew b'tilqima tal-kontroll (tilqima ta' grupp Ċ konjugat meningokokkali), wara 2, 4, 6 u 12-15-il xahar. Fiż-żmien tal-istudju, is-serotipi inklużi fit-tilqima ammontaw għal 89% tal-IPD.

Total ta' 52 każ ta' mard invażiv ikkawżat minn serotipi tat-tilqima, akkumula f'perjodu *blinded follow-up* sal-20 t'April, 1999. L-istima ta' l-effikaċja speċifika għas-serotip tat-tilqima kienet ta' 94% (95% CI: 81, 99) fil-popolazzjoni *intent-to-treat* u 97% (95% CI: 85, 100) fil-popolazzjoni skont il-protokoll (imlaqqma b' mod shiħ) (40 każ). Fl-Ewropa, l-istimi tal-effettività fit-tfal ta' inqas minn sentejn iwarjaw minn 51% sa 79% meta tikkunsidra l-kopertura tat-tilqima kontra serotipi li jikkawżaw mard invażiv.

#### L-effikaċja kontra l-pnewmonja

Fil-prova Kaiser Permanente, l-effikaċja kienet ta' 87.5% (95% CI: 7, 99) kontra l-pnewmonja batteremika minhabba s-serotipi tat-tilqima ta' *S. pneumoniae*.

L-effettività (ma saret l-ebda konferma mikrobijoloġika tad-dijanjożi, kontra l-pnewmonja mhux batteremika kienet evalwata wkoll. Minhabba li hafna patoġeni, hliet is serotipi pnewmokokkali rappreżentati fit-tilqima, jistgħu jikkontribwixxu għall-inkidenza ta' pnewmonja fit-tfal, il-protezzjoni kontra l-pnewmonja klinika kollha hi mistennija li tkun iktar baxxa milli għal mard pnewmokokkali invażiv. Fil-prova skont il-protokoll, it-tnaqqis fl-istima ta' ris'ju għall-ewwel episodju ta' pnewmonja klinika b'*x-ray* anormali tas-sider (definit bħala l-preżenza ta' infiltrati, effużjoni jew konsolidazzjoni) kien ta' 35% (95% CI: 4, 56).

#### L-effikaċja kontra infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna

L-infjammazzjoni akuta fil-parti tan-nofs tal-widna (*acute otitis media* - AOM) hi marda komuni tat-tfulija b'etjoloġiji differenti. Il-batterji jistgħu jkunu responsabbli għal 60-70% tal-episodji kliniċi ta' AOM. Il-pnewmokokkus hu responsabbli għal 30-40% tal-AOMs batterjali kollha u għal porzjon akbar ta' AOM severa. Teoretikament, Prevenar jista' jevita madwar 60-80% tas-serotipi li jikkawżaw AOM pnewmokokkali. Hu stmat li Prevenar jista' jevita 6-13% tal-episodji kliniċi kollha ta' AOM.

L-effikaċja ta' Prevenar kontra infjammazzjoni akuta fil-parti tan-nofs tal-widna (*acute otitis media* - AOM) kienet evalwata fi prova klinika *randomised, double blind*, fuq 1,662 tarbija Finlandiżi li ngħataw tilqima jew bi Prevenar, jew b'tilqima tal-kontroll (tilqima kontra l-Epatite B), wara 2, 4, 6 u 12-15-il xahar ta' età. L-istima għall-effikaċja tat-tilqima kontra t-tilqima-serotip AOM, ir-riżultat aħhari primarju tal-prova, kienet ta' 57% (95% CI: 44, 67) fl-analiżi skont il-protokoll u 54% (95% CI: 41, 64) fl-analiżi *intent-to-treat*. Żieda ta' 33% (95% CI: -1, 80) fl-AOM minhabba serograppi li ma kienx inklużi fit-tilqima kienet osservata f'pazjenti immunizzati. Madankollu, il-benefiċċju totali kien ta' tnaqqis ta' 34% (95% CI: 21, 45) fl-inkidenza tal-AOMs pnewmokokkali kollha. L-impatt tat-tilqima fuq in-numru totali ta' episodji ta' infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna irrispettivament mill-etjoloġija kien ta' tnaqqis ta' 6% (95% CI: -4, 16).

Sottosett ta' tfal f'dan l-istudju kienu segwiti sakemm kellhom minn 4 sa 5 snin. F'dan il-*follow-up*, l-effikaċja tat-tilqima għal OM frekwenti (definita bħala mill-anqas 3 episodji fi żmien 6 xhur) kienet ta' 18% (95% CI: 1, 32), għal infjammazzjoni kronika fil-parti tan-nofs tal-widna b'effużjoni, 50% (95% CI: 15, 71), u għat-tqeghid ta' tubu tat-timpanostomija, 39% (95% CI: 4, 61).

L-effikaċja ta' Prevenar kontra AOM kienet evalwata bħala riżultat aħhari sekondarju fil-prova Kaiser Permanente. It-tfal kienu segwiti sa meta kellhom 3.5 snin. L-impatt tat-tilqima fuq in-numru totali ta' episodji ta' infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna irrispettivament mill-etjoloġija kien ta'

tnaqqis ta' 7% (95% CI: 4, 10). L-effett tat-tilqima fl-analizi skont il-protokoll kien tnaqqis ta' 9% (95% CI: 3, 15) f'AOM rikorrenti (definita bhala 3 episodji f'sitt xhur jew 4 episodji f'sena) jew tnaqqis ta' 23% (95% CI: 7, 36) ghal AOM rikorrenti (5 episodji f'sitt xhur jew 6 episodji f'sena). Il-frekwenza tat-tqeghid ta' tubu tat-timpanostomija tnaqqset b'24% (95% CI: 12, 35) fl-analizi skont il-protokoll u 23% (95% CI: 11, 34) fl-analizi *intent-to-treat*.

### Effettività

L-effettività ta' Prevenar kontra IPD (i.e. li kienet tinkludi l-protezzjoni mogħtija mit-tilqima u mill-immunità tal-'merhla' minhabba t-trasmissjoni mnaqqsa tas-serotipi tat-tilqima fil-popolazzjoni) kienet evalwata fi programmi nazzjonali ta' immunizzazzjoni li jużaw serje tat-trabi bi tliet dozi jew b'żewġ dozi, kull waħda b'dozi *booster*.

Fl-Istati Uniti tal-Amerika, tilqim ġeneralizzat bi Prevenar bl-użu ta' serje b'erba' dozi fit-trabi u programm *catch-up* għal tfal sa 5 snin kien introdott fis-sena 2000. L-effettività tat-tilqima kontra IPD ikkawżata minn serotipi tat-tilqima kienet evalwata fi tfal li kellhom minn 3 sa 59 xahar, fl-ewwel erba' snin tal-programm ta' implimentazzjoni. Meta mqabbel mal-ebda t-tilqima, *point estimates* għall-effettività ta' 2, 3, jew 4 dozi mogħtija fuq skeda tat-trabi kienu simili: 96% (95% CI 88-99); 95% (95% CI 88-99); u 100% (95% CI 94-100), rispettivament. Fl-Istati Uniti tal-Amerika fl-istess perjodu ta' żmien, kien hemm tnaqqis ta' 94% fit-tip ta' tilqima IPD f'individwi li kellhom inqas minn 5 snin, meta mqabbla mal-linja bażi ta' qabel it-tilqima (1998/99). Fl-istess żmien kien hemm tnaqqis ta' 62% fit-tip ta' tilqima IPD f'individwi li kellhom iktar minn 5 snin. Dan l-effett indirett jew 'tal-merhla' hu minhabba tnaqqis fit-trasmissjoni tas-serotipi tat-tilqima minn tfal iżgħar li kienu mlaqqma mill-bqija tal-popolazzjoni u jikkoinċidi mat-tnaqqis tal-*carriage* natioraringeali tas-serotipi tat-tilqima.

Fi Quebec, Canada Prevenar kien introdott f'età ta' 2, 4 u 12-il xahar bi programm ta' doza waħda *catch-up* fi tfal li kellhom sa 5 snin. Fl-ewwel sentejn tal-programm, b'kopertura ta' iktar minn 90%, l-effettività osservata kontra l-IPD ikkawżata minn serotipi tat-tilqima kienet ta' 93% (95% CI 75-98) għas-serje ta' 2 dozi lit-trabi, u 100% (95% CI 91-100) għall-iskeda kompluta.

Dejta preliminari mill-Ingilterra u Wales irrappurtata inqas minn sena wara l-introduzzjoni ta' immunizzazzjoni ta' rutina fl-età ta' 2, 4 u 13-il xahar, bi programm ta' doza waħda *catch-up* għal tfal li kellhom minn 13 sa 23 xahar, is-suggeriet li l-effettività ta' din l-iskeda tista' tkun iktar baxxa kontra serotip 6B milli kontra s-serotipi oħrajn fit-tilqima.

L-effettività ta' serje primarja b'żewġ dozi ma kinitx stabbilita kontra l-pnewmonja jew infjammazzjoni akuta fil-pari tan-nofs tal-widna.

### Dejta addizzjonali dwar l-immunogeniċità

L-immunogeniċità ta' Prevenar kienet investigata fi studju *open-label*, multiċentriku f'49 tarbija bil-marda taċ-ċelluli *sickle*. It-tfal kienu mlaqqma bi Prevenar (3 dozi b'intervall ta' xahar bejniethom mill-età ta' xahrejn) u 46 minn dawn it-tfal irċievew ukoll tilqima tal-polysaccharide pnewmokokkali bi 23 valent fl-età ta' 15-18-il xahar. Wara l-immunizzazzjoni primarja, 95.6% tat-tfal kellhom livelli ta' antikorpi ta' mill-anqas 0.35 µg/ml għas-seba' serotipi kollha li jinsabu fi Prevenar. Żieda sinifikanti kienet osservata fil-konċentrazzjonijiet ta' antikorpi kontra s-seba' serotipi wara t-tilqima bil-polysaccharide, li tissuggerixxi li l-memorja immunologika kienet stabbilita sew.

## **5.2 Tagħrif farmakokinetiku**

Mhux applikabbli.

### **5.3 Taghrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-medicina**

Studju dwar it-tossicità ta' dozi ripetuti moghtija ġol-muskoli (13-il ġimgħa, 5 injezzjonijiet, waħda kull tliet ġimgħat) tat-tilqima tal-konjugat pnevmokokkali fil-fniek, ma żvela l-ebda evidenza ta' kwalunkwe effetti tossiċi sinifikanti lokali jew sistemici.

Studju dwar it-tossicità ta' dozi ripetuti moghtija taht il-ġilda (13-il ġimgħa, 7 injezzjonijiet tad-doża klinika, waħda kull ġimgħtejn, segwiti minn perjodu ta' rkupru ta' 4 ġimgħat) ta' Prevenar fil-firien u x-xadini, ma żvela l-ebda evidenza ta' kwalunkwe effetti tossiċi sinifikanti lokali jew sistemici.

## **6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU**

### **6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi**

Sodium chloride  
Ilma għall-injezzjonijiet

### **6.2 Inkompatibilitajiet**

Minhabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jablux miegħu, dan il-prodott medicinali m'għadux jithallat ma' prodotti medicinali oħrajn.

### **6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott medicinali**

4 snin

### **6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna**

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C).  
Tagħmlux fil-friza.

### **6.5 In-natura tal-kontenitur u ta' dak li hemm ġo fih**

0.5 ml suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest (ħġieg ta' Tip I) b'lasta tal-planger (polypropylene), planger-tapp (bla latex, griż, tal-lastku u butyl) u għatu b'tarf protettiv (bla latex, griż, tal-lastku u butyl) –

Daqsijiet tal-pakkett:  
Siringa 1 jew 10 siringi mimlijin għal-lest bil-labra jew mingħajrha  
Pakkett multiplu ta' 5 pakketti ta' 10 siringi mimlijin għal-lest mingħajr labra.

Jista' jkun li ma' jkunx il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali

### **6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor**

Meta jinħażen, depożitu abjad u supernatant ċar jista' jkun osservat.

It-tilqima għandha tithawwad tajjeb biex tinkiseb suspensjoni bajda omoġenja, u tkun eżaminata viżwalment għal kwalunkwe frak u/jew varjazzjoni tal-aspett fiziku, qabel ma tingħata. Tużahiekk jekk il-kontenut ma jkunx hekk.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-ġigijiet lokali.

**7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/00/167/003  
EU/1/00/167/004  
EU/1/00/167/006  
EU/1/00/167/007  
EU/1/00/167/008

**9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data ta' l-ewwel awtorizzazzjoni: 02/02/2001  
Data ta' l-aħħar tiġdid: 02/02/2011

**10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta' l-Aġenzija Ewropeja  
dwar il-Medicini <http://www.ema.europa.eu>

**ANNEX II**

- A. MANIFATTURI TAS-SUSTANZI BIJOLOĠIĠI ATTIVI U DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KUNDIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

**A. MANIFATTURI TAS-SUSTANZI BIJOLOĠIĊI ATTIVI U DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GĦALL-HRUĠ TAL-LOTT**

**Isem u indirizz tal-manifatturi tas-sustanzi bijoloġiċi attivi**

**CRM<sub>197</sub>, Saccharides Attivati, u Konjugati**

Wyeth Pharmaceuticals, Division of Wyeth Holdings Corporation  
4300 Oak Park  
NC 27330, Sanford, L-Istati Uniti tal-Amerika

**Polysaccharides Pnwmokokkali**

Wyeth Pharmaceuticals, Division of Wyeth Holdings Corporation  
401 North Middletown Road  
NY 10965, Pearl River, L-Istati Uniti tal-Amerika

**Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott**

John Wyeth & Brother Ltd.  
Huntercombe Lane South  
Taplow, Maidenhead  
Berkshire, SL6 0PH  
Ir-Renju Unit

**B. KUNDIZZJONIJIET TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

- **KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-FORNIMENT U L-UŻU IMPOSTI FUQ ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Prodott mediċinali jinghata bir-riċetta ta' ta' ib.

- **KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU MINGHAJR PERIKLU U EFFETTIV TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Ma jghoddx f'dan il-każ.

- **KUNDIZZJONIJIET OHRA**

**Sistema ta' Farmakovigilanza**

Id-detentur u l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jiżgura li s-sistema ta' farmakovigilanza, kif deskritta fil-verżjoni f'Modulu 1.8.1 tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tkun fis-seħħ u tiffunzjona qabel u waqt li l-prodott ikun fuq is-suq.

**FSCKs**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jippreżenta rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott f'konformità mar-rekwiżiti mnizzla fil-lista tad-dati ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u ppubblikati fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

Hruġ tal-lott uffiċjali: skont Artiklu 114 tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/83/KE kif emendata, il-hruġ tal-lott uffiċjali jsir minn laboratorju tal-Istat jew laboratorju ieħor li jiġi mahtur għal dak il-għan.

Laboratorju Uffiċjali tal-Kontroll tal-Medicini (OMCL)  
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé  
Direction des laboratoires et des contrôles  
Avenue Jean Jaurès, 321  
F - 69007 Lyon  
Franza

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzat



**ANNEX III**

**TIKKETTA U FULJETT TA' TAGHRIF**

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

**A. TIKKETTA**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA - Pakkett b'kunjett 1**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni  
Tilqima konjugata saccharide pneumokokkali, adsorbata

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

**3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni.  
Kunjett 1 b' doża waħda (0.5 ml).

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal ġol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tinjettax ġol-vini.

**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

EU/1/00/167/001

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bi-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA FUQ IL-KUNJETT**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni  
Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbata  
Użu għal ġol-muskoli.

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Hawwad tajjeb qabel l-użu.

**3. DATA META JISKADI**

JIS:

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI**

1 doża (0.5 ml)

**6. OHRAJN**

Pfizer Limited

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA - Pakkett b'10 kunjetti**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni  
Tilqima konjugata saccharide pneumokokkali, adsorbata

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F, u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

**3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni.  
10 kunjetti b'doża waħda (0.5 ml).

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal ġol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPECJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPECJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Injettax ġol-vini.

**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

EU/1/00/167/002

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bi-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA – Pakkett b'siringa 1 mimlija għal-lest minghajr labra**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pneumokokkali, adsorbita

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

**3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest.  
Siringa 1 mimlija għal-lest b' doża waħda (0.5 ml) minghajr labra.

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal ġol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tiniettax ġol-vini.

**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:



**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

EU/1/00/167/003

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bi-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**  
**TIKKETTA FUQ IS-SIRINGA MIMLIJA GHAL-LEST**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbata  
Użu għal ġol-muskoli.

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Hawwad tajjeb qabel l-użu.

**3. DATA META JISKADI**

JIS:

**4. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM JEW PARTI INDIVIDWALI**

1 doża (0.5 ml)

**6. OHRAJN**

Pfizer Limited

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA – Pakkett b'10 siringi mimlijin ghal-lest minghajr labra**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pneumokokkali, adsorbita

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

**3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest.  
10 siringi mimlijin għal-lest b' doża waħda (0.5 ml) minghajr labra.

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal ġol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tinjettax ġol-vini.

**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

EU/1/00/167/004

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bi-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA – Pakkett b'kunjett 1 b'siringa/labar**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni  
Tilqima konjugata saccharide pneumokokkali, adsorbata

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

**3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni.  
Kunjett 1 b' doża waħda (0.5 ml).  
Siringa 1 separata.  
2 labar separati.

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGĦATA**

Użu għal ġol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAĦAQQ U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tinjettax ġol-vini.

**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/00/167/005

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bil-riċetta tat-tabib

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA – pakkett b'siringa 1 mimlija ghal-lest b'labra separata**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pneumokokkali, adsorbata

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

**3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest.  
Siringa 1 mimlija għal-lest b' doża wahda (0.5 ml) b' labra separata.

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal gol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu. Aqra l-funzjoni ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tinjettax gol-vini.

**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/00/167/006

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bir-riċetta ta' tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIĦ-BRAILLE**



**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA - Pakkett b'10 siringi mimlijin għal-lest b'labra separata**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbta

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F, u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

**3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest.  
10 siringi mimlijin għal-lest b' doża wahda (0.5 ml) b' labra separata.

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal ġol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**6. TWISSIJA SPECJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAFAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

**7. TWISSIJA(IET) SPECJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tinjettax ġol-vini.

**8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHD FIS-SUQ**

EU/1/00/167/007

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bi-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

## **TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IL-KAXXA TA' BARRA – Pakkett b'10 siringi mimlijin ghal-lest minghajr labra: pakkett ghal prezentazzjoni ta' pakkett multiplu (5 x 10), minghajr il-kaxxa l-blu**

### **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbita

### **2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F, u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM<sub>197</sub> proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

### **3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

### **4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest.  
Komponent ta' pakkett multiplu b'5 pakketti, li kull wiehed ikun fih 10 siringi mimlijin għal-lest b' doża waħda (0.5 ml) minghajr labra.  
Kull pakkett individwali ma jistax jinbiegħ separatament.

### **5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal gol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħri qabel l-użu.

### **6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żomni fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

### **7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tinjettax gol-vini.

### **8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGĦID FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGĦID FIS-SUQ**

EU/1/00/167/008

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bil-riċetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

## **TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KLIEM FUQ IT-TIKKETTA - Tikketta tat-tgezwira ta' barra biex titwahhal fuq il-fojl trasparenti ghal prezentazzjoni ta' pakkett multiplu (5 x 10), li jinkludi l-kaxxa l-blu**

### **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest  
Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbata

### **2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA**

Kull doża ta' 0.5 ml fiha 2 mikrogrammi ta' saccharide għas-serotipi 4, 9V, 14, 18C, 19F, u 23F, u 4 mikrogrammi ta' serotip 6B f'kull doża (total ta' 16-il mikrogramma ta' saccharide) konjugat għal CRM197 proteina *carrier* u adsorbit fuq aluminju phosphate (0.5 mg).

### **3. LISTA TA' SUSTANZI MHUX ATTIVI**

Fih ukoll sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

### **4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Suspensjoni għall-injezzjoni f' siringa mimlija għal-lest.  
Komponent ta' pakkett multiplu b'5 pakketti, li kull wieħed ikun fih 10 siringi mimlijin għal-lest b' doża waħda (0.5 ml) mingħajr labra.  
Kull pakkett individwali ma jistax jinbiegħ separatament.

### **5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Użu għal ġol-muskoli.  
Hawwad tajjeb qabel l-użu.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

### **6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JINTLAHAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL**

Żommu lejha ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

### **7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tinjettax ġol-vini.

### **8. DATA TA' META JISKADI**

JIS:

**9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Ahżen fi frigg.  
Tagħmlux fil-friza.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHD FIS-SUQ**

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGHD FIS-SUQ**

EU/1/00/167/008

**13. NUMRU TAL-LOTT**

Lott:

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali jinghata bi-ricetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

**B. FULJETT TA' TAGHRIF**

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

## FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

### Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbata

#### Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel it-tifel/tifla tiegħek tinghata din it-tilqima.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok iktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

#### F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Prevenar u għalxiex jintuża
2. Qabel ma t-tifel/tifla tiegħek jirċievu Prevenar
3. Kif għandu jinghata Prevenar
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif taħżen Prevenar
6. Aktar tagħrif

### 1. X'INHU PREVENAR U GHALXIEX JINTUŻA

Prevenar hu tilqima pnevmokokkali. Prevenar jinghata lil tfal ta' minn xahrejn sa 5 snin biex jgħin halli jipproteġi kontra mard bħal: meningite, sepsis jew batteremija (batterji fiċ-ċirkolazzjoni tad-demem), pnevmonja u infezzjoni fil-widnejn ikkawżata minn seba' tipi tal-batterju *Streptococcus pneumoniae*.

It-tilqima taħdem billi tgħin lill-ġisem biex jipproduċi l-antikorpi tiegħu stess, li jipproteġu lit-tifel/tifla tiegħek kontra dan il-mard.

### 2. QABEL MA T-TIFEL/TIFLA TIEGĤEK JIRĊIEVU PREVENAR

#### Tużax Prevenar:

- jekk it-tifel/tifla tiegħek hu/hi hu allergiku/a (ibati/tbati minn sensitività eċċessiva) għas-sustanzi attivi, għalhi s-sustanzi oħrajn, jew għat-*toxoid* tad-difterite.
- jekk it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha infezzjoni severa b'deni qawwi (fuq 38°C). Jekk dan japplika għat-tifel/tifla tiegħek, allura t-tilqima ser tiġi posposta sakemm it-tifel/tifla tiegħek ihossu/thossa aħjar. Infezzjoni żgħira, bħal rih, m'għandhiex tkun problema. Madankollu, l-ewwel għandek tkellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.

#### Oqghod attent hafna bi Prevenar:

- jekk it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha problemi mediċi, jew kellu/kellha problemi fil-passat, wara kwalunkwe doża ta' Prevenar.
- jekk it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha kwalunkwe problemi ta' hruġ ta' demm.

Prevenar ser jipproteġi biss kontra infezzjonijiet tal-widnejn ikkawżati mit-tipi ta' *Streptococcus pneumoniae* li għalihom it-tilqima kienet żviluppata. Mhux ser jipproteġi kontra organiżmi infettivi oħrajn li jistgħu jikkawżaw infezzjonijiet tal-widnejn.

#### Meta tuża mediċini/tilqim ieħor:

Jekk jogħġbok għid lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispizjar tiegħek jekk it-tifel/tifla tiegħek qed jiehu/tiehu jew ħax/haditx dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta, jew jekk dan l-aħħar saritlu/saritilha xi tilqima.



### **Taghrif importanti dwar xi whud mis-sustanzi ta' Prevenar:**

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

### **3. KIF GHANDU JINGHATA PREVENAR**

It-tabib jew infermiera ser jinjettaw id-doża rakkomandata (0.5 ml) tat-tilqima ġol-muskolu tad-driegh jew tar-rigiel tat-tifel/tifla tiegħek.

Prevenar jista' jinghata fl-istess hin mat-tilqim li jinghata lit-tfal; f'dan il-każ, siti differenti tal-injezzjoni għandhom jintużaw.

#### Trabi li jkollhom minn 6 ġimghat sa 6 xhur

Normalment, it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha jirċievi/tirċievi kors inizjali ta' tliet injezzjonijiet segwiti minn doża booster

- L-ewwel injezzjoni tista' tinghata mill-età ta' xahrejn
- Kull injezzjoni ser tinghata wara intervall ta' mill-inqas xahar
- Ir-raba' injezzjoni (booster) ser tinghata bejn l-età ta' 11 u 15-il xahar
- Inti ser tiġi avżat/a meta t-tifel/tifla tiegħek għandhom jiġu lura għall-injezzjoni li jmiss

Skont rakkomandazzjonijiet uffiċjali f'pajjiżek, tista' tintuża skeda alternattiva mill-fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek. Jekk jogħġbok kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek għal aktar informazzjoni.

#### Trabi u tfal zġħar mhux imlaqqma ta' aktar minn 7 xhur

Trabi li għandhom minn 7 sa 11-il xahar għandhom jirċievu żewġ injezzjonijiet. Kull injezzjoni ser tinghata wara intervall ta' mill-inqas xahar. It-tielet injezzjoni ser tinghata fit-tieni sena tal-hajja.

Tfal zġħar li għandhom minn 12 sa 23 xahar għandhom jirċievu żewġ injezzjonijiet. Kull injezzjoni ser tinghata wara intervall ta' mill-inqas xahrejn.

Tfal zġħar li għandhom minn sentejn sa 5 snin għandhom jirċievu injezzjoni waħda.

Hu importanti li ssegwi l-istruzzjonijiet mit-tabib, l-ispizjar jew l-infermier sabiex it-tifel/tifla tiegħek ilesti/tlesti l-kors tal-injezzjonijiet.

Jekk tinsa tmur għand it-tabib jew infermiera fiż-żmien skedat, staqsi lit-tabib jew lill-infermiera għal parir.

### **4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU**

Bhal kull tilqima oħra, Prevenar jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd. L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jseħħu b'din it-tilqima.

**L-iktar effetti sekondarji komuni** (dawn jistgħu jseħħu b'iktar minn doża 1 minn kull 10 doži tat-tilqima) huma:

- Rimettar, dijarea, nuqqas t'aptit
- Uġiġh, sensitività, hmura, nefha, jew ebusija fis-sit tal-injezzjoni; deni ta' 38°C jew oġhla irritabilità, biki, nġhas, irqad bla kwiet

**Effetti sekondarji komuni** (dawn jistgħu jseħħu b'sa doża 1 minn kull 10 doži tat-tilqima) huma:

- Hmura, nefha, jew ebusija fis-sit tal-injezzjoni akbar minn 2.4 ċm; sensitività fis-sit tal-injezzjoni li tinterferixxi mal-moviment
- Deni ta' 39°C jew oġhla

**Effetti sekondarji mhux komuni** (dawn jistghu jsehhu b'sa doza 1 minn kull 100 doza tat-tilqima) huma:

- Raxx/horriqija (urtikarja)

**Effetti sekondarji rari** (dawn jistghu jsehhu b'sa doza 1 minn kull 1,000 doza tat-tilqima) huma:

- Aċċessjonijiet (jew konvulzjonijiet), li jinkludu daww ikkawżati minn temperatura għolja
- Episodju ipotoniku-iporisponsiv (kollass jew stat qisu xokk)
- Reazzjoni ta' sensitività eċċessiva, li tinkludi nefha tal-wiċċ u/jew tax-xufftejn, diffikultà biex tiehu n-nifs, raxx; urtikarja jew raxx qisu urtikarja (horriqija)
- Fwawar

**Effetti sekondarji rari hafna** (dawn jistghu jsehhu b'sa 1 minn kull 10,000 doza tat-tilqima) huma:

- Tkabbir fl-għoqod jew glandoli tal-limfa (limfadenopatija) qrib is-sit tal-injezzjoni, bħal ta' t-tal-driegħ jew fl-irqiq ta' bejn iż-zaqq u l-koxxa
- Eritema multiforme (raxx li jikkawża tbajja' homor bil-hakk)

Fi trabi li twieldu prematuri hafna (wara 28 ġimgħa jew aktar ta' tqala), jistghu jsehhu intervalli bejn kull nifs għal 2-3 ijiem wara t-tilqima.

Jekk jogħġbok tkellem mat-tabib, mal-ispizjar jew mal-infermier tiegħek jew għandek xi mistoqsijiet jew problemi. Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk timtota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

## 5. KIF TAĦZEN PREVENAR

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal

Ahžen fi frigg (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friza.

Tużax Prevenar wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-kartuna u t-tikketta. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Il-mediċini m'għandhomx jintremew ma l-ilma tad-dranagġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jghinu għal protezzjoni tal-ambjent.

## 6. Aktar tagħrif

### X'fih Prevenar

Is-sustanzi attivi

Kull doza ta' 0.5 ml fiha:

Serotip polysaccharide pnevmokokkali 4*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 6B*	4 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 9V*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 14F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 18C*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 19F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 23F*	2 mikrogrammi

\* Konjugat għall-proteina *carrier* CRM<sub>197</sub> u adsorbit fuq aluminium phosphate (0.5 mg)

Is-sustanzi l-oħra huma sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

## **Id-Dehra ta' Prevenar u l-kontenuti tal-pakkett**

It-tilqima hi suspensjoni għall-injezzjoni pprovduta f' siringa mimlija għal-lest li jkun fiha doza waħda (0.5 ml).

Daqs tal-pakkett ta' 1 u 10 kunjetti mingħajr siringi/labar.

Daqs tal-pakkett ta' kunjett 1 b' siringa u 2 labar (1 biex tiġbed, 1 għall-injezzjoni).

## **Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur**

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

Detentur tal-Awtorizzazzjoni tal-Manifattura responsabbli għall-hruġ tal-lott:

John Wyeth & Brother Ltd.  
Huntercombe Lane South  
Taplow, Maidenhead  
Berkshire, SL6 0PH-UK  
Ir-Renju Unit

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja li rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq:

**België/Belgique/Belgien**  
**Luxembourg/Luxemburg**  
Pfizer S.A. / N.V.  
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

**Lietuva**  
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje  
Tel: +370 52 51 4000

**България**  
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон  
България  
Тел: +359 2 970 4333

**Magyarország**  
Pfizer Kft.  
Tel: +36 1 488 3700

**Česká Republika**  
Pfizer s.r.o.  
Tel: +420-283-004-111

**Malta**  
Vivian Corporation Ltd.  
Tel: +35621 344610

**Danmark**  
Pfizer ApS  
Tlf: +45 44 201 100

**Nederland**  
Pfizer BV  
Tel: +31 (0)10 406 43 01

**Deutschland**  
Pfizer Pharma GmbH  
Tel: +49 (0)30 550055-51000

**Norge**  
Pfizer AS  
Tlf: +47 67 526 100

**Eesti**  
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal  
Tel: +372 666 7500

**Österreich**  
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0)1 521 15-0

**Ελλάδα**

Pfizer Ελλάς A.E.  
Τηλ.: +30 210 6785 800

**Polska**

Pfizer Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 335 61 00

**España**

Pfizer, S.L.  
Télf:+34914909900

**Portugal**

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda  
Tel: +351 21 423 5500

**France**

Pfizer  
Tél +33 1 58 07 34 40

**România**

Pfizer Romania S.R.L  
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

**Hrvatska**

Pfizer Croatia d.o.o.  
Tel: + 385 1 3908 777

**Slovenská Republika**

Pfizer Luxembourg SARL, organizačna zložka  
Tel: + 421 2 3355 5500

**Ireland**

Pfizer Healthcare Ireland  
Tel: 1800 633 363 (toll free)  
+44 (0)1304 616161

**Slovenija**

Pfizer Luxembourg SARL  
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja  
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana  
Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

**Ísland**

Icepharma hf,  
Simi: + 354 540 8000

**Suomi/Finland**

Pfizer Oy  
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

**Italia**

Pfizer S.r.l.  
Tel: +39 06 33 18 21

**Sverige**

Pfizer AB  
Tel: +46 (0)8 550 520 00

**Κύπρος**

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)  
Τηλ: +357 22 817690

**United Kingdom**

Pfizer Limited  
Tel: +44 (0) 1304 616161

**Latvija**

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā  
Tel.: + 371 670 35 775

**Dar il-fuqjett kien approvat l-ahhar fi**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku ta' l-Aġenzija Ewropeja  
dwar il-Medicini <http://www.ema.europa.eu>

**It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:**

It-tilqima għandha tithawwad tajjeb biex tinkiseb suspensjoni bajda omogenja, u tkun eżaminata  
vizwalment għal kwalunkwe frak u/jew varjazzjoni tal-aspett fiziku, qabel ma tinghata. Tuzahix jekk  
il-kontenut ma jkunx hekk.

Prevenar hu għall-użu ġol-muskoli biss. Tagħtihx minn ġol-vina.

Din it-tilqima m'għandhiex tinghata lil trabi jew lil tfal li għandhom it-tromboċitopenja jew kwalunkwe disturb tal-koagulazzjoni li minhabba fih l-injezzjoni għol-muskoli tkun kontraindikata, hlief jekk il-benefiċċju potenzjali jiżboq b'mod ċar ir-riskju tal-ghoti.

Trabi ta' bejn 2 - 6 xhur: is-serje primarja tat-trabi tikkonsisti fi tliet doži, kull waħda ta' 0.5 ml. L-ewwel doża normalment tinghata meta t-tarbija jkollha xahrejn, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži.

Ir-raba' doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Alternattivament, meta Prevenar jinghata bħala parti minn programm ta' rutina ta' immunizzazzjoni lit-trabi, tista' tkun ikkunsidrata skeda b'żewġ doži. L-ewwel doża tista' tinghata mill-età ta' xahrejn. It-tieni doża li tinghata mill-inqas xahrejn wara, u t-tielet doża (*booster*) li tinghata fl-età ta' 11-15-il xahar.

Trabi ta' bejn 7 - 11-il xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži. It-tielet doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Tfal li għandhom bejn 12 - 23 xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahrejn bejn id-doži.

Tfal li għandhom bejn 24 xahar – 5 snin: doża waħda.

Il-htieġa ta' doża *booster* wara dawn l-iskedi ta' immunizzazzjoni ma kinitx stabbilita.

Bħal fil-każ ta' tilqim ieħor, l-ghoti ta' Prevenar għandu jkun pospost f'persuni li jbatu minn mard b'deni akut jew sever.

Bħal-tilqim kollu li jista' jiġi injettat, il-kura u s-supervizjoni medika adattata għandhom dejjem ikunu disponibbli fil-pront f'każ ta' avveniment anafilattiku rari wara l-ghoti tat-tilqima.

Prevenar mhux ser jipproteġi kontra serotipi oħrajn ta' *Streptococcus pneumoniae* hlief dawk inklużi fit-tilqima, jew kontra mikro-organizmi oħrajn li jikkawżaw mard invażiv jew infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna.

Għalkemm xi rispons tal-antikorpi għa-*toxoid* tad-difterite jista' jseħh, l-immunizzazzjoni b'din it-tilqima ma tissostwixxi l-immunizzazzjoni ta' rutina kontra d-difterite.

Għal tfal minn sentejn sa 5 snin, intażat skeda ta' immunizzazzjoni li kienet tikkonsisti f'doża waħda. Rata oġhla ta' reazzjonijiet lokali kienet osservata fi tfal li kellhom iktar minn 24 xahar, meta mqabbla mat-trabi.

Tilqim differenti li jista' jiġi injettat għandu dejjem jinghata f'siti differenti tal-injezzjoni.

Dejta limitata wriet li Prevenar jikkawża rispons immuni aċċettabbli fi trabi li għandhom il-marda taċ-ċelluli *sickle*, bi profil tas-sigurtà simili għal dak osservat fi gruppi li mhux qegħdin f'riskju għoli. Dejta dwar is-sigurtà u l-immunoġenicità għadhom mhumiex disponibbli għal tfal fi gruppi oħrajn speċifiki li qegħdin f'riskju għoli għal mard pnevmokokkali invażiv (eż. tfal b'disfunzjoni kongenitali oħra, jew b'disfunzjoni miksuba tal-milsa, li huma infettati bl-HIV, li għandhom malinn, u li għandhom sindrome nefrotiku). It-tilqima fi gruppi li qegħdin f'riskju għoli għandha tkun ikkunsidrata fuq bazi individwali.

Tfal ta' taħt is-sentejn (inklużi dawk li qegħdin f'riskju għoli) għandhom jirċievu s-serje ta' tilqim ta' Prevenar li hi adattata għall-età tagħhom. L-użu ta' tilqima konjugata pnevmokokkali ma tissostitwixxi l-użu ta' tilqim tal-polysaccharide pnevmokokkali li fih 23 valent fit-tfal ta'  $\geq 24$  xahar b'kundizzjonijiet (bħal marda taċ-ċelluli *sickle*, asplinja, infezzjoni bl-HIV, mard kroniku jew li huma immunokompromessi) li jpoġġuom f'riskju oġhla għal mard invażiv minhabba *Streptococcus pneumoniae*. Fejn ikun rakkomandat, it-tfal f'riskju li għandhom  $\geq 24$  xahar u li jkunu diġà tlaqqmu bi Prevenar, għandhom jirċievu tilqima tal-polysaccharide pnevmokokkali li fiha 23 valent. L-intervall bejn it-tilqima tal-konjugat pnevmokokkali (Prevenar) u t-tilqima tal-polysaccharide

pnewmokokkali li fiha 23 valent, m'ghandux ikun ta' inqas minn 8 gimghat. M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli li tindika jekk l-ghoti ta' tilqima tal-polysaccharide pnewmokokkali li fiha 23 valent lil tfal li ma jkunux tlaqqmu, jew lil tfal li jkunu digà tlaqqmu bi Prevenar, jistax jirriżulta f'rispons eċċessiv għal dozi addizzjonali ta' Prevenar.

Mediċina profilattika kontra d-deni hi rakkomandata:

- għat-tfal kollha li jkunu qed jirċievu Prevenar fl-istess hin ma' tilqim li jkun fih *whole cell pertussis* minhabba r-rata oghla rata ta' reazzjonijiet bid-deni
- għat-tfal li jkollhom il-puplesiji, jew li jkollhom passat mediku ta' puplesiji kkawżati mid-deni.

Il-kura kontra d-deni għandha tinbeda kull meta jkun mehtieg jew meta t-temperatura titla' iktar minn 39°C.

Tfal b'indeboliment fir-rispons immuni, kemm jekk dan iseħħ minhabba l-użu ta' terapija immunosoppressiva, difett ġenetiku, infezzjoni bl-HIV, jew kawżi oħrajn, jista' jkollhom tnaqqis fir-rispons tal-antikorpi għall-immunizzazzjoni attiva.

Bhal ma jiġri bi kwalunkwe tilqima, Prevenar jista' ma jipproteġix l-individwi kollha li jkunu qed jirċievu t-tilqima kontra l-marda pnewmokokkali. Flimkien ma' dan, għas-serotipi tat-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun iktar baxxa b'mod sostanzjali milli mill-protezzjoni kontra l-mard invażiv. Minhabba li l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi kkawżata minn hafna organiżmi li mhumiex serotipi pnewmokokkali rappreżentati fit-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjonijiet kollha fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun baxxa.

## FULJETT TA' TAGHRIF: INFORMAZZJONI GHAL MIN QED JAGHMEL UŻU MINNU

### Prevenar suspensjoni għall-injezzjoni f'siringa mimlija għal-lest Tilqima konjugata saccharide pnevmokokkali, adsorbata

#### Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel it-tifel/tifla tiegħek tinghata din it-tilqima.

- Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok iktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.
- Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

#### F'dan il-fuljett:

1. X'inhu Prevenar u għalxiex jintuża
2. Qabel ma t-tifel/tifla tiegħek jirċievu Prevenar
3. Kif għandu jinghata Prevenar
4. Effetti sekondarji li jista' jkollu
5. Kif tahzen Prevenar
6. Aktar tagħrif

### 1. X'INHU PREVENAR U GHALXIEX JINTUŻA

Prevenar hu tilqima pnevmokokkali. Prevenar jinghata lil tfal ta' minn xahrejn sa 5 snin biex jgħin halli jipproteġi kontra mard bħal: meningite, sepsis jew batteremija (batterji fiċ-ċirkolazzjoni tad-demem), pnevmonja u infezzjoni fil-widnejn ikkawżata minn seba' tipi tal-batterju *Streptococcus pneumoniae*.

It-tilqima taħdem billi tgħin lill-ġisem biex jipproduċi l-antikorpi tiegħu stess, li jipproteġu lit-tifel/tifla tiegħek kontra dan il-mard.

### 2. QABEL MA T-TIFEL/TIFLA TIEGĤEK JIRĊIEVU PREVENAR

#### Tużax Prevenar:

- jekk it-tifel/tifla tiegħek hu/hu allergiku/a (ibati/tbati minn sensitività eċċessiva) għas-sustanzi attivi, għal xi sustanzi oħrajn, jew għat-*toxoid* tad-difterite.
- jekk it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha infezzjoni severa b'deni qawwi (fuq 38°C). Jekk dan japplika għat-tifel/tifla tiegħek, allura t-tilqima ser tiġi posposta sakemm it-tifel/tifla tiegħek ihossu/thossha t-tija. Infezzjoni żgħira, bħal rih, m'għandhiex tkun problema. Madankollu, l-ewwel għandek tkellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek.

#### Oqgħod attent hafna bi Prevenar:

- jekk it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha problemi mediċi, jew kellu/kellha problemi fil-passat, wara kwalunkwe doża ta' Prevenar.
- jekk it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha kwalunkwe problemi ta' hruġ ta' demm.

Prevenar ser jipproteġi biss kontra infezzjonijiet tal-widnejn ikkawżati mit-tipi ta' *Streptococcus pneumoniae* li għalihom it-tilqima kienet żviluppata. Mhux ser jipproteġi kontra organiżmi infettivi oħrajn li jistgħu jikkawżaw infezzjonijiet tal-widnejn.

#### Meta tuża mediċini/tilqim ieħor:

Jekk jogħġbok għid lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispizjar tiegħek jekk it-tifel/tifla tiegħek qed jiehu/tiehu jew hax/haditx dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawm mingħajr ricetta, jew jekk dan l-aħħar saritlu/saritilha xi tilqima.

### **Taghrif importanti dwar xi whud mis-sustanzi ta' Prevenar:**

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f'kull doża, jiġifieri essenzjalment 'hieles mis-sodium'.

### **3. KIF GHANDU JINGHATA PREVENAR**

It-tabib jew infermiera ser jinjettaw id-doża rakkomandata (0.5 ml) tat-tilqima ġol-muskolu tad-driegh jew tar-riġel tat-tifel/tifla tiegħek.

Prevenar jista' jinghata fl-istess hin mat-tilqim li jinghata lit-tfal; f'dan il-każ, siti differenti tal-injezzjoni għandhom jintużaw.

#### Trabi li jkollhom minn 6 ġimghat sa 6 xhur

Normalment, it-tifel/tifla tiegħek għandu/għandha jirċievi/tirċievi kors inizjali ta' tliet injezzjonijiet segwiti minn doża booster

- L-ewwel injezzjoni tista' tinghata mill-età ta' xahrejn
- Kull injezzjoni ser tinghata wara intervall ta' mill-inqas xahar
- Ir-raba' injezzjoni (booster) ser tinghata bejn l-età ta' 11 u 15-il xahar
- Inti ser tiġi avżat/a meta t-tifel/tifla tiegħek għandhom jiġu lura għall-injezzjoni li jmiss

Skont rakkomandazzjonijiet uffiċjali f'pajjiżek, tista' tintuża skeda alternattiva mill-fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek. Jekk jogħġbok kellem lit-tabib, lill-ispizjar jew lill-infermier tiegħek għal aktar informazzjoni.

#### Trabi u tfal zġħar mhux imlaqqma ta' aktar minn 7 xhur

Trabi li għandhom minn 7 sa 11-il xahar għandhom jirċievu żewġ injezzjonijiet. Kull injezzjoni ser tinghata wara intervall ta' mill-inqas xahar. It-tielet injezzjoni ser tinghata fit-tieni sena tal-hajja.

Tfal zġħar li għandhom minn 12 sa 23 xahar għandhom jirċievu żewġ injezzjonijiet. Kull injezzjoni ser tinghata wara intervall ta' mill-inqas xahrejn.

Tfal zġħar li għandhom minn sentejn sa 5 snin għandhom jirċievu injezzjoni waħda.

Hu importanti li ssegwi l-istruzzjonijiet mit-tabib, L-Ispizjar jew l-infermier sabiex it-tifel/tifla tiegħek ilesti/tlesti l-kors tal-injezzjonijiet.

Jekk tinsa tmur għand it-tabib jew infermiera fiż-żmien skedat, staqsi lit-tabib jew lill-infermiera għal parir.

### **4. EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU**

Bhal kull tilqima oħra, Prevenar jista' jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulhadd. L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jseħħu b'din it-tilqima.

**L-iktar effetti sekondarji komuni** (dawn jistgħu jseħħu b'iktar minn doża 1 minn kull 10 doži tat-tilqima) huma:

- Rimettar, dijarea, nuqqas t'aptit.
- Uġiġh, sensitività, hmura, nefha, jew ebusija fis-sit tal-injezzjoni; deni ta' 38°C jew oġhla, irritabilità, biki, nġhas, irqad bla kwiet

**Effetti sekondarji komuni** (dawn jistgħu jseħħu b'sa doża 1 minn kull 10 doži tat-tilqima) huma:

- Hmura, nefha, jew ebusija fis-sit tal-injezzjoni akbar minn 2.4 ċm; sensitività fis-sit tal-injezzjoni li tinterferixxi mal-moviment
- Deni ta' 39°C jew oġhla



**Effetti sekondarji mhux komuni** (dawn jistghu jsehhu b'sa doza 1 minn kull 100 doza tat-tilqima) huma:

- Raxx/horriqija (urtikarja)

**Effetti sekondarji rari** (dawn jistghu jsehhu b'sa doza 1 minn kull 1,000 doza tat-tilqima) huma:

- Aċċessjonijiet (jew konvulzjonijiet), li jinkludu daww ikkawżati minn temperatura għolja
- Episodju ipotoniku-iporisponsiv (kollass jew stat qisu xokk)
- Reazzjoni ta' sensitività eċċessiva, li tinkludi nefha tal-wiċċ u/jew tax-xufftejn, diffikultà biex tiehu n-nifs, raxx; urtikarja jew raxx qisu urtikarja (horriqija)
- Fwawar

**Effetti sekondarji rari hafna** (dawn jistghu jsehhu b'sa 1 minn kull 10,000 doza tat-tilqima) huma:

- Tkabbir fl-għoqod jew glandoli tal-limfa (limfadenopatija) qrib is-sit tal-injezzjoni, bħal ta' t-tidher id-driegħ jew fl-irqiq ta' bejn iż-zaqq u l-koxxa
- Eritema multiforme (raxx li jikkawża tbajja' homor bil-hakk)

Fi trabi li twieldu prematuri hafna (wara 28 ġimgħa jew aktar ta' tqala), jistghu jsehhu intervalli bejn kull nifs għal 2-3 ijiem wara t-tilqima.

Jekk jogħġbok tkellem mat-tabib, mal-ispizjar jew mal-infermier tiegħek jew għandek xi mistoqsijiet jew problemi. Jekk xi wiehed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk timnuta xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f'dan il-fuljett, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.

## 5. KIF TAĦZEN PREVENAR

Żomm fejn ma jintlahaqx u ma jidhirx mit-tfal

Ahžen fi frigg (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friza.

Tużax Prevenar wara d-data ta' skadenza li tidher fuq il-kartuna u t-tikketta. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Il-mediċini m'għandhomx jintremew ma l-ilma tad-dranagġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jghinu għal protezzjoni tal-ambjent.

## 6. Aktar tagħrif

### X'fih Prevenar

Is-sustanzi attivi

Kull doza ta' 0.5 ml fiha:

Serotip polysaccharide pnevmokokkali 4*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 6B*	4 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 9V*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 14F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 18C*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 19F*	2 mikrogrammi
Serotip polysaccharide pnevmokokkali 23F*	2 mikrogrammi

\* Konjugat għall-proteina *carrier* CRM<sub>197</sub> u adsorbit fuq aluminium phosphate (0.5 mg)

Is-sustanzi l-oħra huma sodium chloride u ilma għall-injezzjonijiet.

## **Id-Dehra ta' Prevenar u l-kontenuti tal-pakkett**

It-tilqima hi suspensjoni għall-injezzjoni pprovduta f' siringa mimlija għal-lest li jkun fiha doza waħda (0.5 ml). Daqs tal-pakkett ta' 1 u 10 bi jew minghajr labra.

Preżentazzjoni ta' pakkett multiplu f' 5 pakketti ta' 10 siringi mimlijin għal-lest minghajr labar.

## **Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur**

Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq:

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich  
Kent CT13 9NJ  
Ir-Renju Unit

Detentur tal-Awtorizzazzjoni tal-Manifattura responsabbli għall-hruġ tal-lott:

John Wyeth & Brother Ltd.  
Huntercombe Lane South  
Taplow, Maidenhead  
Berkshire, SL6 0PH-UK  
Ir-Renju Unit

Għal kull tagħrif dwar din il-medicina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-Suq:

**België/Belgique/Belgien**  
**Luxembourg/Luxemburg**  
Pfizer S.A. / N.V.  
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

**Lietuva:**  
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje  
Tel: +376 52 51 4000

**България**  
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон  
България  
Тел: +359 2 970 4333

**Magyarország**  
Pfizer Kft.  
Tel: +36 1 488 3700

**Česká Republika**  
Pfizer s.r.o.  
Tel: +420-283-004-1111

**Malta**  
Vivian Corporation Ltd.  
Tel: + 35621 344610

**Danmark**  
Pfizer ApS  
Tlf: +45 44 201 100

**Nederland**  
Pfizer BV  
Tel: +31 (0)10 406 43 01

**Deutschland**  
Pfizer Pharma GmbH  
Tel: +49 (0)30 550055-51000

**Norge**  
Pfizer AS  
Tlf: +47 67 526 100

**Eesti**  
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal  
Tel: +372 666 7500

**Österreich**  
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.  
Tel: +43 (0)1 521 15-0

**Ελλάδα**

Pfizer Ελλάς A.E.  
Τηλ.: +30 210 6785 800

**Polska**

Pfizer Polska Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 335 61 00

**España**

Pfizer, S.L.  
Télf:+34914909900

**Portugal**

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda  
Tel: +351 21 423 5500

**France**

Pfizer  
Tél +33 1 58 07 34 40

**România**

Pfizer Romania S.R.L  
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

**Hrvatska**

Pfizer Croatia d.o.o.  
Tel: + 385 1 3908 777

**Slovenská Republika**

Pfizer Luxembourg SARL, organizačna zložka  
Tel: + 421 2 3355 5500

**Ireland**

Pfizer Healthcare Ireland  
Tel: 1800 633 363 (toll free)  
+44 (0)1304 616161

**Slovenija**

Pfizer Luxembourg SARL  
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja  
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana  
Tel.: + 386 (0) 1 52 11 400

**Ísland**

Icepharma hf,  
Simi: + 354 540 8000

**Suomi/Finland**

Pfizer Oy  
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

**Italia**

Pfizer S.r.l.  
Tel: +39 06 33 18 21

**Sverige**

Pfizer AB  
Tel: +46 (0)8 550 520 00

**Κύπρος**

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)  
Τηλ: +357 22 817690

**United Kingdom**

Pfizer Limited  
Tel: +44 (0) 1304 616161

**Latvija**

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā  
Tel.: + 371 570 35 775

**Dar il-fuqjett kien approvat l-ahhar fi**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku ta' l-Aġenzija Ewropeja  
dwar il-Medicini <http://www.ema.europa.eu>

**It-tagħrif li jmiss qed jinghata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:**

It-tilqima għandha tithawwad tajjeb biex tinkiseb suspensjoni bajda omoġenja, u tkun eżaminata  
vizwalment għal kwalunkwe frak u/jew varjazzjoni tal-aspett fiziku, qabel ma tinghata. Tużahiex jekk  
il-kontenut ma jkunx hekk.

Prevenar hu għall-użu għol-muskoli biss. Tagħtihx minn għol-vina. Din it-tilqima m'għandhiex tinghata lil trabi jew lil tfal li għandhom it-tromboċitopenja jew kwalunkwe disturb tal-koagulazzjoni li minhabba fih l-injezzjoni għol-muskoli tkun kontraindikata, hlief jekk il-benefiċċju potenzjali jizboq b'mod ċar ir-riskju tal-ghoti.

Trabi ta' bejn 2 - 6 xhur: is-serje primarja tat-trabi tikkonsisti fi tliet doži, kull waħda ta' 0.5 ml. L-ewwel doża normalment tinghata meta t-tarbija jkollha xahrejn, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži.

Ir-raba' doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Alternattivament, meta Prevenar jinghata bhala parti minn programm ta' rutina ta' immunizzazzjoni lit-trabi, tista' tkun ikkunsidrata skeda b'żewġ doži. L-ewwel doża tista' tinghata mill-età ta' xahrejn, bit-tieni doża li tinghata mill-inqas xahrejn wara, u t-tielet doża (*booster*) li tinghata fl-età ta' 11-15-il xahar.

Trabi ta' bejn 7 - 11-il xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahar bejn id-doži. It-tielet doża hi rakkomandata fit-tieni sena tal-ħajja.

Tfal li għandhom bejn 12 - 23 xahar: żewġ doži, kull waħda ta' 0.5 ml, b'intervall ta' mill-anqas xahrejn bejn id-doži.

Tfal li għandhom bejn 24 xahar – 5 snin: doża waħda.

Il-ħtieġa ta' doża *booster* wara dawn l-iskedi ta' immunizzazzjoni ma kienet stabbilita.

Bhal fil-każ ta' tilqim iehor, l-ghoti ta' Prevenar għandu jkun possibbli għal persuni li jbatu minn mard b'deni akut jew sever.

Bħal-tilqim kollu li jista' jiġi injettat, il-kura u s-supervizzjoni medika adattata għandhom dejjem ikunu disponibbli fil-pront f'każ ta' avveniment anafilattiku rari wara l-ghoti tat-tilqima.

Prevenar mhux ser jiproteġi kontra serotipi oħrajn ta' *Streptococcus pneumoniae* hlief dawk inklużi fit-tilqima, jew kontra mikro-organizmi oħrajn li jikkawżaw mard invażiv jew infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna.

Għalkemm xi rispons tal-antikorpi għat *toxoid* tad-difterite jista' jsehh, l-immunizzazzjoni b'din it-tilqima ma tissostwixxix l-immunizzazzjoni ta' rutina kontra d-difterite.

Għal tfal minn sentejn sa 5 snin, intuzat skeda ta' immunizzazzjoni li kienet tikkonsisti f'doża waħda. Rata oġhla ta' reazzjonijiet lokali kienet osservata fi tfal li kellhom iktar minn 24 xahar, meta mqabbla mat-trabi.

Tilqim differenti li jista' jiġi injettat għandu dejjem jinghata f'siti differenti tal-injezzjoni.

Dejta limitata wriet li Prevenar jikkawża rispons immuni aċċettabbli fi trabi li għandhom il-marda taċ-ċell (li *sickle*, bi profil tas-sigurtà simili għal dak osservat fi gruppi li mhux qegħdin f'riskju għoli. Dejta oħra is-sigurtà u l-immunogeniċità għandhom mhumiex disponibbli għal tfal fi gruppi oħrajn speċifiċi li qegħdin f'riskju għoli għal mard pnevmokokkali invażiv (eż. tfal b'disfunzjoni kongenitali oħra jew b'disfunzjoni miksuba tal-milsa, li huma infettati bl-HIV, li għandhom malinn, u li għandhom sindrome nefrotiku). It-tilqima fi gruppi li qegħdin f'riskju għoli għandha tkun ikkunsidrata fuq bażi individwali.

Tfal ta' taħt is-sentejn (inklużi dawk li qegħdin f'riskju għoli) għandhom jirċievu s-serje ta' tilqim ta' Prevenar li hi adattata għall-età tagħhom. L-użu ta' tilqima konjugata pnevmokokkali ma tissostitwixxix l-użu ta' tilqim tal-polysaccharide pnevmokokkali li fih 23 valent fit-tfal ta'  $\geq 24$  xahar b'kundizzjonijiet (bħal marda taċ-ċelluli *sickle*, asplinja, infezzjoni bl-HIV, mard kroniku jew li huma immunokompromessi) li jpoġġuom f'riskju oġhla għal mard invażiv minhabba *Streptococcus pneumoniae*. Fejn ikun rakkomandat, it-tfal f'riskju li għandhom  $\geq 24$  xahar u li jkunu diġà tlaqqmu bi Prevenar, għandhom jirċievu tilqima tal-polysaccharide pnevmokokkali li fiha 23 valent. L-

intervall bejn it-tilqima tal-konjugat pnevmokokkali (Prevenar) u t-tilqima tal-polysaccharide pnevmokokkali li fiha 23 valent, m'għandux ikun ta' inqas minn 8 ġimghat. M'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli li tindika jekk l-għoti ta' tilqima tal-polysaccharide pnevmokokkali li fiha 23 valent lil tfal li ma jkunux tlaqqmu, jew lil tfal li jkunu diġà tlaqqmu bi Prevenar, jistax jirriżulta f'rispons eċċessiv għal dozi addizzjonali ta' Prevenar.

Mediċina profilattika kontra d-deni hi rakkomandata:

- għat-tfal kollha li jkunu qed jirċievu Prevenar fl-istess hin ma' tilqim li jkun fih *whole cell pertussis* minhabba r-rata ogħla rata ta' reazzjonijiet bid-deni
  - għat-tfal li jkollhom il-puplesiji, jew li jkollhom passat mediku ta' puplesiji kkawżati mid-deni.
- Il-kura kontra d-deni għandha tinbeda kull meta jkun meħtieġ jew meta t-temperatura titla' iktar minn 39°C.

Tfal b'indeboliment fir-rispons immuni, kemm jekk dan iseħħ minhabba l-użu ta' terapija immunosoppressiva, difett ġenetiku, infezzjoni bl-HIV, jew kawżi oħrajn, jista' jkollhom tnaqqas fir-rispons tal-antikorpi għall-immunizzazzjoni attiva.

Bhal ma jiġri bi kwalunkwe tilqima, Prevenar jista' ma jipproteġix l-individwi kollha li jkunu qed jirċievu t-tilqima kontra l-marda pnevmokokkali. Flimkien ma' dan, għas-serotipi ta' t-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun iktar baxxa b'mod sostanzjali milli mill-protezzjoni kontra l-mard invażiv. Minhabba li l-infjammazzjoni fil-parti tan-nofs tal-widna hi kkawżata minn ħafna organiżmi li mhumiex serotipi pnevmokokkali rappreżentati fit-tilqima, il-protezzjoni kontra l-infjammazzjonijiet kollha fil-parti tan-nofs tal-widna hi mistennija li tkun baxxa.

**ANNEX IV**

**KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIĊI U RAĠUNIJIET GĦAL VARJAZZJONI GĦAT-  
TERMINI TAL-AWTORIZZAZZJONIJIET GĦAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Prodott medičinali li m'għadux awtorizzati

**Konklużjonijiet xjentifiċi u raġunijiet għal varjazzjoni għat-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqeghid fis-suq**

Minhabba l-esperjenza twila ta' wara t-tqeghid fis-suq, il-profil tas-sigurtà kkaratterizzat tajjeb, u l-esponiment kbir tal-prodott, il-PRAC irrakkomanda li jemenda l-frekwenza tal-PSUR għal kull 10 snin u li jemenda l-Anness II kif xieraq biex jirrifletti s-sentenza attwali tal-mudelli tal-QRD li tirreferi għal-lista EURD.

Għalhekk, abbażi tad-dejta disponibbli, il-PRAC ikkunsidra li t-tibdil fil-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq kienu ġġustifikati.

Prodott mediċinali li m'għadux awtorizzati