

| <u>EU nummer</u> | <u>Fantasiernaam</u> | <u>Sterkte</u> | <u>Farmaceutische vorm</u> | <u>Toedieningsweg</u> | <u>Verpakking</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Verpakkings-grootte</u> |
|------------------|--|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| EU/1/00/153/001 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 1 voorgevulde spuit |
| EU/1/00/153/002 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 10 voorgevulde spuiten |
| EU/1/00/153/003 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 20 voorgevulde spuiten |
| EU/1/00/153/004 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 50 voorgevulde spuiten |
| EU/1/00/153/005 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 1 voorgevulde spuit (glas) + 1 afzonderlijke naald |
| EU/1/00/153/006 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 10 voorgevulde spuiten + 10 afzonderlijke naalden |
| EU/1/00/153/007 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 20 voorgevulde spuiten + 20 afzonderlijke naalden |
| EU/1/00/153/008 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 50 voorgevulde spuiten + 50 afzonderlijke naalden |
| EU/1/00/153/009 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 1 voorgevulde spuiten + 2 afzonderlijke naalden |
| EU/1/00/153/010 | Infanrix penta | - ¹ | Suspensie voor injectie | Intramusculair gebruik | Voorgevulde spuit (glas) | Suspensie: 0,5 ml | 10 voorgevulde spuiten + 20 afzonderlijke naalden |
| _1_ | Difterie toxoïd, geadsorbeerd | | ≥ 30IE | | | | |
| | Tetanus toxoïd, geadsorbeerd | | ≥ 40IE | | | | |
| | Pertussis toxoïde, geadsorbeerd | | 25 microgram | | | | |
| | Filamenteus Haemagglutinine, geadsorbeerd | | 25 microgram | | | | |
| | Pertactin, geadsorbeerd | | 8 microgram | | | | |
| | Recombinant hepatitis-B-virus oppervlakte-antigeen (S-eiwit), geadsorbeerd | | 10 microgram | | | | |
| | Geïnactiveerd poliovirus type 1 | | 40 D-antigeen eenheden | | | | |
| | Geïnactiveerd poliovirus type 2 | | 8 D-antigeen eenheden | | | | |
| | Geïnactiveerd poliovirus type 3 | | 32 D-antigeen eenheden | | | | |